

BOUGHT WITH THE INCOME OF THE
COMSTOCK ENDOWMENT FUND,
THE GIFT OF
JOHN HENRY COMSTOCK
AND THE
STUDENT MEMORIAL FUND,
GIFT OF STUDENTS IN ENTOMOLOGY

Date Due

~~AUG 9 1989~~

~~JAN 24 1989~~

RETURN TO

ENTOMOLOGY LIBRARY

Cornell University
Ithaca, N. Y.

Cornell University Library

QL 591.F8R85

Catalogue des insectes coleopteres du



3 1924 018 331 896

ent

2 10s

Entomology

CATALOGUE
DES
INSECTES COLÉOPTÈRES

DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR.

CATALOGUE

INSECTES COLÉOPTÈRES

CATALOGUE

INSECTES COLÉOPTÈRES

DU DÉPARTEMENT DE LA CORSE

CATALOGUE

DES

INSECTES COLÉOPTÈRES

DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR,

Par M. Aug. ROUGET,

Membre de l'Académie impériale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon,
et de la Société Entomologique de France.


Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des Sciences, Arts
et Belles-Lettres de Dijon, 2^e série, partie des Sciences, t. III (1854),
p. 85; t. IV (1855), p. 113; t. VI (1857), p. 1; t. VII (1858-1859), p. 1;
et t. VIII (1860), p. 1.

DIJON

IMPRIMERIE J.-E. RABUTOT, PLACE SAINT-JEAN, 1 ET 3.

1854-1860.

Lo



CATALOGUE

INSECTES COLÉOPTÈRES

DE DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR

DL M. AUGET
591 Ent.
F8
R85

65590

214

D1108



à M. André
CATALOGUE
Joachim De l'auteur

DES

Aug. Rouget

INSECTES COLÉOPTÈRES

DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR (1).

~~~~~  
**AVERTISSEMENT.**  
———

Le volume des *Mémoires de l'Académie de Dijon* publié en 1854 contient un travail de M. Barbié, ayant pour titre : *Catalogue méthodique des Mollusques terrestres et fluviatiles du département de la Côte-d'Or*.

M. Brullé, professeur à la Faculté des sciences de Dijon et membre de l'Académie (dans le but, sans doute, de former, par la réunion de travaux de même nature sur les autres parties de la zoologie, un catalogue général comprenant les différentes classes d'animaux qui se trouvent dans le département de la Côte-d'Or), m'a demandé le catalogue des insectes de l'ordre des Coléoptères trouvés dans ce département. C'est ce travail que j'ai l'honneur d'offrir aujourd'hui à l'Académie, et j'ai l'espoir qu'il sera bientôt suivi d'autres travaux de ce genre.

---

(1) Ext. des *Mém. de l'Acad. de Dijon*, années 1854 et suiv.

Pour les personnes étrangères à l'entomologie, un catalogue des Coléoptères d'un département peut paraître la chose la plus simple et la plus facile. Malheureusement, il n'en est point ainsi; et ni le temps depuis lequel je collige des insectes de cet ordre dans les environs de Dijon, ni les notes nombreuses que j'ai recueillies, ni enfin les renseignements qui m'ont été fournis par plusieurs entomologistes, ne peuvent me faire illusion et me permettre de présenter mon catalogue comme un ouvrage complet ou exempt d'erreurs.

Sans entrer dans l'examen de toutes les causes qui ont dû produire des lacunes et des imperfections dans mon travail, j'indiquerai ici les principales de ces causes, afin de mettre le lecteur à même d'apprécier l'étendue des résultats qu'elles ont nécessairement occasionnés.

La première et la principale existe dans la difficulté même de la recherche des insectes. Cette recherche, ou la *chasse* de ces animaux, varie tellement, suivant les différentes espèces, qu'il serait facile de composer sur ce sujet un volumineux traité. Ainsi, par exemple, la chasse d'une espèce devra avoir lieu le soir, au crépuscule; celle d'une autre le matin; celle d'une autre au milieu du jour, par un soleil ardent; une espèce se trouvera au printemps, une autre en été, etc. L'état de l'atmosphère n'est même pas indifférent pour arriver à la découverte de certains insectes, dont les uns se trouveront par un temps chaud et orageux, les autres par un temps humide, etc., etc. L'*habitat* si varié des Coléoptères est limité de telle sorte pour certaines espèces, qu'on ne parvient à les découvrir qu'à l'aide des plus longues et des plus minutieuses recherches et après bien des tentatives inutiles, surtout si l'on ne connaît pas *a priori* la



retraite de ces espèces. Telle espèce de Coléoptère, par exemple, vit exclusivement sur une espèce particulière de plante, quelquefois rare dans la localité ; sa recherche vient donc se compliquer de celle de la plante, qu'il faut préalablement connaître ; telle autre espèce se trouvera dans l'intérieur du bois mort ; telle autre dans les champignons, les lycoperdons, les agarics ou les bolets ; telles autres encore dans les végétaux en putréfaction, dans le fumier, sous la mousse, sous les feuilles mortes, dans les cadavres, dans les excréments, dans les eaux stagnantes, dans l'eau vive et même sous les chutes au bas des glaciis, dans les caves, dans la tannée des serres chaudes, dans les couches à melons, dans les fourmilières, dans les nids que les guêpes se construisent dans la terre, dans ceux des frelons, dans ceux des abeilles maçonnes, dans les *helix*, etc., etc. La petitesse de la taille de certaines espèces est un obstacle puissant qui s'oppose à leur découverte, et dont la meilleure vue ne permettrait souvent pas de triompher sans l'emploi de procédés artificiels. Cette énumération, si rapide et si peu complète qu'elle soit, peut déjà faire comprendre facilement que bien des espèces ont dû jusqu'ici échapper à mes recherches.

Une autre cause se trouve dans l'étendue du département de la Côte-d'Or (876,000 hectares ou 550 lieues carrées environ), comparée surtout au temps limité qu'il m'est donné de consacrer à l'étude et à la chasse des insectes. Il en résulte que mes recherches, bornées presque toujours à un rayon peu étendu autour de Dijon, n'ont embrassé qu'une partie du territoire sur lequel elles auraient dû porter ; que l'autre partie est restée en dehors, et qu'ainsi les espèces particulières aux localités que je n'ai pas visitées me sont encore inconnues.

Une autre cause encore , dont le résultat vient s'ajouter à ceux que je viens de signaler , consiste dans l'insuffisance des moyens que j'ai eus à ma disposition pour la détermination des espèces que j'ai récoltées ou qui m'ont été communiquées. La Bibliothèque publique de Dijon ne contient aucun des nombreux ouvrages modernes qui traitent des Coléoptères, et, d'un autre côté, le prix élevé de la plupart de ces ouvrages ne m'a permis d'en réunir qu'un certain nombre ; de sorte que, pour certaines familles de l'ordre dont je m'occupe, je me trouve sans autres ouvrages descriptifs que des traités généraux, déjà anciens, sur l'ordre entier des Coléoptères, traités nécessairement incomplets aujourd'hui et ne pouvant remplacer les travaux monographiques. J'ai dû alors quelquefois avoir recours à l'obligeance d'entomologistes parisiens, notamment de MM. *Aubé* et *Fairmaire*, auxquels la science est redevable de plusieurs travaux importants. Malheureusement cette ressource n'a pu remplacer qu'en partie pour moi l'insuffisance des moyens de détermination. En effet, la difficulté de déterminer rigoureusement certains insectes, et par suite la perte de temps qui résulte de ce travail, m'ont toujours fait garder une certaine réserve, et je me suis fait un devoir de limiter les demandes que j'avais à faire sous ce rapport aux entomologistes que je viens de citer. Un certain nombre d'espèces est ainsi resté non déterminé, et n'a pu dès lors figurer sur mon catalogue.

On peut comprendre maintenant l'influence qu'ont eue ces obstacles sur mon travail ; je n'ai pas hésité à les avouer, et aucun de ceux qui se livrent à l'étude d'une partie quelconque de l'histoire naturelle n'aurait, à ma place, cherché à les dissimuler. Le plus grand des naturalistes, l'immortel



auteur du *Systema naturæ* lui-même, éprouvait aussi des difficultés de plus d'une sorte, et il ne nous cache pas qu'il a rencontré de tous côtés des ronces et des épines (1).

Malgré les imperfections que j'ai signalées d'une manière générale en en indiquant les causes, je dois cependant reconnaître que mon catalogue est beaucoup plus complet, tant sous le rapport du nombre des espèces énumérées que sous celui des indications fournies sur la plupart de ces espèces, que les autres catalogues du même genre que j'ai vus et qui comprenaient les Coléoptères d'autres départements. Je suis assuré que les personnes qui voudront se livrer à la recherche des Coléoptères dans le département de la Côte-d'Or, et surtout dans les environs de Dijon, y trouveront des renseignements utiles à l'aide desquels elles pourront découvrir promptement un grand nombre d'espèces dont plusieurs leur auraient nécessité bien des courses et des tentatives infructueuses.

Indépendamment de mes recherches personnelles depuis près de vingt années et des notes que j'ai recueillies, j'ai trouvé, de la part des entomologistes qui se sont occupés des Coléoptères de ce département, le plus grand empressement à m'aider dans mon travail et à me communiquer les renseignements dont j'avais besoin et qui m'ont été si utiles.

Je dois citer en première ligne M. Emy, ancien capitaine d'artillerie en retraite et ancien membre de la Société ento-

---

(1) « Intravi itaque densas umbrosasque Naturæ silvas, hinc inde horrentes acutissimis et hamatis spinis, evitavi quotquot licuit plurimas, « at neminem tam esse circumspectum didici, cujus non diligentia sibi « ipsi aliquando excidat, ideoque ringentium Satyrorum cachinnos, meis « que humeris insilientium Cercopithecorum exsultationes sustinui! incessi viam et quem dederat cursum fortuna peregi. » (LINNÉ, *Systema naturæ*, édition 13 (12); *introitus* in fine.)

mologique de France, demeurant à Rouvray, qui a colligé pendant un grand nombre d'années des Coléoptères dans cette localité et dans les environs, et qui m'a communiqué avec la plus grande complaisance les notes qu'il possédait sur ces insectes.

Je citerai en second lieu M. Arias Teijeiro, ancien magistrat espagnol, membre de la Société entomologique, demeurant à Beaune, auquel je suis redevable de notes et renseignements nombreux sur les espèces de cette ville et des environs, notes qu'il s'est empressé de mettre en ordre et de rédiger dans l'intérêt de mon travail.

Pour les espèces des environs de Beaune, je citerai aussi les renseignements qui m'ont été communiqués par M. Pérageallo, premier commis de l'administration des contributions indirectes, demeurant actuellement à Mâcon, mais qui a habité Beaune pendant plusieurs années. MM. Bourlier, professeur au Lycée de cette ville, et André, élève de ce Lycée, m'ont également fait connaître quelques espèces qu'ils avaient trouvées dans les environs de Beaune.

Pour les espèces des environs de Dijon, je citerai M. Nodot, directeur-conservateur du Musée d'histoire naturelle de cette ville, membre de l'Académie, qui a guidé mes premiers pas dans la carrière entomologique. M. Nodot m'avait permis, lorsque je commençais l'étude des Coléoptères, de prendre copie des notes manuscrites qu'il avait rédigées lorsqu'il recherchait des insectes; et, si le nom de ce naturaliste ne se trouve pas cité plus souvent dans mon catalogue, c'est que j'ai retrouvé dans les localités qu'il indique la plupart des espèces mentionnées dans ces notes, dont je n'ai alors fait usage dans mon travail que pour les espèces non trouvées par moi dans ces localités.



M. Tarnier, qui s'est livré avec le plus grand zèle à la chasse des insectes, et qui a fait en 1853 une excursion entomologique en Andalousie et à Tanger, m'a également fourni des renseignements nombreux sur les espèces des environs de Dijon, et notamment sur celles qu'il a trouvées à Fixin ou dans les environs.

M. Dudrumel, préparateur d'histoire naturelle à la Faculté des sciences de Dijon, m'a communiqué plusieurs renseignements utiles sur les espèces des environs de Dijon, et d'autres encore plus précieux pour moi sur celles des environs de Pontailler-sur-Saône.

M. Lombard, ancien principal du collège de Saulieu, botaniste distingué, m'a, il est vrai, fourni peu de notes sur les insectes; mais il n'en a pas moins contribué pour une large part à mon travail, en me faisant recueillir à Villenote, près Semur, un grand nombre de petites espèces de Coléoptères qu'il avait précédemment découvertes dans cette localité.

M. Saintpère, médecin à Dijon, bien qu'ayant récolté peu d'insectes dans ce pays, a cependant trouvé quelques Coléoptères fort rares, surtout aux environs de l'Etang-Vergy.

J'ai eu soin de distinguer, en les renfermant entre des parenthèses, les indications qui émanaient de ces entomologistes, dont je cite les noms après chacune de ces indications.

J'ai suivi, pour le classement des espèces, des genres et des familles, l'ordre adopté par M. Gaubil dans son *Catalogue synonymique des Coléoptères d'Europe et d'Algérie*, d'après la classification proposée par les entomologistes allemands. Cet ordre peut bien laisser quelque chose à désirer, surtout en ce qui concerne la place respective de cer-

taines familles; c'est là un inconvénient inhérent au remplacement de la classification fondée sur le système tarsal par une autre, trop récente encore pour ne pas éprouver par la suite des modifications importantes.

M. Barbié a cru utile d'adopter, dans son catalogue des Mollusques, les noms français concurremment avec les noms latins. C'est à dessein que je n'ai pas suivi la même marche, par la raison que les noms français ne sont plus usités depuis longtemps en entomologie, et qu'ils ne tarderont pas à disparaître complètement de la nomenclature pour les autres branches de la zoologie.

J'ai dû, pour ne pas augmenter considérablement l'étendue de ce catalogue, restreindre beaucoup la synonymie, à laquelle M. Barbié a donné une assez large place. Par le même motif, je me suis vu forcé de supprimer presque complètement l'indication des variétés dont certaines espèces de Coléoptères offrent souvent un nombre considérable.

L'*habitat*, au contraire, que je considère comme la partie essentielle d'un pareil travail, a reçu tous les développements que j'étais à même de lui donner. Pour rendre plus clairs les renseignements relatifs à cet *habitat*, je les ai ordinairement, et quand cela m'a été possible pour chaque espèce, divisés ainsi qu'il suit : 1° indication du plus ou moins de rareté de l'espèce; 2° indication de son *habitat* général, indépendant d'une localité particulière; 3° indication de l'*époque d'apparition* de cette espèce; 4° enfin, indication des différentes localités dans lesquelles elle a été trouvée.

AUG. ROUGET.

---









## CICINDELÆ.

---

CICINDELA. *Linn.*

1. C. CAMPESTRIS. *De Géer.* Commune. Sur les chemins, dans les champs et les endroits découverts exposés au soleil ; dans les clairières et sur les chemins dans les bois. Paraît dès la fin de mars, ordinairement à l'époque de l'arrivée des hirondelles ; mais c'est surtout en avril et mai qu'elle se trouve le plus communément ; elle vole avec une grande facilité, ce qui la rend difficile à prendre sans filet. Cette espèce répand, lorsqu'on la saisit, une odeur de rose assez agréable, qui ne tarde pas à dégénérer, si l'on tient l'insecte un peu de temps, en une odeur désagréable ressemblant à celle de la plupart des *carabiques*. Je l'ai trouvée quelquefois en assez grande quantité à la combe Saint-Joseph et à la Combe-aux-Serpents ; trouvée aussi dans d'autres localités : Dijon, dans les jardins avoisinant les remparts, au bord du Canal, dans l'intérieur du Parc sur le chemin circulaire des voitures, etc. Corcelles-les-Monts. Flavignerot. Chambolle. Reulle-Vergy. (Fixin ; mai et commencement de juin. — M. *Tarnier.*) (Beaune ; printemps et été. — M. *Arias.*) (Rouvray ; très-commune. — M. *Emy.*) Cet insecte a aussi été trouvé le 30 septembre, mais une seule fois, près de Gilly.

J'ai trouvé la larve de cette espèce dans des trous qu'elle s'était creusés dans le sol battu d'un chemin peu fréquenté, dans les bois de Chaignay, en automne.

2. C. HYBRIDA. *Linn.* (Auxonne ; Maxilly-sur-Saône. — M. *Tarnier.*)

3. C. GERMANICA. *Fabr.* J'ai trouvé cette espèce une seule fois, mais abondamment, à Chevigny-Saint-Sauveur, au nord du petit bois qui se trouve devant le château, dans un

pâquier, le 6 juillet; elle ne vole pas comme la *Campestris*, mais elle court avec une extrême agilité et se retire dans les gerçures de la terre. (4 juillet, même localité. — M. Tarnier.) (Au bord de la route de Langres, près de Dijon. — M. Dudrumel.) (Semur. — M. Emy.)

## CARABI.

### ELAPHRUS. Fabr.

4. E. ULIGINOSUS. Fabr. (Beaune; au bord d'une mare; mai. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

5. E. CUPREUS. Duft. Rare. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés, sur la matière verte à la surface de l'eau du ruisseau qui commençait à se dessécher; 27 mai. Gevrey, sous des herbes et des feuilles dans le bois d'aulnes près du petit étang de Satenay; 3 septembre. (Sur la boue au bord de cet étang; 18 juin. — M. Tarnier.) (Rouvray. — M. Emy.)

6. E. RIPARIUS. Fabr. Commun. Sur la boue un peu humide au bord des rivières et surtout des eaux stagnantes; avril à juillet. Dijon, bord de l'Ouche entre le Parc et Longvic; Creux-d'Enfer; fontaine près de l'Asile des aliénés. (Beaune; au bord d'une mare près de la Gare du chemin de fer. — M. Péracallo.) (Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide. — M. Arias.)

### BLETHISA. Bonelli.

7. B. MULTIPUNCTATA. Linn. (Rouvray. Très-rare; 31 juillet 1828, sous une pierre dans le ruisseau à sec de l'étang du Marais; 24 juin 1844, sous des feuilles dans la grande mare de la Corne-des-Trois-Bois. — M. Emy.)







NOTIOPHILUS. *Duméril.*

8. N. AQUATICUS. *Linn.* Commun. Dans les lieux humides, sous les pierres, la mousse, les feuilles mortes, etc.; mai et juin. Par les temps chauds, il se tient dans les endroits ombragés ou exposés au nord; après la pluie, il court sur le sable ou sur la terre dans les endroits découverts, surtout s'il fait du soleil. Dijon; dans la ville même, dans les cours et les jardins; autour de la ville sur les chemins; combe Saint-Joseph sous les pierres, janvier; Combe-aux-Serpents; au bas du mur au nord du clos de Pouilly. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées. Plombières, sur le viaduc de Neuvon, 1<sup>er</sup> novembre. Chambolle, 17 septembre. Ville-note, 24 septembre. (Beaune; au bord du ruisseau. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

9. N. SEMIPUNCTATUS. *Fabr.* Plus rare que l'espèce précédente; même *habitat*, mêmes localités et aux mêmes époques. Dijon, etc. (Beaune. — M. *Arias.*)

Variété. BIGUTTATUS. *Fabr.* Plus commune que le type de l'espèce, mais plus rare cependant que l'espèce précédente; aussi dans les mêmes conditions et aux mêmes époques. Dijon. Flavignerot, etc. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

10. N. QUADRI-PUNCTATUS. *Fabr.* Très-rare. Mêmes conditions et mêmes époques que les précédents. Dijon. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

OMOPHRON. *Latr.*

11. O. LIMBATUM. *F.* (Trois exemplaires de cette espèce ont été trouvés par M. *Arias* : à Savigny près Beaune, près de la source de la Fontaine-Froide, dans le sable au bord du ruisseau; mai et juin 1849.)





CYCHRUS. *F.*

16. *C. ROSTRATUS. Linn.* Rare. Sous les pierres et la mousse du pied des arbres, dans les parties un peu humides des bois de montagne; mai. Fixin. Concoeur, bois de Mantuan. (Pasques; sous des fagots; fin juin. — *M. Nodot.*) (Beaune. — *M. Arias.*)

17. *C. ATTENUATUS. Fabr.* Moins rare que le précédent; dans les mêmes conditions. Fin avril, mai, juillet, août, septembre, octobre. Corcelles-les-Monts, Mont-Afrique. Combe de Flavignerot. (Fixin. — *M. Tarnier.*) Curley, bois de Mantuan, sous un champignon. (Savigny-sous-Beaune, bois de la Fontaine-Froide. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

PROCRUSTES. *Bon.*

18. *P. CORIACEUS. Linn.* Pas rare. Sous les pierres ou courant par terre, le soir surtout, sur les chemins ou dans les champs; se trouve aussi dans les bois. Mai, juin, octobre. Environs de Dijon, surtout du côté de Fontaine et d'Ahuy; dans le lit de Suzon lorsqu'il est à sec, etc. (Fixin. — *M. Tarnier.*) (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

CARABUS. *Linn.*

19. *C. CATENULATUS. F.* Assez commun. Sous les pierres et les mousses du pied des arbres, dans les bois de montagne. Fin avril, mai, juillet, septembre. Flavignerot. Curley, bois des Liards. Chambolle, dans le bois mort au pied d'un arbre et sous des plateaux de bois scié dans une coupe. Concoeur, bois de Mantuan, sous des écorces au pied des chênes. Fixin, près de la ferme de la Fortelle, sous des pierres garnies de mousse. (Combe de Gevrey. — *M. Tarnier.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

20. *C. MONILIS. F.* Très-commun aux environs de Dijon,

près de la ville, sous les pierres, ou courant par terre sur les chemins peu fréquentés; on le trouve surtout par les soirées chaudes, après le coucher du soleil, dans les ornières de ces chemins, où il fait la chasse aux *lombrics*. Paraît dès le mois de mars, quelquefois même depuis la fin de février jusqu'à la fin de l'été; mais c'est surtout à la fin de mai qu'on le trouve le plus communément, principalement du côté de Fontaine-lez-Dijon et dans les autres endroits où il y a des vignes, ainsi que dans le lit desséché de Suzon; on le trouve aussi dans les bois, à Fixin, Gevrey, Chambolle, etc. Autour de Dijon, on ne trouve presque que des exemplaires de couleur uniforme : verte, vert doré, bronzée, vert bleuâtre, bleu d'acier, bleu violet, bleu noirâtre, et la variété *Consitus* à élytres, n'ayant qu'une seule ligne élevée entre chaque rangée de points oblongs élevés; dans la combe de Flavignerot se trouvent, sous les pierres, en mai, les belles variétés dont les bords latéraux du prothorax et des élytres sont de couleur différente de celle du milieu, ainsi que la variété à cuisses ferrugineuses; mais ces variétés y sont rares. (Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide; sous les pierres et les mousses. — M. Arias.)

21. C. CANCELLATUS. *Ill.* Très-commun aux environs de Dijon, sous les pierres, sur les chemins, dans les champs, etc. Fin mars, avril, mai; trouvé aussi en novembre. Partout autour de la ville, du côté de Fontaine, dans le lit de Suzon, sur le chemin au sud du clos de Montmuzard, etc. Quetigny, et beaucoup d'autres localités. (Beaune; sous les mousses et les pierres, au printemps, rare. — M. Arias.) (Rouvray; pas très-commun. — M. Emy.)

La variété à cuisses ferrugineuses est très-rare.

22. C. GRANULATUS. *Linn.* Gevrey, au bord du petit étang de Satenay, sous la mousse des souches d'aulnes, 27 août, rare. (Pontallier-sur-Saône, sous la mousse humide au pied des arbres dans les bois qui bordent la Saône; assez commun; avril, septembre, octobre. — M. Dudrumel.)







23. *C. AURATUS. Fabr.* Très-commun partout, dans les jardins, les champs et les vignes, sur les chemins, sous les pierres, etc. Fin mars, avril, mai; plus rare en été. On le trouve souvent sur les chemins au bord des vignes, mangeant des *helix* écrasés. Dijon. Flavignerot. Fixin. Chambolle, etc. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

24. *C. AURONITENS. F.* Peu commun. Dans les bois des montagnes, sous les pierres, la mousse du pied des arbres, dans le bas des arbres cariés, sous les piles de bois et les arbres coupés, etc. Depuis la fin d'avril jusqu'au milieu de septembre. Combe de Flavignerot. Fixin. Concœur, bois de Mantuan. Curley, bois des Liards. Chaignay, le matin par terre. (Environs de Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

25. *C. PURPURASCENS. F.* Pas commun. Sous les pierres, sur les chemins; moins rare dans les bois sous les pierres et sous les mousses du pied des chênes. Mars, avril; quelquefois en juillet, août et septembre. Dijon, vieux Suzon; derrière le Parc du côté de Longvic; pépinière près de l'écluse de Larrey, etc. Messigny, fontaine de Jouvence. Chambolle. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

26. *C. NEMORALIS. Müll. — HORTENSIS. F.* Assez commun. Sous les pierres au bord des chemins, ou courant par terre sur les chemins et dans les champs; plus commun dans les bois. Fin mars, avril, mai. Dijon, du côté de Fontaine, vieux Suzon, derrière le Parc du côté de Longvic, etc. Chambolle. Flavignerot. Messigny, fontaine de Jouvence. Plombières, combe de Neuvon, etc. (Combes de Fixin et de Gevrey. — *M. Tarnier.*) (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

27. *C. CONVEXUS. F.* Assez commun. Sous les pierres au bord des chemins peu fréquentés, ou courant par terre sur ces chemins. Mars, avril, mai, quelquefois en juillet. Dijon, au nord de la ville, chemin de Ruffey, derrière le Parc du côté de Longvic, près du Canal du côté de la ferme de la Noue, etc. (Rouvray, mont de Lérigny. — *M. Emy.*)

28. *C. INTRICATUS. Linn.* — *CYANEUS. F.* Très-rare. Dans les bois des montagnes, sous les pierres et les mousses qui croissent au pied des arbres. Mai ; quelquefois aussi en juillet et octobre. Flavignerot, près du ruisseau, dans la combe. Curley, bois de Mantuan. ( Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide, au pied des saules ; avril, mai ; très-rare.—*M. Arias.*) (Rouvray ; pas très-rare.— *M. Emy.*)

*CALOSOMA. Weber.*

29. *C. SYCOPHANTA. Linn.* Rare. Sur les arbres, principalement dans les bois, sur les chênes, où il mange les chenilles : il faut secouer l'arbre pour le faire tomber ; car cet insecte se trouve peu sur les branches basses ; il exhale une très-forte odeur d'amande amère lorsqu'on le saisit, et l'on doit éviter avec soin de se toucher la peau après l'avoir pris dans ses mains ; autrement, il en résulterait une vive irritation sur la partie touchée, irritation qui, surtout par les temps très-chauds, est accompagnée de douleurs intolérables. Fin mai, juin. Dijon, trouvé par terre, au bas des tilleuls sur le rempart de Tivoli et de l'Allée-de-la-Retraite, sur un chemin à droite de celui de Fontaine, près d'un cerisier ; un seul exemplaire dans chacune de ces localités. Combe de Marsannay. Gevrey. Chambolle, etc. (Rouvray.—*M. Emy.*) (Beaune ; sur les saules au bord de la Bouzoise.—*M. Arias.*)

30. *C. INQUISITOR. Linn.* Plus rare que le précédent. Dans les bois sur les chênes. Fin mai et commencement de juin. Trouvé une fois dans la ville même de Dijon sur du bois à brûler qui venait d'être déchargé. Gevrey. Chambolle. Reulle-Vergy, bois de Mantuan. (Fixin.—*M. Tarnier.*) (Pontailler-sur-Saône, au vol dans un bois.—*M. Dudrumel.*) (Rouvray ; moins rare que le *sycophanta.* — *M. Emy.*)







DRYPTA. *F.*

31. *D. EMARGINATA. F.* Rare. Sous les pierres, dans les endroits humides, ordinairement dans le voisinage de l'eau. Fin janvier, février, mars, avril, mai, 7 septembre et 8 octobre. Dijon, au bas du mur du Parc du côté de Longvic, près de l'Ouche; combe Saint-Joseph; près du moulin Vesson, au bas du petit mur entre la route et la rivière d'Ouche. Villenote, près Semur, en battant les haies qui bordent les prés. (Pontailler-sur-Saône. — M. *Dudrumel.*)

ODACANTHA. *F.*

32. *O. MELANURA. Linn.* Ce n'est qu'avec doute que je fais figurer ici cet insecte d'après M. *Emy*, auquel M. *Nodot* l'aurait envoyé comme provenant des environs de Dijon.

POLISTICHUS. *Bon.*

33. *P. VITTATUS. Brullé.* — *FASCIOLATUS. F.* Sous les pierres dans les endroits humides. Avril, mai. Trouvé une seule fois à Dijon, à la combe Saint-Joseph. Ruffey, près Dijon. (Pontailler-sur-Saône, sous les détritits; pas rare. — M. *Dudrumel.*) (Semur; endroits élevés et exposés au midi. — M. *Nodot.*)

CYMINDIS. *Latr.*

34. *C. HUMERALIS. F.* (Rouvray; 30 septembre 1839, sous une pierre dans le bois de Bouchots. — M. *Emy.*)

35. *C. HOMAGRICA. Duft.* Assez rare. Talant, sous les pierres sur la montagne près des petits tunnels du chemin de fer de Paris à Lyon. Janvier, juillet, août. (Beaune. — M. *Péragallo.*)

DEMETRIUS. *Bon.* — DEMETRIAS. *Dej.*

36. D. UNIPUNCTATUS. *Germ.* Rare. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sous les feuilles mortes et les détritres dans le bois d'aulnes; 27 août, 3 septembre. (Pontailler-sur-Saône. — M. *Dudrumel.*)

37. D. ATRICAPILLUS. *Linn.* Pas commun. Sous les pierres, les feuilles sèches, les écorces d'arbres, etc., dans les endroits humides. Février, avril, mai, août, septembre. Dijon, intérieur du Parc, sous les écorces de platane et en fauchant sur les fleurs d'*anthriscus sylvestris*; au bas du mur au nord du clos de Pouilly. Villenote, près Semur, en battant les haies qui entourent les prés et en fauchant sur la lisière du bois de Champeaux. (Beaune, en battant les fagots; printemps, automne. — M. *Arias.*)

DROMIUS. *Bon.*

38. D. LINEARIS. *Bon.* Commun. Sous les pierres dans les endroits un peu humides, sous la mousse au pied des arbres dans les bois, en battant les fagots, les haies vives et les buissons, etc. Avril, mai, juin, juillet, septembre. Dijon, au pied des petits murs qui bordent les chemins, près des vignes du côté de Fontaine; chemin de Daix, au pied d'une haie vive sous les pierres; combe Saint-Joseph; pépinière près de l'écluse de Larrey; bord de l'Ouche, etc. Ahuy, bord de Suzon près du lavoir. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot. Chaignay. Gevrey, en fauchant dans le bois près du grand étang de Satenay et sous les détritres dans le bois d'aulnes près du petit étang. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray; tout l'été, en battant les haies sèches et vives. — M. *Emy.*)

39. D. MELANOCEPHALUS. *Dej.* Pas rare. Dijon, Parc, écorces de platane, en hiver; chemin de Daix, sous les pierres







au bas d'une haie; avril. Ahuy, sous les pierres au bord de Suzon près du lavoir; mai, novembre. Flavignerot, en battant les fagots; mai, juin. Plombières, combe de Neuvon, en battant les fagots; octobre. Villenote, près Semur, en battant les haies autour des prés; août. (Pontailler, sous les mousses des troncs de chênes; octobre. — M. *Dudrumet.*) (Rouvray; commun. — M. *Emy.*)

40. D. SIGMA. *Rossi.* Très-rare. Environs de Dijon.

41. D. QUADRISIGNATUS. *Dej.* Dijon, au Parc sous les écorces, particulièrement celles de platane et de sycomore. Février, mars. Rare.

42. D. BIFASCIATUS. *Perroud.* Dijon, très-rare. (Beaune, sous les écorces, un seul exemplaire, au printemps. — M. *Arias.*)

43. D. FASCIATUS. *F.* Rare. Dijon, chemin de Daix, sous les pierres au bas d'une haie vive. Flavignerot, en battant des fagots; avril.

44. D. QUADRINOTATUS. *Duft.* Commun. Dijon, au Parc, sous les écorces de platane et de sycomore. Janvier, février, mars, avril, octobre, novembre et décembre. (Beaune, écorces de platane. — M. *Arias.*) (Rouvray, en battant les haies sèches et sous les mousses. — M. *Emy.*)

45. D. QUADRIMACULATUS. *Panz.* Commun. Dans les mêmes localités et aux mêmes époques que le précédent, avec lequel il se trouve presque toujours. (Beaune, Rouvray; comme le *Quadrinotatus.*)

46. D. AGILIS. *F.* Moins commun que les deux précédents, avec lesquels on le trouve dans les mêmes localités et aux mêmes époques, ainsi que les variétés à une ou deux taches pâles sur chaque élytre. (Pontailler, sous les mousses du tronc des chênes; octobre. — M. *Dudrumet.*) (Beaune, écorces de platane. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

47. D. GLABRATUS. *Duft.* Commun. Sous les écorces de platane et d'autres arbres, sous les pierres, en battant les haies, en fauchant dans les bois, etc. Janvier à avril; sep-

tembre à décembre. Dijon, au Parc; au bord des chemins du côté de Fontaine, etc. Asnières. Ahuy, bord de Suzon. Flavignerot. Chambolle. Villenote, près Semur, etc. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

48. D. OBSCUROGUTTATUS. *Duft.* — SPILOTUS. *Ziegl.* Pas commun. Sous les écorces et sous les pierres. Janvier, mars, août, décembre. Dijon, au Parc, sous les écorces de platane et de sycomore. Gevrey, sur le chemin de Saulon, dans le terreau au pied d'un saule creux, près d'un ruisseau avant le bois. (Beaune. — M. *Arias*.)

49. D. FOVEOLA. *Gyll.* — PUNCTATELLUS. *Duft.* Rare. Sous les pierres. Talant, sur la montagne au-dessus des petits tunnels du chemin de fer de Paris à Lyon, vis-à-vis le Foulon, 15 janvier. Ahuy, bord de Suzon, près du lavoir, 8 novembre. (Rouvray. — M. *Emy*.)

50. D. TRUNCATELLUS. *Linn.* (Beaune, sous les écorces, une seule fois au printemps. — M. *Arias*.)

51. D. QUADRIPUSTULATUS. *F.* — QUADRILLUM. *Duft.* Je n'ai trouvé à Dijon qu'un seul exemplaire de cet insecte, au vol, sur le chemin qui est au-dessus de la gare du chemin de fer, le 19 avril. (Pontailler, sur les sables humides près des bords de la Saône; septembre; assez commun, ainsi que la variété à deux taches. — M. *Dudrumel*.) (Beaune, sous les écorces de platane; printemps; commun. — M. *Arias*.) (Montberthaut, rive droite du Serein, sur le sable, au bas des communaux; fin mai. — M. *Emy*.)

LEBIA. *Latr.*

52. L. CYANOCEPHALA. *F.* Pas commune. Sous les écorces et les mousses du tronc des arbres, sous les pierres en hiver et au commencement du printemps; sur les troncs d'arbres, par terre et sur les plantes au printemps et en été. Dijon, au Parc, sous les écorces de platane, et derrière le mur de cette promenade du côté de Longvic, sous les pierres, jan-







vier; fontaine Sainte-Anne; au bord de la route de Langres, sur le tronc des tilleuls, courant au soleil, 6 juillet; sur un chemin près du Parc, courant par terre, 10 mars; fontaine de Larrey, sous les écorces au pied des saules, automne. Talant, au-dessus des petits tunnels du chemin de fer, à la fin de l'hiver. Bois de Fixin, près du chemin de fer, en fauchant, 8 juin. Combe de Gevrey, près de la fontaine, en fauchant, 11 juin. (Fixin, dans la combe, le soir, à la lanterne, 5 juillet. — M. Tarnier.) (Pontailler, sous les mousses du tronc des chênes, octobre. — M. Dudrumel.) (Beaune, écorces des tilleuls et des platanes, mai, juin. — M. Arias.) (Rouvray, sous les mousses; assez commune. — M. Emy.)

53. L. CHLOROCEPHALA. Ent. Hefte. Rare. Chambolle, sous des écorces dans le bois et courant sur la terre; mai. (Rouvray, en fauchant et en battant les haies sèches et vives; pas commune. — M. Emy.)

54. L. CYATHIGERA. Rossi. Très-rare. Trouvée à Plombières par un élève du Petit-Séminaire. (Rouvray, 17 septembre 1856, entre les gerçures de l'écorce d'un chêne dans une coupe du bois de Vernon. — M. Emy.)

55. L. CRUX MINOR. Linn. Se trouve çà et là, assez rarement dans les bois, en fauchant, quelquefois courant par terre ou sur les fleurs. Dijon, au Parc, sur les fleurs de cornouiller sanguin, *cornus sanguinea*, 16 juin; combe Saint-Joseph, au vol, près d'un champ de navette, 6 mai. (Sur les prés, en fauchant; mai. — M. Nodot.) Combe de Flavignerot, en fauchant, 3 juin. Combe de Chambolle, 20 avril, par terre; 24 juin, en fauchant. Je l'ai trouvée assez communément sur des ombellifères dans des coupes de deux à trois ans, à la fin de juillet et au commencement d'août, dans la combe de Chambolle et dans celle de Neuvon, près de Plombières. (Rouvray; assez rare. Montberthaut, trouvée en assez grande quantité le 27 juillet, en fauchant, vers deux heures après midi, dans les bois de bouleaux au-dessus de la descente du pont. — M. Emy.)

56. L. TURCICA. *F.* (Dijon, sur le tronc des tilleuls, au soleil, à l'Allée-de-la-Retraite; été; rare. — M. *Dudrumel.*)

57. L. HEMORRHOIDALIS. *F.* Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cet insecte à Dijon, sur le chemin de Ruffey, entre la Maladière et le clos de Pouilly, le 24 juin, le soir, au vol, par un temps très-chaud et orageux. (Rouvray, très-commun au commencement de l'automne, en fauchant, sur les bruyères. — M. *Emy.*)

BRACHINUS *Weber.*

58. B. CREPITANS. *Linn.* Très-commun. Sous les pierres au bord des chemins, surtout au pied des murs et des haies. Janvier, février, mars, avril, mai, octobre, novembre, décembre. Dijon, au bas du mur du Parc du côté de Longvic; chemins du côté de Chenôve, de Fontaine, de Talant, d'Auhuy, etc.; combe Saint-Joseph, etc. (Fixin. — M. *Tarnier.*) (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*) (1).

59. B. EXPLODENS. *Duft.* Très-commun également, dans les mêmes localités et aux mêmes époques que le précédent, avec lequel il vit en société. Dijon. (Fixin, Beaune, Rouvray.)

60. B. SCLOPETA. *F.* Encore plus commun que les précédents, surtout que le *Crepitans*, dans les mêmes localités et aux mêmes époques. Dijon. (Fixin, Beaune, Rouvray.)

---

(1) Cette espèce et les deux suivantes sont très-souvent couvertes, surtout sur les élytres, de très-petits parasites sur lesquels j'ai le premier appelé l'attention des naturalistes (*Annales de la Société entomologique de France*; 2<sup>e</sup> série, tom. 8, 1850, p. 21 et suiv.; pl. 3, I, fig. 1 à 7). Ces parasites ont été depuis étudiés avec soin par M. Robin dans la 2<sup>e</sup> édition de son *Histoire naturelle des végétaux parasites qui croissent sur l'homme et sur les animaux vivants*; Paris, 1853. Ils appartiennent à un genre de cryptogames, et ont été nommés par cet auteur *Laboulbenia Rougetii*. Ils sont décrits et figurés dans l'ouvrage précité, pages 622 à 639, pl. VIII, fig. 1 et 2, et X, fig. 2.







CLIVINA. Latr.

61. C. FOSSOR. Linn. — ARENARIA. F. Commune. Sous les pierres au bord des rivières et des ruisseaux. Mars, avril, mai, juin, octobre, quelquefois en hiver. Dijon, bords de l'Ouche, dans les endroits humides; bords de Suzon, bord de la fontaine qui est près de l'Asile des aliénés. Gevrey, au bord du ruisseau du grand étang de Satenay, près de la levée. Les variétés *Sanguinea*, *Collaris*, *Discipennis* et *Gibbicollis* sont plus rares que le type de l'espèce (Fixin, le soir, au vol, 23 mai. — M. Tarnier.) (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

DYSCHIRIUS. Bon. — CLIVINA. Latr.

62. D. GLOBOSUS. Herbst. — GIBBUS. F. Assez commun. Gevrey, dans le bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, sous les feuilles mortes et les herbes, sur la terre humide; 27 août, 3 septembre. (Rouvray; très-commun au bord des mares. — M. Emy.)

63. D. ÆNEUS. Dej. Pas rare. Sur la boue un peu humide au bord des rivières et des eaux stagnantes; en battant le sol avec les pieds, on voit sortir cet insecte. Mai, juin, juillet, août. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; bord de l'Ouche derrière le Parc; contre-fossé au midi du Canal près du chemin de fer de Paris à Lyon; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite, dans le sable au bord de l'eau.

64. D. NITIDUS. Dej. J'ai trouvé un seul exemplaire de cette espèce, le soir, au vol, au bord de la fontaine de Larrey, près Dijon, le 1<sup>er</sup> juin, par un temps très-chaud.

DITOMUS. *Bon.*

65. D. CAPITO. *Dej.* (Beaune, le long du chemin de Savigny, 5 juillet. — M. *Péragallo.*)

66. D. CLYPEATUS. *Rossi.* — SULCATUS. *F.* (Beaune, sous les pierres, juin. — M. *Arias.*)

PANAGAEUS. *Latr.*

67. P. CRUX MAJOR. *Linn.* Pas commun. Sous les pierres, dans les prés humides, le long des rivières. Février, mars, avril, mai, octobre, novembre. Dijon, près au bord de l'Ouche, surtout contre un petit mur près du moulin Vesson; (derrière le Parc, sous les matières en décomposition que l'eau amoncèle sur le sable après les crues de l'Ouche; revers du chemin du Canal, le long de l'Ouche. — M. *Nodot.*) Plombières, bord de l'Ouche. (Chevigny-Saint-Sauveur, au bord du petit ruisseau qui se trouve au nord du petit bois du château; 17 juin. — M. *Tarnier.*) (Pontailier, sous les détrit. — M. *Dudrumel.*) (Beaune. Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

Variété QUADRIPUSTULATUS. *Sturm.* — Très-rare. Bois de Chambolle, sous la mousse, ou courant par terre sur les chemins. Mai et commencement de juin. Dijon, Combe-aux-Serpents, par terre; 13 mai. (Rouvray; pas commun. — M. *Emy.*)

LORICERA. *Latr.*

68. L. PILICORNIS. *F.* Rare. Sous les pierres, dans les endroits humides au bord de l'eau. Avril, mai, juin, août, septembre, octobre. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés, bord de l'Ouche derrière le Parc (revers du chemin du Canal. — M. *Nodot.*). Gevrey, dans le bois d'aulnes près du petit étang de Satenay; sous les feuilles sèches et les détrit. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)







LICINUS. *Latr.*

69. L. SILPHOIDES. *F.* Pas commun. Sous les pierres. Septembre, octobre. Talant, montagne au-dessus des petits tunnels du chemin de fer, vis-à-vis le Foulon. (Montagne de Saint-Joseph. Montagne de Chenôve. Mars. — M. *Nodot.*) Montagne de Chambolle. Gemeaux et Epagny, dans les champs. Flavigny. (Beaune. — M. *Arias.*)

70. L. CASSIDEUS. *F.* Pas commun. Sous les pierres, ordinairement dans les endroits un peu humides. Mars, avril, mai, août, octobre. Dijon, chemins du côté de Fontaine; (route de Langres, sous les mottes de boue sèche. — M. *Dudrumet.*) Lit de Suzon, à l'extrémité de l'Allée-de-la-Retraite, près de la prison; chemin près du deuxième contre-fossé au midi du Canal; au-dessus de la fontaine de Larrey, près de la table de pierre. Fixin, près de la ferme de la Fortelle. Concéur, bois de Mantuan, près du télégraphe.

71. L. HOFFMANSEGGII. *Panz.* Très-rare. Bois des montagnes, sous les pierres. Mai, septembre. Flavignerot. Fixin, près de la ferme de la Fortelle. Chambolle, sous une écorce au pied d'un cerisier mort.

CALLISTUS. *Bon.*

72. C. LUNATUS. *F.* Rare. Sous les pierres, ou courant par terre. Février, avril, mai, juin. Dijon, combe Saint-Joseph; à l'Arquebuse, sur l'escalier du Cabinet d'histoire naturelle. Ahuy, bord de Suzon, près du lavoir. (Fixin, près de la ferme de la Fortelle. — M. *Tarnier.*) (Beaune, sur une plante, un seul exemplaire. — M. *Arias.*) (Semur, sous les pierres, au sommet des montagnes, dans les champs; avril. — M. *Nodot.*) (Rouvray, courant par terre, sous les pierres, quelquefois sous les écorces; assez rare. — M. *Emy.*)

CHLÆNIUS. *Bon.*

73. C. *SPOLIATUS*. *Rossi*. (Beaune, sous les pierres au bord d'une mare près la gare du chemin de fer ; avril, mai ; pas rare en 1849 et 1851 ; on ne l'a plus trouvé depuis. — *M. Arias* et *M. Péragallo*.)

74. C. *VARIEGATUS*. *Fourcroy*. — *AGRORUM*. *Oliv*. Assez commun. Sous les pierres dans les endroits humides, surtout dans le voisinage de l'eau. Mars, avril, mai et juin. Dijon, bord de Suzon et dans le lit desséché de ce torrent, fontaine près de l'Asile des aliénés, Combe-aux-Serpents, derrière le Parc. Talant, au bord d'une mare à l'ouest de ce village. (Beaune, au bord d'une mare près de la station du chemin de fer. — *M. Arias* et *M. Péragallo*.)

75. C. *VESTITUS*. *F*. Commun. Sous les pierres au bord de l'eau, dans les mêmes localités et aux mêmes époques que le précédent, avec lequel il se trouve très-souvent. (Beaune, comme le *Variegatus*. — *MM. Arias* et *Péragallo*.) (Rouvray. — *M. Emy*.)

76. C. *SCHRANKII*. *Duft*. Pas commun. Sous les pierres au bord de l'eau, dans les mêmes endroits et aux mêmes époques que les deux précédents. (Rouvray ; pas rare. — *M. Emy*.)

77. C. *NIGRICORNIS* *Sch*. (Châtillon-sur-Seine ; juillet. — *M. Emy*.)

Variété *MELANOCORNIS*. *Ziegl*. Commun. Sous les pierres dans les endroits humides, au bord des eaux courantes ou stagnantes. Avril à juillet. Mêmes localités que le *Variegatus*, et, en outre, le long de l'Ouche près du moulin Vesson ; fontaine de Larrey. Chevigny-St-Sauveur, au bord du petit ruisseau qui se trouve au nord du petit bois du château. Combe de Flavignerot. (Fixin. — *M. Tarnier*.) (Beaune. — *M. Arias*.) (Rouvray ; pas commun. — *M. Emy*.)

78. C. *TIBIALIS*. *Dej*. Blaisy-Bas, sous les pierres au bord







du ruisseau au midi du village, près du bois, 2 juillet. Quelques exemplaires. (Rouvray; rare. — M. Emy.)

79. C. HOLOSERICEUS. F. Très-rare. Pris une fois par M. Tarnier, le soir, au vol, dans une chambre, dans laquelle était une lumière, dans la rue Saumaise, à Dijon. (Dijon, le long de l'Ouche derrière le Parc, et au Mont-Afrique vers Flavignerot; juin. — M. Nodot.)

80. C. SULCICOLLIS. Payk. (Maxilly-sur-Saône, sur les bords de la Saône. — M. Tarnier.)

OODES. Bon.

81. O. HELOPIOIDES. F. (Chevigny-Saint-Sauveur, au bord du ruisseau au nord du petit bois qui est devant le château. Été. — M. Tarnier.) (Pontailler, sous les mousses humides dans les bois près de la Saône, octobre. — M. Dudrumel.) (Rouvray. — M. Emy.)

BADISTER. Clairv.

82. B. UNIPUSTULATUS. Bon. — CEPHALOTES. Dej. Assez rare. Sous les pierres et la mousse dans les endroits humides au bord de l'eau. Mai, juin, juillet. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; fontaine de Larrey, en fauchant. Chevigny-Saint-Sauveur, au bord du ruisseau au nord du petit bois qui est devant le château.

83. B. BIPUSTULATUS. F. Commun. Sous les pierres, les mousses et les détritits dans les endroits frais ou humides, le plus souvent dans le voisinage de l'eau, quelquefois dans les bois, au pied des arbres garnis de mousse. Toute l'année, mais surtout au printemps et en automne. Dijon, bords de l'Ouche, surtout à l'ombre des saules; bords et lit desséché de Suzon; combe Saint-Joseph; fontaine près de l'Asile des aliénés; mur au nord du clos de Pouilly; intérieur du Parc, etc. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay.

Villenote, près Semur, sur la montagne au nord du village. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

84. B. PELTATUS. *Panz*. Assez rare. Sous les pierres, les mousses et les détritits dans les endroits humides au bord de l'eau. Mai, juin, septembre, octobre. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés. Chevigny-Saint-Sauveur, au bord du ruisseau au nord du petit bois qui est devant le château. Gevrey, sous les aulnes au bord du petit étang de Satenay.

85. B. HUMERALIS. *Duft*. Pas commun. Sous les pierres et les détritits dans les endroits humides. Mars, avril, mai, juin, octobre. Dijon, combe Saint-Joseph; chemin de Daix, au bas d'une haie; mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles mortes; fontaine près de l'Asile des aliénés; bord de l'Ouche, près du moulin Vesson et derrière le Parc; se trouvait autrefois au bas du rempart vis-à-vis la rue de la Prévôté; mais les remblais qui ont eu lieu récemment ont détruit cette localité. (Fixin. — M. *Tarnier*.) (Beaune. — M. *Arias*.)

PATROBUS. *Meg*.

86. P. EXCAVATUS. *Payk*. — RUFIPES. *Gyll*. (Montberthaut, sous les pierres au bord du Serein et de l'Argentalet; printemps et automne. Rouvray, dans le bois Darié, au bord du petit ruisseau près les grands prés de la Motte. — M. *Emy*.)

SPHODRUS. *Clairv*.

87. S. LEUCOPHTHALMUS. *Linn*. — PLANUS. *F*. Pas très-rare. Dans les maisons, surtout dans les écuries, les lieux d'aisance et les endroits peu éclairés et malpropres; la journée, sous les planches, les ordures, etc.; le soir, il court par les temps chauds, souvent au milieu des *Blaps*. Fin avril, mai, juin, juillet. Dijon. (Beaune. — M. *Arias*. — Trouvé dans une rue, près d'un four, par M. *Bourlier*.)







PRISTONYCHUS. *Dej.*

88. P. SUBCYANEUS. *Ill.* — TERRICOLA. *Ill.* (Dijon. — M. Nodot, d'après M. Emy.) (Un seul exemplaire trouvé dans un bois aux environs de Beaune, au printemps. — M. Arias.)

CALATHUS. *Bon.*

89. C. LATUS. *Linn.* — CISTELOIDES. *Ill.* Commun. Sous les pierres au bord des chemins. Printemps et automne. Dijon, chemins peu fréquentés du côté de Fontaine, etc. Asnières, sur le chemin près du bois. Villenote, près Semur, sur la montagne au nord de ce village. (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

Variété FRIGIDUS. *F.* Dijon. (Rouvray. — M. Emy.)

90. C. FULVIPES. *Gyll.* (Beaune. — M. Arias.)

91. C. FUSCUS. *F.* Commun. Sous les pierres au bord des chemins, au pied des murs, sur les montagnes, etc. Printemps, automne; quelquefois en hiver. Dijon, mêmes localités que le *Latus*, et, en outre, derrière le mur du Parc, montagne près de la fontaine Ste-Anne. Asnières, etc. (Beaune; pas commun, sous les pierres; printemps. — M. Arias.) (Rouvray; assez rare. — M. Emy.)

92. C. ROTUNDICOLLIS. *Dej.* (Rouvray; très-rare; 21 août 1839, moulin Bierry, sous une pierre. — M. Emy.)

93. C. MELANOCEPHALUS. *Linn.* Commun. Sous les pierres. Février, mai. Dijon, bord de Suzon. Talant, montagne au-dessus des petits tunnels du chemin de fer de Paris à Lyon, petite combe au bas de la Fontaine-aux-Fées. Longvic, bord de l'Ouche. (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray; rare. — M. Emy.)

SYNUCHUS. *Gyll.* — TAPHRIA. *Bon.*

94. S. VIVALIS. *Ill.* (Dijon, le long de l'Ouche, derrière le Parc, sur le sable; 11 juillet. — M. *Nodot.*) (Rouvray; rare. — M. *Emy.*)

ANCHOMENUS. *Erichs.*

95. A. ANGUSTICOLLIS. *F.* Dijon, rare; au Parc, sous une écorce humide au pied d'un arbre, 21 février; fontaine auprès de l'Asile des aliénés, sous la mousse, 2 mai. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, sous les détritrus, 3 septembre. (Pontailler, bois voisin de la Saône, sous les mousses humides; commun; 8 avril, septembre, octobre. — M. *Dudrumel.*) (Beaune, sous les pierres, au printemps. — M. *Arias.*) (Rouvray; commun sous les mousses. — M. *Emy.*)

96. A. LIVENS. *Gyll.* — MEMNONIUS. *Knoch.* (Pontailler, sous les mousses; rare. — M. *Dudrumel.*) (Rouvray, sous les mousses et en battant les haies sèches. — M. *Emy.*)

97. A. PRASINUS. *Thunb.* Très-commun. Sous les pierres au bord des chemins, au pied des murs et des haies, etc. Printemps, automne et aussi l'hiver. Se trouve presque toujours avec les espèces du genre *Brachinus* et dans les mêmes localités. Dijon, au bas du mur du Parc du côté de Longvic; sur les chemins du côté de Chenôve, Talant, Fontaine, Ahuy, etc.; combe Saint-Joseph; bords de l'Ouche; lit de Suzon du côté d'Ahuy et près de la route d'Auxonne, vers la prison, etc. Villenote, près Semur, montagne au nord du village. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

98. A. ALBIPES. *F.* — PALLIPES. *F.* Très-commun. Sous les pierres au bord de l'eau. Printemps, automne, et plus





rarement l'hiver. Dijon, bord de l'Ouche, bord de Suzon et dans son lit lorsqu'il est à sec; fontaine près de l'Asile des aliénés; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite, dans le sable au bord de l'eau, etc. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, sous les détrit. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

99. *A. OBLONGUS. F.* Rare. Sous les pierres et les détrit. au bord de l'eau. Printemps, été, automne. Dijon, contre-fossé au midi du Canal près du chemin de fer de Paris à Lyon; Fontaine près de l'Asile des aliénés; bord de l'Ouche, au pied d'un saule carié. Gevrey, assez commun près du petit étang de Satenay. (Rouvray. — *M. Emy.*)

*AGONUM. Bon.*

100. *A. MARGINATUS. Linn.* Assez commun. Sous les pierres dans les endroits humides au bord de l'eau. Avril, mai. Dijon, bord de Suzon; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite, dans le sable au bord de l'eau. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

101. *A. AUSTRIACUS. F.* (Rouvray; assez rare. — *M. Emy.*)

102. *A. MODESTUS. Sturm.* Assez commun. Sous les pierres au bord de l'eau. Janvier, avril, juillet. Dijon, bord de Suzon, bord de l'Ouche. Talant, au bord d'une mare à l'ouest du village. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray; assez rare. — *M. Emy.*)

103. *A. SXPUNCTATUS. Linn.* Rare. Sous les pierres dans les endroits humides et au bord de l'eau. Avril à juillet. Dijon, bord de Suzon et dans son lit lorsqu'il est à sec. Combe de Flavignerot. Fixin, bois près du chemin de fer, par terre, dans une coupe. Curley, bois de Mantuan, par terre. Blaisy-Bas, dans le bois au midi du village, par terre. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

104. *A. PARUM PUNCTATUS. F.* Assez commun. Sous les pierres au bord de l'eau. Printemps, automne et quelquefois l'hiver. Dijon, bord de Suzon et lit desséché de ce torrent; fontaine près de l'Asile des aliénés; sablière près de



l'Allée-de-la-Retraite; chemin de la rente de Morvau, au bord d'un fossé. (Pontailler, sous les mousses humides dans les bois. — M. *Dudrumel.*) (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

105. A. VIDUUS. *Kugel.* Pas commun. Au bord de l'eau sous les pierres, etc. Avril, octobre. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; au bord du petit ruisseau qui sort du clos de Pouilly, près du petit chemin de Ruffey, sous les feuilles sèches. Chambolle, au vol, dans le village. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

106. A. VERSUTUS. *Gyll.* — LÆVIS. *Dej.* Rare. Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*)

107. A. MICANS. *Nicolaï.* — PELIDNUS. *Duft.* Gevrey, près du petit étang de Satenay, dans le bois d'aulnes, sous les détritits et en fauchant; pas commun; 3 septembre. (Pontailler, sous les mousses humides dans les bois au bord de la Saône; octobre. — M. *Dudrumel.*)

108. A. LUGENS. *Ziegl.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

109. A. EMARGINATUS. *Gyll.* Rare. Dijon, bord de l'Ouche du côté de Plombières. (Rouvray, grande mare du bois Dარიé; juin. — M. *Emy.*)

110. A. LUGUBRIS. *Dej.* Commun. Sous les pierres, sur la boue, sous les feuilles sèches, la mousse, les détritits, au bord des eaux dans les endroits humides. Mars à septembre. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; fontaine de Larrey; contre-fossé au midi du Canal près du chemin de fer de Paris à Lyon; sablière entre le chemin de la rente de Morvau et la route d'Auxonne; bord du ruisseau entre le clos de Pouilly et la ferme d'Epirey; au bas du mur au nord du clos de Pouilly, près du chemin de Ruffey. (Fixin. — M. *Tarnier.*) Gevrey, bord du petit étang de Satenay, dans le bois d'aulnes, sous les détritits. Blaisy-Bas, au bord du ruisseau près du bois. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)





111. A. ATRATUS. *Duft.* — NIGER. *Dej.* Dijon. (Beaune, un seul exemplaire, sous les pierres, dans un endroit humide. — M. *Arias.*)

OLISTHOPUS. *Dej.*

112. O. ROTUNDATUS. *Payk.* Rare. Dans les endroits humides. Juin, août, septembre. Dijon, sur la barrière au-dessus du Débarcadère. Plombières, combe de Neuvon. (Fixin. — M. *Tarnier.*) Chambolle, sur un mur à l'ombre et dans le bois sous une pierre. Villenote, près Semur, en fauchant au bord du bois de Champeaux. (Rouvray. — M. *Emy.*)

POECILUS. *Bon.* — FERONIA. *Dej.*

113. P. PUNCTULATUS. *F.* (Beaune. — M. *Arias.*)

114. P. CUPREUS. *Linn.* Très-commun. Sous les pierres dans les endroits humides; au vol, et courant par terre, au premier printemps. Mars à juillet. Dijon, bord de l'Ouche et de Suzon, vieux Suzon, etc. Talant, au bord d'une mare à l'ouest du village. (Chevigny-Saint-Sauveur. Fixin. — M. *Tarnier.*) Flavignerot, dans la combe. Blaisy-Bas, dans le bois. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

Variété VERSICOLOR. *Sturm.* Rare. Dijon.

115. P. DIMIDIATUS. *Oliv.* Dijon. Chemin de la Charmette; un seul exemplaire, sous une pierre. (Rouvray; pas commun. — M. *Emy.*)

116. P. LEPIDUS. *Leske.* (Dijon. — M. *Nodot*, d'après M. *Emy.*) (Beaune, sous les pierres, au printemps et en automne. — M. *Arias.*)

Variété VIATICUS. *Bon.* Pas rare. Sous les pierres, ou courant par terre. Dijon, sur la montagne au-dessus de Larrey, sur le chemin de Corcelles-les-Monts et près de la fontaine Sainte-Anne. Avril, mai. (Beaune, sous les pierres; printemps et automne. — M. *Arias.*)

117. P. SPLENDENS..... (Rouvray. — M. Emy.)

118. P. SUBCŒRULEUS. *Quensel.* — STRIATOPUNCTATUS. *Meg.*  
(Environs de Beaune ; un seul exemplaire dans un bois , au printemps. — M. Arias.)

ARGUTOR. *Meg.* — FERONIA. *Dej.*

119. A. VERNALIS. *F.* Commun. Sous les pierres et les feuilles mortes au bord de l'eau. Avril, octobre, novembre. Dijon , bord de l'Ouche près du moulin Vesson ; bord du ruisseau qui sort du clos de Pouilly, au-dessus du petit chemin de Ruffey. Flavignerot, dans la combe. (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

120. A. LONGICOLLIS. *Duft.* — NEGLIGENS. *Meg.* Rare. Sous les pierres dans les endroits humides, au bord de l'eau. Avril. Gevrey, au bord d'un fossé près du bois dans la plaine. Beaume-la-Roche, coteau au-dessus de l'entrée du tunnel de Blaisy.

121. A. ERUDITUS. *Dej.* Rare. Sous les pierres et les mousses, dans les lieux humides au bord de l'eau. Avril. Beaume-la-Roche, coteau au-dessus de l'entrée du tunnel de Blaisy. (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

122. A. PYGMEUS. *Sturm.* — STRENUUS. *Panz.* Pas commun. Sous les pierres, les mousses et les détritits au bord de l'eau. Mai, juillet, août, septembre, octobre. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés ; bord de l'Ouche près du glacis qui est au-dessus du moulin Vesson. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sous les détritits dans le bois d'aulnes. (Pontailler ; mousses humides dans les bois. — M. Dudrumet.) (Rouvray. — M. Emy.)

123. A. DEPRESSUS. *Dej.* Pas commun. Sous les pierres dans les combes boisées et un peu humides. Avril, mai. Flavignerot. Fixin. Chambolle. (Beaune.—M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)







OMASEUS. Ziegl. — FERONIA. Dej.

124. O. MELANARIUS. *Ill.* Commun. Sous les pierres, surtout dans les bois. Printemps, automne. Dijon, derrière le mur du Parc du côté de Longvic; bord de Suzon, janvier; Combe-aux-Serpents. Flavignerot. Fixin. Chambolle. (Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

125. O. NIGRITUS. *F.* Commun. Sous les pierres dans les endroits humides au bord de l'eau. Mars, avril, mai, septembre, octobre. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; bords de l'Ouche et de Suzon; contre-fossé au midi du Canal près du chemin de fer de Paris à Lyon. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sous les détritits dans le bois d'aulnes. (Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

126. O. ANTHRACINUS. *Ill.* Commun. Avec le précédent, aux mêmes époques et absolument dans les mêmes localités. Dijon. Gevrey. (Savigny. Rouvray.)

127. O. MINOR. *Dej.* Assez commun. Sous les pierres dans les endroits bas et humides au bord de l'eau. Avril, mai, juin, août, septembre, octobre. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés, très-commun; contre-fossé au midi du Canal, près le chemin de fer. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sous les détritits dans le bois d'aulnes. (Rouvray. — M. Emy.)

Variété GRACILIS. *Sturm.* Pas commun. Sous les pierres dans les endroits humides dans le voisinage de l'eau. Avril. Dijon, contre-fossé au midi du Canal près du chemin de fer; au bas du mur au nord du clos de Pouilly, près du chemin de Ruffey. Combe de Flavignerot. (Environs de Beaune. — M. Arias.)

128. O. ATERRIMUS. *F.* (Rouvray; très-rare. — M. Emy.)

STEROPUS. *Meg.* — FERONIA. *Dej.*

129. S. MADIDUS. *F.* — Variété CONCINNUS. *Sturm.* Commun. Sous les pierres, les mousses et les feuilles mortes dans les bois. Printemps. Flavignerot. Fixin. Gevrey. Chambolle. (Environs de Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

PLATYSMA. *Bon.* — FERONIA. *Dej.*

130. P. PICIMANA. *Duft.* Rare. Sous les pierres et les détritits au bord de l'eau. Avril, mai. (Dijon, le long de l'Ouche, sous les détritits amassés par les inondations, surtout près du moulin Vesson; Semur, sous les pierres au sommet des montagnes, dans les champs; avril. — M. *Nodot.*) (Genay, près Semur; assez commun. — M. *Emy.*)

131. P. OBLONGO PUNCTATA. *F.* (Dijon; rare. — M. *Nodot.*, d'après M. *Emy.*) (Beaune; un seul exemplaire trouvé dans une prairie, au printemps. — M. *Arias.*)

PTEROSTICHUS. *Bon.* — FERONIA. *Dej.*

132. P. STRIATUS. *Payk.* — NIGER. *F.* (Pontailleur-sur-Saône. — M. *Dudrumet.*) (Rouvray; pas commun. — M. *Emy.*)

133. P. PARUM PUNCTATUS. *Dej.* Commun. Sous les pierres dans les endroits frais et un peu humides des bois de montagne. Avril, mai. Combes de Flavignerot. Fixin. Gevrey. Chambolle. (Environs de Beaune; printemps, automne. — M. *Arias.*) (Rouvray; très-commun sous les pierres dans les ruisseaux desséchés dans les bois. — M. *Emy.*)







ABAX. *Bon.* — *FERONIA. Dej.*

134. A. STRIOLA. *F.* Commun. Sous les pierres, les arbres abattus, les mousses dans les bois. Avril, mai. Flavignerot. Fixin. Gevrey. Chambolle. (Savigny, près Beaune, Fontaine-Froide. — MM. *Pérangolo* et *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

135. A. FRIGIDUS. *F.* — OVALIS. *Meg.* Rare. Sous les pierres dans les combes de Fixin et Gevrey. Mai. (Savigny, près Beaune, Fontaine-Froide. — MM. *Pérangolo* et *Arias.*) (Rouvray; pas rare. — M. *Emy.*)

136. A. PARALLELUS. *Duft.* Commun. Sous les pierres dans les bois. Avril, mai. Combe de Flavignerot. Fixin. Gevrey. Chambolle. (Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide. — MM. *Pérangolo* et *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

MOLOPS. *Bon.* — *FERONIA. Dej.*

137. M. TERRICOLA. *F.* Assez commun. Sous les pierres et les feuilles mortes dans les bois. Avril, mai. Flavignerot. Marsannay-la-Côte, fontaine près du parc de Gouville. Fixin. Gevrey, bois de la plaine et de la montagne. Chambolle. (Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide. — MM. *Arias* et *Pérangolo.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

BROSCUS. *Panz.* — *CEPHALOTES. Bon.*

138. B. CEPHALOTES. *Linn.* — VULGARIS. *Bon.* Pas commun. Dans les champs, sous les pierres, ou courant par terre. Août. Tart-le-Haut. (Flavignerot. — M. *Dudrumet.*)

STOMIS. *Clairv.*

139. S. PUMICATUS. *Panz.* Pas commun. Sous les pierres au bord de l'eau dans les endroits humides. Mars, avril, mai.

Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; bord de l'Ouche près du moulin Vesson. Ahuy, bord de Suzon près du lavoir. Gevrey, au bas de la levée du grand étang de Satenay. (Beaune; rare — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

ZABRUS. *Clairv.*

140. Z. GIBBUS. *F.* Assez commun. Sous les pierres, ou courant par terre, le soir surtout, dans les champs et sur les chemins peu fréquentés. Août. Dijon, presque partout autour de la ville dans les champs de blé après la moisson, du côté d'Ahuy, de Mirande, etc. (Beaune; printemps, automne; pas commun. — M. *Arias.*)

AMARA. *Bon.*

141. A. LIVIDA. *F.* — BIFRONS. *Gyll.* Rare. Environs de Dijon.

142. A. STRIATOPUNCTATA. *Dej.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

143. A. COMMUNIS. *F.* — SIMILATA. *Gyll.* (Rouvray; pas commune. — M. *Emy.*)

144. A. OBSOLETA. *Duft.* Pas rare. Sous les pierres au bord des chemins et courant par terre. Avril. Dijon, Allée-de-la-Retraite; mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles, etc. Flavignerot, dans la combe. (Beaune; printemps; pas commune. — M. *Arias.*)

145. A. ACUMINATA. *Payk.* — EURYNOTA. *Kugel.* Assez rare. Sous les pierres dans les endroits humides, au printemps. Dijon. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — bord des chemins dans les endroits humides. Printemps. M. *Emy.*)

146. A. TRIVIALIS. *Gyll.* Commune. Sous les pierres au Dijon, chemin près du deuxième contrefossé au midi du Canal, etc. (Beaune. — M. *Arias.*)





147. A. VULGARIS. *Linn.* Rare. Sous les pierres. Dijon. (Beaune; errante au printemps. — M. *Arias.*)

148. A. CURTA. *Dej.* Rare. Environs de Dijon. (Beaune; sous les pierres ou errante, au printemps. — M. *Arias.*)

149. A. ÆNEA. *Meg.* — COMMUNIS. *Dej.* Pas commune. Sous les pierres et les écorces du pied des arbres. Printemps, hiver. Dijon, bord de l'Ouche.

150. A. FAMILIARIS. *Duft.* Commune. Sous les pierres ou courant par terre. Printemps, automne. Dijon, presque partout; dans les cours et les jardins dans l'intérieur même de la ville; fontaine près de l'Asile des aliénés; chemin de Chenôve; cours du Parc, derrière le mur du Parc du côté de Longvic, etc. Flavignerot, dans la combe. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

151. A. TIBIALIS. *Payk.* (Rouvray; rare. — M. *Emy.*)

152. A. CONSULARIS. *Duft.* Assez commune. Sous les pierres au bord des chemins. Printemps. Dijon, chemins au nord et à l'ouest de la ville; lit de Suzon près la route d'Auxonne, contre la prison, etc. (Beaune; errante au printemps; un seul exemplaire. — M. *Arias.*)

153. A. APRICARIA. *F.* Pas commune. Dijon. (Beaune; sous les pierres au printemps; rare. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

154. A. FERRUGINEA. *Linn.* — FULVA. *De Gêér.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

155. A. SPINIPES. *Linn.* — AULICA. *Ill.* Pas rare. Sous les pierres ou courant par terre dans les champs et sur la lisière des bois. Printemps, été. Dijon, au bord des chemins près de la ville. Combe de Flavignerot. Plombières, combe de Neuvon, en fauchant. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

156. A. CRENATA. *Dej.* Rare. Environs de Dijon.

ACINOPUS. *Ziegl.*

157. A. MEGACEPHALUS. *Rossi.* — BUCEPHALUS. *Dej.* (Beaune; sous les pierres; juin. — M. *Arias.* Au bord du chemin de Savigny-sous-Beaune; 5 juillet. — M. *Péragallo.*)

ANISODACTYLUS. *Dej.*

158. A. SIGNATUS. *Ill.* Rare. Longvic, sur la boue au bord de l'Ouche du côté de Dijon, dans un endroit où l'eau est presque stagnante. (Beaune; un seul exemplaire pris sur une graminée en mai. — M. *Arias.*)

159. A. BINOTATUS. *F.* Pas rare. Sous les pierres dans les endroits humides au bord de l'eau. Printemps, été, automne. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; contre-fossé au midi du Canal; bord de l'Ouche près du moulin Vesson. Chevigny-Saint-Sauveur, fossé au nord du petit bois qui est devant le château. (Beaune; sur les plantes et sous les pierres; printemps. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

Variété SPURCATICORNIS. *Ziegl.* Pas rare. Egalement dans les endroits humides au bord de l'eau; mêmes localités que le type de l'espèce. Trouvée, en outre, dans la combe de Flavignerot, et à Gevrey au bas de la levée du grand étang de Satenay. (Beaune; rare. — M. *Arias.*) (Rouvray; pas commun. — M. *Emy.*)

DIACHROMUS. *Erich.* — HARPALUS. *Latr.*

160. D. GERMANUS. *Linn.* Sous les pierres et sur les graminées dans les endroits humides, surtout au bord des ruisseaux; sur l'herbe des prés, le soir principalement. Mars à juillet. Dijon, très-rare; derrière le mur du Parc du côté de Longvic; combe Saint-Joseph. Chevigny-Saint-Sauveur, pré au bord du ruisseau au nord du petit bois qui est devant le







château; pas rare. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant. (Fauverney, près la ferme de la Bayotte, sur les prés au bord d'un fossé. — M. *Nodot.*) Gilly, sur les prés; commun. Gevrey, sur la lisière du bois près du grand étang de Satenay. Saint-Nicolas-lez-Cîteaux, dans la forêt de Cîteaux, en fauchant. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray; pas commun. — M. *Emy.*)

OPHONUS. *Ziegl.* — *HARPALUS*. *Latr.*

161. O. COLUMBINUS. *Germ.* Rare. Environs de Dijon.

162. O. SABULICOLA. *Panz.* Rare. Environs de Dijon. (Beaune; sous les pierres dans les endroits humides, au printemps; pas commun. — M. *Arias.*) (Rouvray; pas commun. — M. *Emy.*)

163. O. OBSCURUS. *F.* — *MONTICOLA*. *Dej.* Je n'ai trouvé cette espèce que dans la combe de Flavignerot, au bord du pré, du côté de La Cude, dans les parties humides. Fin avril, commencement de mai. Pas rare. (Beaune; sous les pierres dans les endroits humides; printemps; pas commun. — M. *Arias.*)

164. O. DIFFINIS. *Dej.* Très-rare. Environs de Dijon.

165. O. ROTUNDICOLLIS. *Dej.* — *OBSCURUS*. *Dej.* Pas rare. Sous les pierres dans les lieux humides près de l'eau. Avril, juillet. Dijon, derrière le mur du Parc du côté de Longvic; au bas du mur au nord du clos de Pouilly; fontaine de Larrey, le soir au vol. (Fixin. — M. *Tarnier.*)

166. O. OBLONGIUSCULUS. *Dej.* Très-rare. Sous les pierres au bord de l'eau. Avril. Dijon, bord de l'Ouche près du moulin Vesson; (derrière le Parc, sur le sable. — M. *Nodot.*)

167. O. PUNCTATULUS. *Duft.* Très-rare. Environs de Dijon.

168. O. CHLOROPHANUS. *Zenk.* Commun. Sous les pierres ou courant par terre au bord des chemins. Mars à juin. Dijon, chemins du côté de Fontaine; derrière le mur du Parc du côté de Longvic, etc. Fixin. Chambolle, etc. Villenote,

près Semur, sur la montagne au nord du village; septembre. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

169. O. *CORDATUS*. *Duft*. Pas commun. Environs de Dijon.

170. O. *RUPICOLA*. *Sturm*. — *SUBCORDATUS*. *Dej*. Assez commun. Sous les pierres dans les lieux humides. Avril. Dijon, bord de l'Ouche près du moulin Vesson. Combe de Flavignerot. (Fixin. — M. *Tarnier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

171. O. *PUNCTICOLLIS*. *Payk*. Pas commun. Environs de Dijon. (Rouvray; commun. — M. *Emy*.)

172. O. *RUFIBARBIS*. *F*. — *BREVICOLLIS*. *Dej*. Commun. Sous les pierres au bord des chemins, dans les champs, etc. Printemps, automne. Dijon, chemins du côté de Fontaine, etc. Ahuy, bord de Suzon près du lavoir. (Beaune; pas commun. — M. *Arias*.)

173. O. *MENDAX*. *Rossi*. (Pontailler-sur-Saône, bois humides au bord de la Saône. — M. *Dudrumet*.)

#### HARPALUS. *Latr*.

174. H. *RUFICORNIS*. *F*. Très-commun. Sous les pierres dans les endroits humides, et au vol à l'entrée de la nuit, la nuit même, en plaçant une lumière dans le voisinage des lieux où se tiennent cachés ces insectes pendant le jour. Avril, mai, juin, juillet. Dijon, derrière le Parc du côté de Longvic; bord de l'Ouche près du moulin Vesson; bord du ruisseau qui sort du clos de Pouilly; fontaine de Larrey, etc. Flavignerot, dans la combe. (Fixin. Chevigny-Saint-Sauveur, près du ruisseau vers le petit bois. — M. *Tarnier*.) (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

175. H. *GRISEUS*. *Panz*. Moins commun que le précédent; mêmes localités et mêmes époques d'apparition; vole aussi le soir. (Beaune. — M. *Bourtier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

176. H. *ÆNEUS*. *F*. Très-commun. Sous les pierres, au bord des chemins au pied des murs, etc. Au vol, par les temps chauds du premier printemps, lorsqu'il fait un







beau soleil. Mars, avril. Dijon, bord des chemins autour de la ville; derrière le mur du Parc du côté de Longvic; bord de Suzon, etc. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

Variété *CONFUSUS*. *Dej.* Rare. Sous les pierres aux environs de Dijon.

177. H. *DISTINGUENDUS*. *Duft.* Très-commun. Sous les pierres dans les endroits un peu humides, et au vol au printemps. Dijon, au vol dans la ville et au cours du Parc; chemin près du deuxième contre-fossé au midi du Canal, etc. Talant, au bord de la mare à l'ouest du village, ainsi que la variété bleue. (Beaune. — M. *Arias.*)

178. H. *HONESTUS*. *Duft.* Commun. Sous les pierres. Janvier, avril, mai, août. Dijon, derrière le mur au nord du clos de Pouilly; derrière le mur du Parc du côté de Longvic; bord de Suzon; aux Perrières; promenade de Montchapet, sur un mur à l'ombre, etc. (Fixin. — M. *Tarnier.*) (Gevrey. — M. *Dudrumel.*) (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

179. H. *SULPHURIPES*. *Germ.* Rare. Environs de Dijon.

180. H. *DISCOIDEUS*. *F.* — *PERPLEXUS*. *Dej.* Rare. Environs de Dijon

181. H. *CALCEATUS*. *Duft.* Rare. Marsannay-la-Côte, sous les pierres à l'entrée de la combe de Gouville. (Beaune. — M. *Arias.*)

182. H. *HOTTENTOTA*. *Duft.* Assez commun. Printemps, été. Dijon, trouvé plusieurs fois dans des cours et des jardins dans l'intérieur de la ville, sous des pots de fleurs ou de petits amas de branches, d'herbe ou de feuilles; trouvé aussi, à l'aide d'une lumière, courant par terre le soir au milieu des *blaps*. Combe de Flavignerot, sous les pierres. (Beaune; un seul exemplaire courant par terre. — M. *Arias.*)

183. H. *FULVIPES*. *F.* — *LIMBATUS*. *Duft.* Pas commun. Sous les pierres dans les montagnes au bord des bois. Avril, mai. Combe de Flavignerot, au bord du pré.

184. H. LUTEICORNIS. *Duft.* Pas commun. Comme le précédent. Flavignerot.

185. H. LEVICOLLIS. *Duft.* — SATYRUS. *Knoch.* Pas rare. Sous les pierres dans les bois des montagnes dans les endroits un peu frais. Avril, mai, août. Combe de Flavignerot. Fixin. Chambolle.

186. H. RUBRIPES. *Duft.* Pas rare. Sous les pierres. Printemps. Combe de Flavignerot. Villenote, près Semur, sur la montagne au nord du village; septembre. (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

187. H. SEMIVIOLEACEUS. *Brongn.* Très-commun. Sous les pierres au bord des chemins, dans les champs, au bas des murs, etc. Mars, avril, septembre, octobre. Dijon, au bord des chemins du côté de Fontaine, de Chenôve, etc.; bord de l'Ouche, sous les pierres et au pied d'un saule carié. (Pontailler; mousses humides. — M. Dudrumel.) (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

188. H. TENEBROSUS. *Dej.* Rare. Environs de Dijon.

189. H. SOLIERI. *Dej.* Très-rare. Environs de Dijon.

190. H. MELANCHOLICUS. *Dej.* Très-rare. Environs de Dijon.

191. H. TARDUS. *F.* Commun. Sous les pierres au bas des murs et au bord des chemins. Printemps. Dijon, chemins peu fréquentés autour de la ville; derrière le Parc du côté de Longvic, etc. (Beaune; rare. — M. Arias.)

192. H. SERRIPES. *Quensel.* Commun. Comme le précédent. Dijon. (Beaune. — M. Arias.)

193. H. ANXIUS. *Duft.* Pas commun. Sous les pierres dans les lieux humides. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; octobre. (Beaune; printemps. — M. Arias.)

194. H. SERVUS. *Duft.* Pas commun. Sous les pierres dans les endroits un peu humides. Printemps. Dijon, bord de l'Ouche près du moulin Vesson. (Beaune; rare. — M. Arias.)





STENOLOPHUS. *Meg.*

195. S. VAPORARIORUM. *Meg.* Assez commun. Sous les pierres dans les endroits humides, surtout près de l'eau. Avril, mai, juin, octobre. Dijon, rare; fontaine près de l'Asile des aliénés; combe Saint-Joseph, janvier; chemin de Morvau, près de Mirande, au bord d'un fossé. Flavignerot, dans la combe. Corcelles-les-Monts, près d'une petite fontaine qui se trouve dans les champs à l'est du Mont-Afrique. (Combe de Fixin. — M. Tarnier.) Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant. (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

196. S. MELANOCEPHALUS. *Findel.* — VAPORARIORUM. Variété NIGRICEPS. *Dej.* Commun. Sous les pierres et les mousses dans les lieux humides au bord de l'eau. Avril, mai, juin, juillet, octobre. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; contre-fossé au midi du Canal près du chemin de fer de Paris à Lyon; fontaine de Larrey, le soir au vol en mai par un temps très-chaud, et la journée au bord du ruisseau; bord du ruisseau qui sort du clos de Pouilly, sous les feuilles mortes, au pied des saules. Chevigny-Saint-Sauveur, au bord du ruisseau qui est au nord du petit bois du château. (Beaune. — M. Arias.)

197. S. ELEGANS. *Dej.* Rare. Sous les pierres dans les endroits humides, et au vol le soir par les temps très-chauds. Mai. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; sur un chemin au nord de la ville, au vol. Flavignerot, près de la fontaine au bas du château. (Rouvray; pas rare, sous les détritrus dans les mares desséchées. — M. Emy.)

198. S. VESPERTINUS. *Ill.* (Rouvray. — M. Emy.)

ACUPALPUS. *Latr.*

199. S. CONSPUTUS. *Duft.* Très-rare. Un seul exemplaire trouvé à la fontaine de Larrey, le soir, au vol, le 12 juin, par un temps très-chaud.

200. S. SUTURALIS. *Ziegl.* (Rouvray. — M. Emy.)

201. *S. BRUNNIPES*. *Duft.* — *ATRATUS*. *Dej.* Rare. Sous les pierres dans les endroits humides. Environs de Dijon.

202. *S. DORSALIS*. *F.* (Beaune; sous les pierres, au printemps; rare. — *M. Arias.*)

203. *S. MERIDIANUS*. *Linn.* Commun. Sous les pierres, surtout dans les endroits humides. Printemps, automne, quelquefois en hiver. Dijon, bord de l'Ouche; mur derrière le Parc du côté de Longvic; contre-fossé au midi du Canal, etc. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

204. *S. FLAVICOLLIS*. *Sturm.* — *LURIDUS*. *Dej.* Commun. Sous les pierres dans les endroits humides au bord de l'eau. Printemps, automne. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; au bas du mur du clos de Pouilly près le chemin de Ruffey, sous les feuilles mortes; au bas du mur de Montmuzard, près du petit ruisseau contre la route de Gray. Plombières, combe de Neuvon, en fauchant. Marsannay-la-Côte, dans la combe; en fauchant. Saint-Nicolas-lez-Cîteaux, au bord du chemin dans la forêt, en fauchant.

205. *S. NIGRICEPS*. *Dej.* Pas commun. Sous les pierres dans les endroits humides près de l'eau. Printemps. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; bord de l'Ouche, etc.

206. *S. EXIGUUS*. *Dej.* Pas commun. Sous les pierres au bord de l'eau. Printemps. Dijon, contre-fossé au midi du Canal près du chemin de fer de Paris à Lyon, etc.

*BRADYCELLUS*. *Erich.* — *ACUPALPUS*. *Latr.*

207. *B. RUFULUS*. *Dej.* Gevrey, bord du grand étang de Satenay, sous les pierres, et le soir au vol. Rare; trouvé seulement deux exemplaires. Avril, juin.

*HISPALIS*. *Rambur.* — *ACUPALPUS*. *Latr.*

208. *H. METALLESCENS*. *Dej.* Pas commune. Sous les pierres dans les endroits humides. Avril, juin. Dijon, derrière le







mur du Parc du côté de Longvic. Saint-Nicolas-lez-Cîteaux, dans la forêt, en fauchant. (Beaune; errante; printemps. — M. *Arias*.) (Rouvray; assez rare. — M. *Emy*.)

TRECHUS. *Clairv.*

209. T. DISCUS. *F.* Très-rare. Au vol, le soir, par les temps très-chauds, au bord de l'eau. Juin, juillet. Dijon, fontaine de Larrey; bord de l'Ouche près du moulin Bernard. Gevrey, chemin de Saulon, au bord du grand étang de Satenay; sous les détritres près du petit étang de Satenay, dans le bois d'aulnes; août, septembre.

210. T. LONGICORNIS. *Sturm.* — LITTORALIS. *Ziegl.* Très-rare. Dijon, sablière près de l'Allée-de-la-Retraite, dans le sable au bord de l'eau. Avril. (Beaune; rare près de la station du chemin de fer; avril. — M. *Péracallo*.)

211. T. MINUTUS. *F.* — RUBENS. *Clairv.* Très-commun. Sous les mousses, les feuilles sèches, les détritres, les écorces du bas des arbres, etc.; dans les endroits humides, surtout au bord de l'eau, et au vol par les soirées très-chaudes. Printemps, été. Dijon, Parc, sous les écorces de platane et d'autres arbres; fontaine de Larrey, sous les écorces de saule, et surtout au vol. Plombières, combe de Neuvo, en fauchant. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Beaune; bord des ruisseaux; pas commun. — M. *Arias*.) (Rouvray; commun. — M. *Emy*.)

212. T. SECALIS. *Payk.* (Rouvray; pas commun; sous les mousses au pied des aulnes dans les ruisseaux en partie desséchés. — M. *Emy*.)

BEMBIDIUM. *Latr.* — BLEMUS. *Ziegl.*

213. B. AREOLATUM. *Creutz.* Assez commun. Dijon, dans le sable fin et humide; au bord de l'Ouche, entre le Parc

et Longvic. Mai à août. (Rouvray. Montberthaut, bord du Serein, sous les petites pierres roulées ou le gros sable. — M. Emy.)

*TACHYS. Meg.*

214. B. BISTRIATUM. *Duft.* Assez commun. Sous les pierres et les détritrus dans les endroits humides au bord de l'eau. Printemps, automne. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; contre-fossé au midi du Canal près du chemin de fer de Paris à Lyon; bord de l'Ouche près du moulin Vesson; mur au nord du clos de Pouilly. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, dans le bois d'aulnes. (Pontailleur; mousses humides. — M. *Dudrumel.*) (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

215. B. PLATYPTERUS. *Sturm.* — RUFESCENS. *Dej.* (Rouvray; bord du ruisseau près du moulin Bierry; 7 mai. — M. *Emy.*)

216. B. QUINQUE STRIATUM. *Gyll.* — PUMILIO. *Duft.* Trouvé assez communément sous des écorces de noyer à Dijon, dans un jardin donnant sur le rempart du Château. Chambolle, au vol dans le village.

217. B. QUADRISIGNATUM. *Duft.* Très-rare. Trouvé sur le sable humide au bord de l'Ouche derrière le Parc, au-dessous du pont du chemin de fer de Besançon, le 6 septembre.

*NOTAPHUS. Meg.*

218. B. UNDULATUM. *Sturm.* Pas rare. Sous la mousse et sur la boue humide au bord de l'eau. Printemps, été, automne. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; fontaine de Larrey; bord de l'Ouche; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite, dans le sable humide au bord de l'eau.

219. B. USTULATUM. *Linn.* Pas commun. Sur la boue humide au bord de l'eau. Juillet. Dijon, bord de l'Ouche. (Beaune; bord des ruisseaux et des mares; commun. — M. *Arias.*)





*BEMBIDIUM. Meg.*

220. *B. AEROSUM. Erich.* — *STRIATUM. F.* Commun. Sur le sable et la boue humide au bord de l'eau. Mars, avril, juillet, août. Dijon, bord de l'Ouche, surtout derrière le Parc du côté de Longvic. (Rouvray. — *M. Emy.*)

221. *B. BIPUNCTATUM. Linn.* (Beaune; bord des ruisseaux et des mares; rare; printemps. — *M. Arias.*)

*PERYPHUS. Meg.*

222. *B. MODESTUM. F.* Très-rare. Dijon, bord de l'Ouche derrière le Parc du côté de Longvic, sur le sable humide. Juillet.

223. *B. RUPESTRE. Ill.* Commun. Sur le sable humide au bord de l'eau. Presque toute l'année, mais surtout par les basses eaux. Dijon, bords de l'Ouche et de Suzon; fontaine près de l'Asile des aliénés. Blaisy, bord du ruisseau au midi du village. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

224. *B. ANDRÆ. F.* — *CRUCIATUM. Dej.* (Dijon. — *M. Nodot*, d'après *M. Emy.*)

225. *B. FEMORATUM. Gyll.* Rare. Sables humides au bord de l'eau. Dijon, bord de l'Ouche derrière le Parc; août; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite; fin avril.

226. *B. CURSOR. F.* — *OBSOLETUM. Dej.* (Beaune; un seul exemplaire au printemps. — *M. Arias.*)

227. *B. COERULEUM. Dej.* Environs de Dijon; très-rare.

228. *B. TIBIALE. Duft.* (Beaune; bord des ruisseaux et des mares; rare. — *M. Arias.*)

229. *B. DECORUM. Zenker.* Très-commun. Sur le sable au bord de l'eau. Printemps, été. Dijon, bord de l'Ouche derrière le Parc; sablières près de l'Allée-de-la-Retraite et de la route d'Auxonne. (Rouvray. — *M. Emy.*)

230. *B. RUFIPES. Ill.* Pas rare. Sur le sable et le sol humide au bord de l'eau. Printemps, été, automne; quelquefois en hiver. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; fontaine de Larrey; bord de Suzon; sur la barrière au-dessus du débarcadère du chemin de fer, etc. Blaisy-Bas, au bord



du ruisseau près du bois. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sous les détrit. (Rouvray; sur le sable au bord du ruisseau près du moulin Bierry. — M. Emy.)

Variété BRUNNICORNE. *Dej.* (Rouvray. — M. Emy.)

231. B. ELONGATUM. *Dej.* (Rouvray; avec le *Trechus secalis*. — M. Emy.)

LEJA. *Meg.*

232. B. VELOX. *Erichs.* (Beaune; bord des mares; printemps. — M. Arias.)

233. B. CELERE. *F.* Commun. Sous les détrit. et les pierres dans les lieux humides et voisins de l'eau. Avril, mai, juin. Dijon, bord de Suzon; mur au nord du clos de Pouilly; contre-fossé au midi du Canal près du chemin de fer de Paris à Lyon. Fixin, dans le bois près du chemin de fer, sous des ételles humides dans une coupe. Chambolle, au vol dans le village. (Beaune. — M. Arias.)

234. B. STURMII. *Panz.* Rare. Endroits humides au bord de l'eau. Printemps. Dijon, contre-fossé au midi du Canal près du chemin de fer; chemin de la rente de Morvau, au bord d'un fossé humide.

235. B. TENELLUM. *Erichs.* Dijon; un seul exemplaire trouvé au bord du ruisseau de la fontaine près de l'Asile des aliénés; 9 octobre.

236. B. MINIMUM. *F.* — PUSILLUM. *Gyll.* Dijon; un seul exemplaire trouvé sur le sable humide au bord de l'eau d'une sablière près de la route d'Auxonne; 16 avril. (Rouvray; commun. — M. Emy.)

237. B. PULCHRUM. *Gyll.* Environs de Dijon; un seul exemplaire.

238. B. ASSIMILE. *Gyll.* Très-commun, à Dijon; sous les pierres et les détrit. au bord de l'eau du contre-fossé au midi du Canal près du chemin de fer; fin février, mars, mai. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sous les détrit. dans le bois d'au lues; septembre. (Rouvray. — M. Emy.)

239. B. ORTUSUM. *Sturm.* Pas commun. Sous les pierres,





les mousses et les détritrus dans les lieux humides au bord de l'eau. Printemps, automne. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; mur au nord du clos de Pouilly. (Rouvray; commun. — M. Emy.)

240. B. GUTTULUM. *F.* Pas commun. Bord de l'eau sous les pierres et les détritrus. Printemps, automne. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; Parc, au vol. Gevrey, bord du petit étang de Satenay.

241. B. BIGUTTATUM. *F.* Commun; comme le précédent dans les mêmes localités et aux mêmes époques. (Beaune; rare. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

242. B. VULNERATUM. *Dej.* Commun. Comme les précédents; trouvé, en outre, sur les bords de l'Ouche.

243. B. ÆNEUM. *Germ.* (Beaune; un seul exemplaire; printemps. — M. Arias.)

*LOPHA. Meg.*

244. B. QUADRIGUTTATUM. *Pontopp.* Commun. Sur le sable et la terre humide au bord de l'eau. Printemps, été, automne. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; bords de l'Ouche et de Suzon; sablières près de l'Allée-de-la-Retraite et de la route d'Auxonne. Blaisy-Bas, bord du ruisseau près du bois. (Beaune; rare. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

245. B. LATERALE. *Dej.* Rare. Dijon; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite; printemps.

246. B. QUADRIPUSTULATUM. *F.* Rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. Emy.)

247. B. QUADRIMACULATUM. *Linn.* Commun. Comme le *Quadriguttatum*. (Beaune; rare. — M. Arias.) (Rouvray; commun. — M. Emy.)

248. B. ARTICULATUM. *Panz.* Très-commun. Au bord des eaux stagnantes et courantes, sur le sable et la terre humide et sous les pierres. Printemps, automne. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; bords de l'Ouche et de Suzon; contre-fossé au midi du Canal près du chemin de fer; sa-

blières près de la route d'Auxonne. Talant, mare à l'ouest du village. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

*TACHYPUS. Meg.*

249. B. *PALLIPES.* *Duft.* (Beaune; sous des plantes; printemps et automne. — M. *Arias.*)

250. B. *FLAVIPES.* *Linn.* Pas commun. Sur la terre humide près de l'eau. Printemps, automne. Dijon, bord de l'Ouche; barrière au-dessus du débarcadère du chemin de fer. Flavignerot, près de la fontaine. Gevrey, en fauchant dans la combe près de la fontaine, et près du petit étang de Satenay sous les détritits dans le bois d'aulnes. (Beaune; sous des plantes; printemps et automne. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

---

## DYTISCI.

---

*DYTISCUS. Linn.*

251. D. *DINIDIATUS.* *Bergst.* (Auxonne. — M. *Tarnier.*)

252. D. *PUNCTULATUS.* *F.* Commun. Dans les eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, lit de Suzon, lorsque l'eau commence à se retirer et à ne plus couler; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite, etc. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

253. D. *MARGINALIS.* *Linn.* Commun. Comme le précédent et dans les mêmes lieux. Dijon. (Beaune. Rouvray.)

254. D. *CIRCUMFLEXUS.* *F.* Pas commun. Dijon, sablière près de l'Allée-de-la-Retraite. Printemps. (Beaune; mares. — M. *Arias.*)







ACILIUS. *Leach.*

255. A. SULCATUS. *Linn.* Pas rare. Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, sablière près de l'Allée-de-la-Retraite; fontaine Sainte-Anne; bas des tours du Château, etc. Chambolle, fontaine de Chaignot sur la montagne. Villenote, près Semur. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

HYDATICUS *Leach.*

256. H. HYBNERI. *F.* Rare. Eaux stagnantes. Environs de Dijon. (Beaune; mares; automne; pas commun. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

257. H. TRANSVERSALIS. *F.* Rare. Environs de Dijon. Eaux stagnantes.

GRAPHODERUS. *Esch.*

258. H. CINEREUS. *Linn.* Rare. Eaux stagnantes. Dijon. (Beaune; mares; automne; pas commun. — M. *Arias.*)

CYBISTER. *Curtis.* — TROCHALUS. *Esch.*

259. C. ROESELII. *F.* Rare. Dijon, Creux-d'Enfer. (Ponttailler-sur-Saône, dans un fossé au bord de la Saône; octobre. — M. *Dudrumel.*) (Beaune; près d'une mare; automne. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

COLYMBETES. *Clairv.* — CYMATOPTERUS. *Esch.*

260. C. FUSCUS. *Linn.* Commun. Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, bas des tours du Château; bas du glacis au-dessus du moulin Vesson; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

RANTUS. *Esch.*

261. C. CONSPERSUS. *Gyll.* — NOTATUS. *F.* Commun. Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, bas des tours du

Château; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite. Villenote, près Semur; septembre. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

262. C. NOTATUS. *F.* (Beaune; mares; pas commun. — M. *Arias*.)

263. C. COLLARIS. *Payk.* — ADSPERSUS. *F.* Pas commun. Eaux stagnantes. Printemps. Dijon, sablière près de l'Allée-de-la-Retraite. (Beaune. — M. *Arias*.)

264. C. ADSPERSUS. *F.* — AGILIS. *F.* Rare. Eaux stagnantes. Printemps. Dijon, sablière près de l'Allée-de-la-Retraite. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

ILYBIUS. *Erich.* — COLYMBETES. *Clairv.*

265. I. ATER. *De Gêr.* Pas rare. Automne. Dijon, fossés du Château. (Beaune. — M. *Arias*.)

266. I. QUADRIGUTTATUS. *Dej.* (Beaune; mares; pas commun; automne. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

267. I. FENESTRATUS. *F.* (Rouvray; rare. — M. *Emy*.)

268. I. FULIGINOSUS. *F.* Pas rare. Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, bas des tours du Château; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

269. I. MERIDIONALIS. *Dej.* (Dijon, sablière près de l'Allée-de-la-Retraite; printemps. — M. *Tarnier*.)

AGABUS. *Leach.* — LIOPTERUS. *Esch.*

270. A. AGILIS. *F.* — OBLONGUS. *Ill.* Rare. Dijon, sablière près de l'Allée-de-la-Retraite; printemps.

COLYMBETES. *Clairv.*

271. A. FEMORALIS. *Payk.* (Rouvray. — M. *Emy*.)

272. A. STURMI. *Sch.* (Rouvray; rare; mare de la Corne-des-Trois-Bois. — M. *Emy*.)

273. A. CHALCONOTUS. *Kugel.* — CHALCONATUS. *Panz.* Rare.





Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, sablière près de la route d'Auxonne. Gevrey, mare près de la station du chemin de fer. (Beaune. — M. *Arias*.)

274. A. MACULATUS. *Linn*. Pas rare. Eaux stagnantes et courantes. Printemps, été. Dijon, dans l'Ouche, au bas du glacis au-dessus du moulin Vesson et derrière le Parc du côté de Longvic; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite. (Rouvray; sous les pierres du Rut-de-Bas lorsqu'il est desséché. — M. *Emy*.)

275. A. DIDYMUS. *Oliv*. Pas rare. Eaux stagnantes et courantes. Dijon. (Beaune. — M. *Arias*.)

276. A. BRUNNEUS. *F*. (Rouvray; pas commun; sous les pierres des ruisseaux. — M. *Emy*.)

277. A. PALUDOSUS. *F*. Pas rare. Eaux stagnantes et courantes. Printemps, été, automne. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés, sous la mousse et dans l'eau. Chevigny-Saint-Sauveur, ruisseau au nord du petit bois qui est devant le château. (Beaune; pas commun. — M. *Arias*.) (Rouvray; pas commun. — M. *Emy*.)

278. A. BIPUNCTATUS. *F*. Pas rare. Eaux stagnantes. Printemps, été. Dijon, sablière près de l'Allée-de-la-Retraite. Gevrey, mare près de la station du chemin de fer. (Beaune; décembre. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

279. A. GUTTATUS. *Payk*. Pas commun. Chambolle, dans un seau d'eau dans le village; juin. (Rouvray. — M. *Emy*.)

280. A. NITIDUS. *F*. — BIGUTTATUS. *Oliv*. Pas commun. (Fixin. Gevrey; juin. — M. *Tarnier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

281. A. BIPUSTULATUS. *Linn*. Très-commun. Printemps, été, automne. Eaux stagnantes et courantes. Dijon, bas des tours du Château; sablières près de l'Allée-de-la-Retraite et de la route d'Auxonne; dans l'Ouche, au bas du glacis au-dessus du moulin Vesson, etc. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

LACCOPHILUS. *Leach.*

282. L. HYALINUS. *De Géer.* OBSCURUS. *Panz.* Commun. Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, bas des tours du Château; sablières près de l'Allée-de-la-Retraite et de la route d'Auxonne. Villenote, près Semur; septembre. (Beaune. — M. *Arias.*)

283. L. MINUTUS. *Linn.* Comme le précédent, mais moins commun. Printemps, automne. Dijon, bas des tours du Château. Gevrey, sablière près de la gare du chemin de fer. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

NOTERUS. *Clairv.*

284. N. CRASSICORNIS. *Müller.* — CAPRICORNIS. *Herbst.* Pas commun. Eaux stagnantes. Environs de Dijon. (Beaune; rare; printemps. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

285. N. SPARSUS. *Marsh.* — CRASSICORNIS. *F.* Pas rare. Eaux stagnantes. Automne. Dijon, au bas des tours du Château. (Beaune. — M. *Arias.*)

PAELOBIUS. *Sch.* — HYGROBIA. *Latr.*

286. P. HERMANNI. *F.* Rare. Eaux stagnantes. Printemps. Dijon, sablière près de l'Allée-de-la-Retraite; bas des tours du Château.

HYDROPORUS. *Clairv.*

287. H. DUODECIMPUSTULATUS. *F.* Rare. Trouvé à Dijon vis-à-vis la Combe-aux-Serpents, sous une pierre dans le Canal qui était mis à sec depuis quelques jours.

288. H. ELEGANS. *Ill.* — DEPRESSUS. *F.* Pas commun. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*)

289. H. HALENSIS. *F.* — AREOLATUS. *Ill.* Commun. Eaux







stagnantes. Printemps, automne. Dijon, au bas des tours du Château; lit de Suzon, lorsque l'eau cesse de couler. Corcelles-les-Monts, fontaine de la Combe-aux-Serpents. Gevrey, sablière près de la gare du chemin de fer. Villenote, près Semur.

290. H. PICIPES. *F.* Commun. Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, bas des tours du Château; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite. (Beaune. — M. *Bourlier.*)

291. H. PARALLELOGRAMMUS. *Ahrens.* — *DISTINCTUS. Dej.* — *CONSOBRINUS. Kunze.* Trouvé une seule fois le 19 septembre, à Dijon, au bas des tours du Château.

292. H. DORSALIS. *F.* Pas commun. Environs de Dijon.

293. H. SEXPUSTULATUS. *F.* Commun. Eaux stagnantes. Fin février, mars, printemps et automne. Dijon, au bas des tours du Château; lit de Suzon, lorsque l'eau ne coule plus; sablières près de l'Allée-de-la-Retraite et de la route d'Auxonne; contre-fossé au midi du Canal près du chemin de fer. Gevrey, sablière près de la gare. Villenote, près Semur. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

294. H. PALUSTRIS. *Linn.* (Beaune. — M. *Arias.*)

295. H. ERYTHROCEPHALUS. *F.* Pas commun. Dijon, bas des tours du Château. Septembre.

296. H. PLANUS. *F.* Très-commun. Eaux stagnantes. Printemps. Dijon, sablière près de la route d'Auxonne. Plombières, combe de Neuvo, près d'une source, en fauchant sur l'herbe. Gevrey, sablière près de la gare. Blaisy-Bas, sous les lentilles d'eau, *Lemna*, dans les parties stagnantes du ruisseau au midi du village. Villenote, près Semur; septembre. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

297. H. PUBESCENS. *Gyll.* Pas commun. Environs de Dijon.

298. H. MARGINATUS. *Duft.* — *NEGLECTUS. Dej.* Pas commun. Environs de Dijon.

299. H. PICEUS. *Sturm.* (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

300. *H. NIGRITA. F.* Pas rare. Eaux stagnantes. Printemps. Dijon, sablière près de la route d'Auxonne. Plombières, combe de Neuvo, en fauchant sur l'herbe près d'une source. Gevrey, sablière près de la gare. (Beaune. — *M. Bourlier.*)

301. *H. TRISTIS. Payk.* (Rouvray. — *M. Emy.*)

302. *H. LINEATUS. F.* Rare. Environs de Dijon.

303. *H. FLAVIPES. Oliv.* Pas rare. Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, au bas des tours du Château. Gevrey, sablière près de la gare. (Beaune. — *M. Bourlier.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

304. *H. GRANULARIS. Linn.* Pas rare. Eaux stagnantes. Février, printemps. Dijon, contre-fossé au midi du Canal près du chemin de fer de Paris à Lyon. Gevrey, sablière près de la gare. (Beaune. — *M. Arias.*)

305. *H. GEMINUS. F.* Très-commun. Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, au bas des tours du Château; sablière près de la route d'Auxonne. Villenote, près Semur. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

306. *H. MINUTISSIMUS. Dej.* J'ai trouvé une seule fois un certain nombre d'exemplaires de cette espèce, à Dijon, dans le Canal récemment mis à sec, sous une pierre dans l'écluse qui est vis-à-vis la Combe-aux-Serpents, en août.

307. *H. BICARINATUS. Clairv. — CRISTATUS. Dej.* Pas rare. Gevrey, sablière près de la gare. Avril.

308. *H. PICTUS. F.* Pas commun. Environs de Dijon. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

309. *H. CONFLUENS. F.* Rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — *M. Emy.*)

310. *H. INÆQUALIS. F.* Commun. Dijon, au bas des tours du Château; 19 septembre. (Beaune. — *M. Arias.*)





HYPHYDRUS. III.

311. H. FERRUGINEUS. *Linn.* — OVATUS. *Linn.* Pas rare. Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, sablière près de l'Allée-de-la-Retraite; Canal, lorsqu'il est presque à sec. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray; étang de Pierre-Blanche. — M. *Emy.*)

HALIPLUS. *Latr.*

312. H. ELEVATUS. *Panz.* Rare. Eaux stagnantes et courantes. Printemps, été. Dijon, dans l'Ouche, au bas du glacis qui est avant le moulin Vesson, par les basses eaux; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite; trouvé aussi sur la barrière au-dessus du débarcadère de Dijon.

313. H. OBLIQUUS. *F.* Rare. Dijon, bas des tours du Château. Septembre.

314. H. IMPRESSUS. *F.* — FLAVICOLLIS. *Sturm.* Rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*)

315. H. FULVUS. *F.* — FERRUGINEUS. *Linn.* (Rouvray. — M. *Emy.*) (Dijon, sablière près de l'Allée-de-la-Retraite; mai. — M. *Tarnier.*)

316. H. BADIUS. *Dej.* Rare. Environs de Dijon. (Beaune. M. *Bourlier.*)

317. H. VARIEGATUS. *Erich.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

318. H. CINEREUS. *Aubé.* Commun. Dijon, bas des tours du Château. Septembre.

319. H. RUFICOLLIS. *De Géer.* — IMPRESSUS. *F.* Commun. Dijon, bas des tours du Château. Septembre. (Beaune. — M. *Bourlier.*)

320. H. LINEATOCOLLIS. *Marsh.* — BISTRIOLATUS. *Duft.* Commun. Eaux stagnantes et courantes. Printemps, automne. Dijon, fontaine de Larrey; sablière près de la route d'Auxonne, etc. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

CNEMIDOTUS. III. — HALIPLUS. Latr.

321. C. COESUS. *Duft.* Assez commun. Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, au bas des tours du Château; sablière près de la route d'Auxonne. (Beaune. — M. *Bourlier.*)

322. C. ROTUNDATUS. *Dej.* Rare. Environs de Dijon.

— — —  
**GYRINI.**  
—

GYRINUS. *Geoffroy.*

323. G. MINUTUS. *F.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

324. G. NATATOR. *Linn.* Très-commun. A la surface des eaux stagnantes et quelquefois des eaux courantes. Toute l'année. Dijon, sablières près de l'Allée-de-la-Retraite et près de la route d'Auxonne; fontaine de Larrey; fossés remplis d'eau au bord des chemins; ruisseau qui sort du clos de Pouilly, etc. Gevrey, ruisseau près de la ferme du Pontot sur le chemin de Saulon. Chambolle, etc. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

325. G. BICOLOR. *Payk.* (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

326. G. COLYMBUS. *Erich.* — Variété ELONGATUS. *Dahl.* Rare. Environs de Dijon.

327. G. MARINUS. *Gyll.* Environs de Dijon; rare. (Rouvray; commun. — M. *Emy.*)

Variété DORSALIS. *Gyll.* — M. *Emy* a trouvé plusieurs fois ce joli *Gyrinus* à Rouvray, dans les étangs de Bucher, en juillet.







ORECTOCHILUS. *Esch.*

328. *O. VILLOSUS. F.* Assez commun. Dijon , au-dessous des chutes d'eau , dans les endroits où il y a du sable et où l'eau est tranquille ; dans l'Ouche , au-dessous du glacis du moulin Vesson ; derrière le Parc , au-dessous du barrage, sous les pierres au bord de l'eau et celles qui sont dans l'eau et un peu concaves en dessous ; l'insecte se trouve à la surface inférieure de la pierre , et il faut le chercher dans les mois de juin, juillet et août, lorsque les eaux sont très-basses. Trouvé aussi au Creux-de-la-Poutre , près l'écluse de Larrey , et dans une sablière près de l'Allée-de-la-Retraite. (Environs de Rouvray ; bords du Serein. — M. *Emy.*)

---

**HYDROPHILI.**

---

HELOPHORUS. *F.*

329. *H. RUGOSUS. Oliv.* (Beaune ; sous les pierres au bord des eaux ; pas très-commun. — M. *Arias.*) (Rouvray ; pas commun. — M. *Emy.*)

330. *H. NUBILUS. F.* Rare. Villenote, près Semur, en fauchant sur la lisière du bois de Champeaux, au bord d'un fossé. Septembre. (Pontailler-sur-Saône ; sous les mousses humides, dans les bois au bord de la Saône ; octobre. — M. *Dudrumet.*)

331. *H. AQUATICUS. Linn.* — *GRANDIS. Ill.* Assez commun. Eaux stagnantes. Mai, juin. Dijon , sablière près de l'Allée-de-la-Retraite. Gevrey, sablière près de la station du chemin de fer. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

532. *H. GRANULARIS. Linn. — MINUTUS. F.* Très-commun. Eaux stagnantes. Printemps, été, automne. Dijon, sablières près de l'Allée-de-la-Retraite et de la route d'Auxonne; bas des tours du Château; près du glacis au-dessus du moulin Vesson dans une souche de peuplier carié, etc. Plombières, combe de Neuvon, en fauchant. Gevrey, dans la sablière près de la gare et au bord du petit étang de Satenay sous les détrit. Blaisy-Bas, au bord du ruisseau au midi du village. Chambolle, au vol le soir dans la combe. Villenote, près Semur. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

*HYDROCHUS. Germ.*

533. *H. CARINATUS. Germ. — COSTATUS. Dej.* (Beaune; printemps; pas commun. — *M. Arias.*)

534. *H. ELONGATUS. Schaller.* Dijon, assez commun dans le contre-fossé au midi du Canal, près du chemin de fer de Paris à Lyon; février, mars; en remuant les pierres, les feuilles mortes et les détrit. dans l'eau, l'insecte vient à la surface. (Rouvray; commun. — *M. Emy.*)

535. *H. CRENATUS. F.* (Rouvray; pas commun. — *M. Emy.*)

*OCHTEBIUS. Leach.*

536. *O. EXSCULPTUS. Müller.* Commun. Eaux courantes, sous les pierres. Juin, juillet, août. Dijon, dans l'Ouche entre le Parc et Longvic, au-dessous du barrage, par les basses eaux; pris aussi vers le pont de la Colombière et vers le pont du chemin de fer de Paris à Lyon. Gevrey, au bas du déchargeoir du grand étang de Satenay.

537. *O. PYGMEUS. F. — RIPARIUS. Ill.* Pas rare. Eaux stagnantes. Mars. Dijon, contre-fossé au midi du Canal près du pont du chemin de fer; en remuant les pierres, les feuilles, etc., ces insectes montent à la surface de l'eau. Trouvé aussi dans une sablière près de l'Allée-de-la-Retraite.





HYDRAENA. *Kugel.*

338. *H. RIPARIA. Kugel.* — *LONGIPALPIS. Sch.* Assez commune. Eaux courantes. Sous les pierres et la mousse. Mars, juillet, août, octobre. Dijon, dans l'eau au bord de l'Ouche près de l'écluse de Larrey; au bas du glacis de Vesson et au bas du barrage entre le Parc et Longvic; Jardin des Plantes dans le petit ruisseau près de la maisonnette en pierres, lorsqu'il est presque à sec.

339. *H. ANGUSTATA. Dej.* Pas rare. Se trouve comme la précédente. Dijon, dans l'eau au bord de l'Ouche au bas du glacis près de Vesson. Octobre.

340. *H. PULCHELLA. Sturm.* Pas rare. Sous la mousse qui garnit les pierres et les racines, dans l'eau au bord de l'Ouche au-dessous du glacis qui est avant le moulin Vesson, et près de l'écluse de Larrey. Juillet, août, octobre.

LIMNEBIUS. *Leach.* — HYDROBIUS. *Leach.*

341. *L. TRUNCATELLUS. Thunb.* Environs de Dijon. Eaux stagnantes. (Rouvray. — *M. Emy.*)

342. *L. PAPPOSUS. Muls.* Commun. Eaux stagnantes. Printemps. Dijon, sablière près de la route d'Auxonne. Corcelles-Monts; fontaine de la Combe-aux-Serpents. (Beaune. — *M. Bourtier.*)

343. *L. NITIDUS. Marsh.* Un seul exemplaire, trouvé aux environs de Dijon.

344. *L. ATOMUS. Duft.* Un seul exemplaire, trouvé le 17 avril à Dijon sous une pierre dans l'eau d'une sablière près de la route d'Auxonne.



BEROSUS. *Leach.*

345. B. *ÆRICEPS*. *Curtis*. — *SIGNATICOLLIS*. *Charp.* Pas commun. Environs de Dijon. (Beaune. — M. *Bourlier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

346. B. *LURIDUS*. *Linn.* (Rouvray. — M. *Emy*.)

347. B. *AFFINIS*. *Brullé*. — *PUNCTATISSIMUS*. *Dej.* Pas rare. Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, bas des tours du Château. Gevrey, sablière près de la gare. (Beaune. — M. *Bourlier*.)

HYDROPHILUS. *Geoffroy*.

348. H. *PICEUS*. *Linn.* Pas commun. Eaux stagnantes. Plombières, entre le Canal et l'Ouche. (Pontailler-sur-Saône; dans l'eau d'un fossé près de la Saône; octobre. — M. *Dudrumel*.) (Beaune; automne. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

M. le D<sup>r</sup> *Vallot* a trouvé autrefois cet insecte et la coque construite par sa femelle aux Petites-Roches, près Dijon; mais les travaux faits dans cette propriété ne permettraient pas de l'y retrouver aujourd'hui.

HYDROUS. *Linn.* — *HYDROPHILUS*. *F.*

349. H. *CARABOIDES*. *Linn.* Pas rare. Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, bas des tours du Château; petite mare près du vieux Suzon; au bord d'un ruisseau près du pâquier de Bray, sur des plantes aquatiques. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

HYDROBIUS. *Leach*.

350. H. *OBLONGUS*. *Herbst*. — *PICIPES*. *Duméril*. Pas commun. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy*.)





351. H. FUSCIPES. *Linn.* — SCARABÆOIDES. *F.* Pas rare. Eaux stagnantes ou peu courantes. Été, automne. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés, sous la mousse au bord du ruisseau; bas des tours du Château. Blaisy-Bas, sous des lentilles d'eau, *Lemna*, dans les parties profondes et peu courantes du ruisseau qui est entre le village et le bois. (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

352. H. GLOBULUS. *Payk.* Commun. Eaux stagnantes. Printemps, été, automne. Dijon, sablière près de la route d'Auxonne, bas des tours du Château, contre-fossé au midi du Canal près du pont du chemin de fer. Gevrey, sablière près de la gare; et au bord du petit étang de Satenay, sous les détritrus dans le bois d'aulnes. (Beaune. — M. *Bourlier*.)

LACCOBIUS. *Erich.* — HYDROBIUS. *Leach.*

353. H. MINUTUS. *Linn.* — BIPUNCTATUS. *F.* Très-commun. Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, dans les parties peu courantes de l'Ouche; sablières près l'Allée-de-la-Retraite et la route d'Auxonne, etc. Plombières, déchargeoir du Canal. Gevrey, sablière près de la gare. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

HELOCHARES. *Muls.* — HYDROBIUS. *Leach.*

354. H. LIVIDUS. *Forster.* — GRISEUS. *F.* Très-commun. Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, sablières près l'Allée-de-la-Retraite et la route d'Auxonne, bas des tours du Château. Gevrey, sablière près de la gare. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

PHILHYDRUS. *Solier.* — HYDROBIUS. *Leach.*

355. P. MELANOCEPHALUS. *Oliv.* Rare. Environs de Dijon. (Beaune. — M. *Bourlier*.) (Rouvray; mares près le Jarnois; mai. — M. *Emy*.)

356. *P. MARGINELLUS. F.* — *AFFINIS. Payk.* Var. *MARGINELLUS.* Pas rare. Eaux stagnantes. Printemps, automne. Dijon, bas des tours du Château, sablière près la route d'Auxonne. (Beaune. — *M. Bourlier.*)

*CYLLIDIUM. Erich.* — *HYDROBIUS. Leach.*

357. *C. SEMINULUM. Payk.* — *HEMISPHERICUS. Dej.* Rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — *M. Emy.*)

*CYCLONOTUM. Dej.* — *HYDROBIUS. Leach.*

358. *C. ORBICULARE. F.* Pas commun. Eaux stagnantes, sous les pierres en partie hors de l'eau. Printemps. Dijon, contre-fossé au midi du Canal, près du pont du chemin de fer; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite. (Beaune. — *MM. Arias, Bourlier et André.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

*SPHÆRIDIDIUM. F.*

359. *S. SCARABÆOIDES. Linn.* Très-commun. Dans les excréments de vache et de cheval. Printemps, été, automne. Dijon, près de Mirande, etc. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

360. *S. BIPUSTULATUM. F.* Très-commun. Se trouve comme le précédent et aux mêmes époques. Dijon, près de Mirande, etc. Je l'ai trouvé aussi dans un amas de raves en putréfaction près de Talant, le 14 mai. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

*CERCYON. Leach.*

361. *C. OBSOLETUM. Gyll.* Pas commun. Dijon, près de Mirande, dans les excréments de vache. Août.

362. *C. HEMORRHOIDALE. F.* Pas commun. Excréments de vache, plantes en putréfaction, mousses humides au bord





de l'eau. Printemps, été, automne. Dijon, près de Mirande, dans les excréments de vache; fontaine près de l'Asile des aliénés, sous la mousse humide. Talant, dans un amas de raves en putréfaction. (Beaune. — M. *André*.) (Rouvray; commun. — M. *Emy*.)

363. C. HÆMORRHOUM. *Gyll*. Pas commun. Excréments de vache. Printemps. Environs de Dijon. (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

364. C. UNIPUNCTATUM. *Linn*. Commun. Dans les excréments de vache et de cheval. Printemps. Environs de Dijon. (Beaune. — M. *Arias*.)

365. C. QUSQUILIUM. *Linn*. — UNIPUNCTATUM. Mâle. *F*. Très-commun. Dans les excréments de vache et de cheval; par les soirées chaudes il vole sur les routes autour des excréments de cheval. Printemps, été. Dijon, près de Mirande, route de Gray, route de Paris par Plombières, près du val-lon de l'Ouche après la fauchaison, etc., Gevrey, Blaisy-Bas, en fauchant dans le bois. (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

366. C. CENTRIMACULATUM. *Sturm*. Pas commun. Été. Dijon, le soir au vol dans la ville quand il fait très-chaud.

367. C. PYGMÆUM. *Ill*. Pas commun. Excréments de vache. Été. Dijon, près de Mirande. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

368. C. AQUATICUM. *Steph*. Pas rare. Sous les pierres et les plantes en décomposition au bord de l'eau. Printemps, été. Dijon, contre-fossé au midi du Canal, près du pont du chemin de fer. Gevrey, près du petit étang de Satenay, en fauchant. (Beaune. — M. *Bourlier*.)

369. C. FLAVIPES. *F*. Commun. Dans les excréments de vache, au vol près de ces excréments et dans les matières végétales en décomposition. Printemps, été. Dijon, près de Mirande; rempart de Tivoli, au vol. Talant, dans un amas de raves en décomposition. (Beaune. — M. *André*. Dans un champignon; M. *Arias*.)



370. *C. MELANOCEPHALUM*. *Linn.* Pas commun. Environs de Dijon. (Rouvray. — *M. Emy.*)

371. *C. LUGUBRE*. *Payk.* — *MINUTUM*. *F.* Var. *LUGUBRE*. *Gyll.* Rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — *M. Emy.*)


372. *C. ANALE*. *Payk.* Rare. Environs de Dijon. (Beaune, sous les meules de foin, octobre. — *M. Bourlier.*)

*MEGASTERNUM*. *Muls.* — *CERCYON*. *Leach.*

373. *M. BOLETOPHAGUM*. *Erich.* — *MINUTUM*. *Gyll.* Pas commun. Sous les pierres, les matières végétales en décomposition, et dans les bois sur les arbres morts et abattus et sur les plantes. Printemps. Dijon, au nord de la ville, entre le chemin d'Ahuy et celui de Fontaine, sous une pierre qui recouvrait une rave en décomposition et dans l'intérieur de cette rave; intérieur du Parc, au vol près d'un arbre coupé. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant. (Beaune, sous des meules de foin; octobre.—*MM. Bourlier et André.*) Villenote, près Semur, en fauchant sur la lisière du bois de Champeaux; octobre.

*CRYPTOPLEURUM*. *Muls.* — *CERCYON*. *Leach.*

374. *C. ATOMARIUM*. *F.* Très-commun. Dans les excréments de vache et de cheval, et souvent aussi au vol autour de ces excréments sur les routes et les chemins, par les soirées chaudes. Printemps, été. Dijon, au vol le soir dans les rues et sur les remparts, près de Mirande, route de Paris par Plombières, etc. Fontaine-lez-Dijon, sous des pierres recouvrant un fumier; octobre. (Beaune. — *MM. Bourlier et André.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)







## PARNI.

---

### PARNUS. *F.*

375. *P. PROLIFERICORNIS. F.* Commun. Dans les eaux stagnantes. Février, mars. Printemps, été. Dijon, contre-fossé au midi du Canal, près du pont du chemin de fer. Longvic, dans les parties de l'Ouche où l'eau est peu profonde et presque stagnante, dans le temps des basses eaux. (Rouvray. — *M. Emy.*)

376. *P. VIENNENSIS. Dahl.* Pas commun. Longvic, dans les parties de l'Ouche où l'eau est presque stagnante et peu profonde, en remuant le gros sable couvert de matière végétale verte. Été.

377. *P. AURICULATUS. Ill.* Pas commun. Blaisy-Bas, au bord du ruisseau dans les parties où l'eau n'est pas courante, vers le bois; juillet. (Rouvray. — *M. Emy.*)

378. *P. SUBSTRIATUS. Müll. — DUMERILII. Latr.* Rare. Environs de Dijon.

---

## ELMIDES.

---

### LIMNIUS. *Müll. — ELMIS. Latr.*

379. *L. TUBERCULATUS. Müll.* Commun. Sous les pierres dans l'eau. Été. Dijon, au bas du glacis qui est au-dessus du moulin Vesson; dans le Canal lorsqu'il est à sec, sous les pierres; etc. Plombières, combe de Neuvon, en fauchant sur les herbes près d'une petite source. (Beaune.—*M. Bourlier.*)

ELMIS. *Latr.*

380. E. *ÆNEUS*. *Steph.* Très-commun. Dans l'eau sous les pierres, surtout au bas des chutes ou des barrages, quand les eaux sont basses. Printemps, été. Dijon, au bas du glacis qui est au-dessus du moulin Vesson; fontaine de Larrey; dans l'Ouche près de l'écluse de Larrey, et entre le Parc et Longvic au bas du barrage; Jardin botanique, dans le petit ruisseau près de la maisonnette en pierre; trouvé aussi le soir en fauchant sur les prés au bord de l'Ouche. Plombières, combe de Neuvon en fauchant près d'une petite source. Mâlain, dans le ruisseau près du viaduc. Gevrey, déchargeoir du grand étang de Satenay. (Beaune; près de Gigny, dans le ruisseau de Rhoin; octobre. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

381. E. *MAUGETII*. *Latr.* (Beaune; pas rare; avec le précédent. Octobre. — M. *Bourlier*.)

382. E. *VOLKMARI*. *Latr.* Rare. Dans l'eau sous les pierres. Été, quelquefois au printemps. Dijon, au bas du glacis qui est au-dessus du moulin Vesson, quand l'eau est basse. (Beaune; avec le précédent. — MM. *Arias*, *André* et *Bourlier*.)

383. E. *PARALLELIPEDUS*. *Steph.* Commun. Comme l'*Æneus* et aux mêmes époques. Dijon, dans l'Ouche, au bas du glacis du moulin Vesson, et près de l'écluse de Larrey contre la prise d'eau pour le Canal; Jardin botanique. (Châtillon-s.-S. — M. *Gontard*, d'après M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

384. E. *PYGMÆUS*. *Müll.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

385. E. *CUPREUS*. *Steph.* Assez commun. Été. Dijon, sous les pierres dans l'Ouche, au bas du glacis au-dessus du moulin Vesson. (Beaune. — M. *Bourlier*.)

386. E. *SUBVIOLACEUS*. *Hér.* (Beaune; pas rare. — M. *Bourlier*.)

387. E. *NITENS*. *Müll.* Rare; environs de Dijon.





STENELMIS. — *Dufour.*

388. *S. CANALICULATUS. Dufour.* Deux exemplaires de cet insecte ont été pris par M. *Tarnier*, à Dijon, dans l'Ouche, au bas du glacis qui est au-dessus du moulin Vesson, le 25 août 1851.

---

## HETEROCERI.

---

HETEROCERUS. *Bosc.*

389. *H. MARGINATUS. F.* Assez commun. Sous les pierres, dans la terre humide et le sable au bord de l'eau. Printemps. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés, sablière près de la route d'Auxonne. (Environs de Rouvray, sur la rive gauche du Serein. — M. *Emy.*)

---

## SILPHÆ.

---

NECROPHORUS. *F.*

390. *N. GERMANICUS. Linn.* Pas rare. Sous les cadavres d'animaux ou dans l'intérieur de ces cadavres, surtout ceux de chiens et de taupes. Avril à juillet. Dijon, autour de la ville, surtout sur les chemins de Fontaine, de la Charmette, de la fontaine des Suisses, de la rente de Morvau, et à la Combe-aux-Serpents. (Beaune.—M. *Arias.*)

391. *N. HUMATOR. F.* Pas rare. Sous les cadavres dans les bois. Avril, mai. Dijon; au Parc; trouvé aussi une



fois près de la petite place Saint-Bernard, dans les champs. (Fixin. — M. *Tarnier*.) Chambolle. (Rouvray. — M. *Emy*.)

592. N. VESPILLO. *Linn*. Très-commun. Sous les cadavres, surtout ceux de petits animaux. Printemps. Dijon, partout, autour de la ville, Combe-aux-Serpents, etc. (Fixin. — M. *Tarnier*.) (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

595. N. VESTIGATOR. *Hersch*. Commun. Sous les cadavres, dans les champs au bord des chemins. Printemps. Dijon, autour de la ville, surtout au nord. (Rouvray. — M. *Emy*.)

Variété CADAVERINUS. *Dej*. Avec le précédent; trouvé en outre à la Combe-aux-Serpents. J'ai trouvé une fois cet insecte sur des excréments de renard.

594. N. FOSSOR. *Erich*. Pas rare. Sous les cadavres. Printemps, été, automne. Dijon, sur les chemins autour de la ville; chemin de Daix, Jardin botanique, etc.

595. N. SEPULTOR. *Charp*. Rare. Chambolle, sous les cadavres, dans les bois.

596. N. MORTUORUM. *F*. Pas commun. Dans les bois, au printemps, sous les cadavres, et en automne dans les champignons. Dijon, au Parc. Ruffey. Chambolle. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

#### NECRODES. *Wilkin*.

397. N. LITTORALIS. *Linn*. Commun. Sous les cadavres de gros animaux, chevaux, chiens, etc., ou dans l'intérieur de ces cadavres, dans les champs ou dans les bois, trouvé une fois dans un cadavre de crapaud. Printemps. Dijon, entre le Parc et Longvic; sur le chemin de la rente de Morvau. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

Variété SIMPLICIPES. *Dej*. Dijon, au Parc, etc. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Châtillon-s.-S. — M. *Gontard*, d'après M. *Emy*.)

SILPHA. *Lin.*

398. *S. THORACICA*. *Linn.* Pas rare. Dans les bois, sous et sur les cadavres de petits animaux, quelquefois sur les excréments de renard et les champignons. Printemps, automne. Dijon, intérieur du Parc. Flavignerot, au vol et sur des cadavres. (Fixin. — *M. Tarnier.*) Chambolle. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

399. *S. RUGOSA*. *Linn.* Commun. Sous les cadavres. Printemps. Dijon, chemin de la rente de Morvau, chemin entre celui de Fontaine et celui d'Ahuy, etc., Combe-aux-Serpents. Trouvé une fois sur le chemin de Marsannay-la-Côte sur un amas de hannetons, *Melolontha vulgaris*, écrasés. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

400. *S. SINUATA*. *F.* Commun. Comme le précédent, à la même époque et dans les mêmes localités; trouvé aussi sur des hannetons écrasés. (Fixin. — *M. Tarnier.*) (Beaune. Rouvray.)

401. *S. DISPAR*. *Herbst.* (Rouvray; très-rare. Femelle. — *M. Emy.*)

402. *S. QUADRI-PUNCTATA*. *F.* Commun. Dans les bois, sur les chênes, à l'extrémité des branches, où il fait la chasse aux chenilles. Du 24 avril au 8 juin. Dijon, trouvé deux fois au bord du Canal du côté de Larrey sur les tiges d'herbe, intérieur du Parc par terre. Fixin, bois de la plaine près du chemin de fer, en fauchant (dans la combe en secouant les baliveaux, et sous les pierres. — *M. Tarnier.* 30 avril). Gevrey. Epernay. Chambolle. (Beaune; peupliers et chênes. — *M. Arias.*) (Rouvray; commun, suivant les années. — *M. Emy.*)

403. *S. RETICULATA*. *F.* Rare. Avril, juin. Dijon, Combe-aux-Serpents sur une tige d'herbe. Chambolle, sous les pierres. (Fixin; sous les pierres, au bord du chemin, dans la combe. — *M. Tarnier.*) (Beaune; cadavres; été. — *M. Arias.*)

404. *S. TRISTIS*. *Ill.* (Rouvray; très-rare. — *M. Emy.*)

405. *S. OBSCURA*. *Linn.* Commun. Dans les champs, après les moissons. Juillet, août. Dijon, au bord du chemin au midi de Montmuzard, derrière le Parc près du chemin de fer de Besançon. Gevrey, près du petit étang de Satenay, sous une pierre.

406. *S. POLITA*. *Sulz.* — *LÆVIGATA*. *F.* Pas rare. Dans les bois par terre et sous les pierres, quelquefois hors des bois. Mai. Dijon, chemin de Marsannay-la-Côte. Chambolle. (Fixin. — *M. Tarnier.*) (Beaune; cadavres; printemps et été. — *M. Arias.*) (Rouvray; rare. — *M. Emy.*)

407. *S. ATRATA*. *Linn.* Commun. Sous les pierres ou sur la terre, surtout dans les bois. Printemps, été. Dijon, bord de l'Ouche près du moulin Vesson. Flavignerot. Gevrey, sous les détritrus dans le bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Chambolle. (Pontailler; sous les mousses humides; octobre. — *M. Dudrumel.*) (Beaune; cadavres. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

CATOPS. *F.*

408. *C. ANGUSTATUS*. *F.* — *OBLONGUS*. *Latr.* Pas commun. Lieux humides et ombragés. Juin. Combe de Neuvon à Darois, en fauchant. (Beaune; printemps; rare. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

409. *C. AGILIS*. *Ill.* Commun. Dans les lieux humides et ombragés; dans les bois; dans les rues et les maisons, sur les murs à l'ombre, ou au vol. Printemps, été. Dijon, dans la ville. Marsannay-la-Côte, contre le rocher de la fontaine de Gouville. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Flavignerot. Chambolle, sous une écorce de racine de noyer abattu. (Beaune. — *MM. Arias et André.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

410. *C. CASTANEUS*. *And. St.* Pas commun. Environs de Dijon. (Beaune. — *M. André.*)

411. *C. CISTELOIDES*. *Frølich.* Pas commun. Environs de Dijon. (Beaune. — *M. Bourlier.*)





412. *C. FUSCUS*. *Panz.* — *RUFESCENS*. *F.* (Rouvray. Commun dans les maisons. — *M. Emy.*)

413. *C. PICIPES*. *F.* — *MAJOR*. *Dej.* Rare. Dans les bois sous les pierres. Mai. Chambolle, sur la lisière du bois, près des champs de Curley. (Fixin. — *M. Tarnier.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

414. *C. NIGRICANS*. *Spence.* Pas commun. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Juillet. (Beaune. — *M. Bourlier.*)

415. *C. TRISTIS*. *Panz.* Pas commun. Mai. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, au pied des souches d'aulne, sous les détritüs.

416. *C. CHRYSOMELOIDES*. *Panz.* Pas rare. Mai. Fixin, bois près du chemin de fer sous des ételles humides, dans une coupe en exploitation..

417. *C. QUADRATICOLLIS*. *Aubé.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

418. *C. FUMATUS*. *Spence.* — *AGILIS*. *F.* Pas rare. Mai, juillet. Dijon, près de la fontaine des Suisses, sous un cadavre de musaraigne. Fixin. Trouvé avec le *Chrysomeloides*. (Beaune. — *M. Bourlier.*)

419. *C. VELOX*. *Spence.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

420. *C. SERICEUS*. *F.* — *TRUNCATUS*. *F.* Commun. Sous les pierres, dans les détritüs, et courant par terre. Printemps, été. Dijon, derrière le mur du Parc du côté de Longvic; chemin près de la promenade de Montchapet. Gevrey, bord du chemin de Saulon, près de la ferme du Pontot, dans le terreau au bas d'un saule creux dans lequel se trouvaient des *Formica Fuliginosa*. Saint-Nicolas-lez-Cîteaux, en tamisant de la poussière de bois qui se trouvait au pied d'un arbre creux. (Beaune; sous des meules de foin; octobre. — *MM. André et Bourlier.*)

421. *C. CORACINUS*. *Kellner.* Rare. Environs de Dijon.

CATOPSIMORPHUS. *Aubé.*

422. C. ARENARIUS. *Hampe.* — PILOSUS. *Muls.* J'ai trouvé un seul exemplaire de cette espèce près des piles de bois à brûler, au bord du bassin du Canal, le 28 juillet, le soir, au vol, par un temps chaud.

COLON. *Herbst.* — CATOPS. *F.*

423. C. AFFINIS. *Sturm.* Pas commun. Dans les bois ombragés, en fauchant, surtout vers la fin du jour. Juillet. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Fixin, bois près du chemin de fer.

424. C. ANGULARIS. *Erichs.* Un seul exemplaire. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. 8 juillet.

425. C. NANUS. *Erichs.* Assez rare. Trouvé avec le précédent, à la même époque.

---

**SCAPHIDII.**

---

SCAPHIDIUM. *Oliv.*

426. S. QUADRIMACULATUM. *Oliv.* Un exemplaire a été trouvé le 22 avril par M. *Dudrumet* à Gevrey, dans le bois qui est à gauche du chemin de Saulon, sur une branche pourrie gisant par terre. (Rouvray; pas rare; sous les écorces et en battant les haies sèches. — M. *Emy.*)

SCAPHISOMA. *Leach.* — SCAPHIDIUM. *F.*

427. S. AGARICINUM. *Linn.* Pas rare. Sous les écorces d'arbres morts où se trouvent des cryptogames, sur le bois mort et les champignons qui croissent sur les arbres morts. Mai, juin, juillet, septembre. Dijon, au Parc, sous une pile

de bois mort. Fixin, bois près du chemin de fer, sous des ételles humides dans une coupe en exploitation. Gevrey, bord du petit étang de Satenay sous les détritits ; et près du chemin de Saulon, vers la ferme du Pontot, sur des champignons croissant sur un tronc de saule mort. (Rouvray. — M. *Emy.*)

428. S. BOLETI. *Panz.* Rare. Environs de Dijon.

## TRICHOPTERYX.

TRICHOPTERYX. *Kirby.* — PTILIUM. *Schüppel.*

429. T. ATOMARIA. *De Géer.* Commune. Dans les excréments de vache et d'autres animaux ; au vol, près des fumiers et des ordures. Printemps, été. Dijon, intérieur du Parc, sous un amas d'herbe et de mousse ; fossés du cours du Parc, au vol au premier printemps ; près de Mirande, dans les excréments de vache, etc. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, dans le bois d'aulnes, sous les détritits, et en fauchant. (Beaune. — M. *André.* Sous des meules de foin ; octobre. — M. *Bourlier.*)

430. T. FASCICULARIS. *Herbst.* Pas commune. Environs de Dijon. Même *habitat* que le précédent.

431. T. INTERMEDIA. *Gillm.* — GRANDICOLLIS. *Er. Mark.* Pas rare. Juillet. Plombières, combe de Neuvois à Prenois, en fauchant. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant, etc.

432. T. CHEVROLATII. *Allibert.* — PYGMÆA. *Er.* Pas rare. Sous les détritits. Été, automne. Dijon. Plombières, combe de Neuvois, dans une fourmilière de *Formica rufa*, un seul exemplaire, octobre. (Beaune ; sous des meules de foin ; octobre. — M. *Bourlier.*)



433. T. MONTANDONII. *Allibert*. — PUMILA. *Er*. Dijon, chemin de Daix, sous des pierres recouvrant du fumier; 16 juillet.

434. T. GUERINII. *Allibert*. Pas rare. Dans les excréments de vache et les fumiers. Printemps, été. Dijon, chemin de Daix. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant.

PTILIUM. *Schüppel*.

435. P. SUTURALE. *Héer*. Rare. Trouvé en automne sous l'écorce humide d'une grosse branche de hêtre coupée sur le territoire de la commune de Concœur et Corboin, dans la ligne séparative entre le bois de Mantuan et les bois du château d'Entre-deux-Monts; quelques exemplaires. Trouvé aussi à Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans la forêt, sous l'écorce d'une grosse branche pourrie, en septembre.

436. APTERUM. *Guérin*. Chambolle, un seul exemplaire trouvé dans une maison. Automne.

437. P. MINUTISSIMUM. *Weber*. — TRISULCATUM. *Aubé*. Pas très-rare. Sous les pierres recouvrant du fumier. Printemps, été. Dijon, chemin entre celui d'Ahuy et celui de Fontaine, chemin de Daix, chemin de la fontaine Sainte-Anne.

438. P. EXARATUM. *Allibert*. Rare. Environs de Dijon, probablement dans les mêmes circonstances que le précédent.

439. P. INQUILINUM. *Mark*. Pas rare. Dans les fourmières de *Formica rufa*. Octobre, 1<sup>er</sup> novembre. Plombières, combe de Neuvon.

440. P. KUNZEI. *Héer*. Pas commun. Juillet. Dijon, chemin de Daix, sous des pierres recouvrant du fumier. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant.





PTENIDIUM. *Erich.* — PTILIUM. *Schüpp.*

441. P. PUSILLUM. *Gyll.* Rare. Environs de Dijon. (Beaune, sous des meules de foin ; octobre. — M. *Bourlier.*)

442. P. APICALE. *Gyll.* Pas rare. Sous les pierres recouvrant du fumier. Printemps. Dijon , chemin entre celui d'Ahuy et celui de Fontaine , bord du Canal du côté de Plombières, fossés du cours du Parc, au vol. (Beaune, sous des meules de foin ; octobre. — M. *Bourlier.*)

NOSSIDIUM. *Erich.*

443. N. PILOSELLUM. *Marsh.* J'ai trouvé deux fois cette espèce à Dijon , au Parc ; la première fois le 3 août , en assez grande quantité sous des champignons et des végétaux en décomposition sur une souche d'arbre ; la deuxième fois le 22 septembre , au nombre de trois ou quatre exemplaires , sous la mousse humide d'une souche de charme. J'en ai trouvé , en outre , un exemplaire à Gevrey , près du petit étang de Satenay , en fauchant , en juillet.

---

## ANISOTOMÆ.

---

HYDNOBIUS. — *Schmidt.* — ANISOTOMA. *F.*

444. H. PUNCTATUS. *Erichs.* Pas commun. Juillet. Plombières , combes de Neuvo à Darois et de Neuvo à Prenoïs , en fauchant.

ANISOTOMA. *Knoch.*

445. A. PICEA. *Ill.* (Rouvray ; rare. — M. *Emy.*)

446. A. OBESA. *Schmidt.* — FERRUGINEUM. *F.* Je n'ai trouvé que deux exemplaires de cet insecte, tous deux sur la neige,

où ils étaient probablement tombés en volant, par un temps peu froid et un beau soleil; le premier, le 10 janvier, dans le bois de Chambolle, et, le deuxième, le 30 novembre, dans le bois appelé le Plain-de-Suzanne, territoire de Fleurey-sur-Ouche.

447. A. FLAVESCENS. *Schmidt*. (Rouvray; rare. — M. Emy.

448. A. OVALIS. *Schmidt*. Rare. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant. Mai. Juillet.

449. A. NIGRITA. *Schmidt*. Un seul exemplaire. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Juillet.

450. A. CALCARATA. *Erichs*. Pas rare. Juillet. Plombières, combes de Neuvon à Darois et de Neuvon à Prenoïs, en fauchant dans les endroits ombragés.

451. A. BADIA. *Sturm*. Pas rare. Juillet. Plombières, combe de Neuvon à Prenoïs.

452. A. HYBRIDA. *Erichs*. Un seul exemplaire. Environs de Dijon, probablement une des combes de Neuvon.

453. A. PARVULA. *Sahlberg*. Pas rare. Juillet. Plombières, combes de Neuvon à Darois et de Neuvon à Prenoïs, en fauchant.

CYRTUSA. *Erichs*.

454. C. SUBTESTACEA. *Gyll*. Pas commune. Plombières, combe de Neuvon à Prenoïs, en fauchant. Juillet.

COLENIS. *Erich*. — ANISOTOMA. *Schmidt*.

455. C. DENTIPES. *Gyll*. Commune. Dijon, au Jardin botanique sur un champignon, au bord du massif des sapins; septembre. Plombières, combes de Neuvon à Darois et de Neuvon à Prenoïs, en fauchant; juillet. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sous les détritiques; avril.





AGARIGOPHAGUS. — *Schmidt.*

456. A. CEPHALOTES. *Schmidt.* Très-rare. Un seul exemplaire. Environs de Dijon, probablement à Plombières, dans la combe de Neuvon à Darois, en fauchant.

LIODES. *Erich.* — ANISOTOMA. *Knoch.*

457. L. HUMERALIS. *Kugel.* (Rouvray; pas commun; dans les chênes pourris et dans les champignons. — M. *Emy.*)

458. L. AXILLARIS. *Gyll.* (Beaune; dans les champignons, en septembre, dans les bois de la plaine; un seul exemplaire. — M. *André.*)

AMPHICYLLIS. *Erich.* — AGATHIDIUM. *Ill.*

459. A. GLOBUS. *F.* Rare. Sur le bois mort. Mai, juin, juillet. Dijon, au Parc sur une pile de bois mort, coupé; fontaine de Larrey, le soir au vol. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant et sous des ételles humides dans une coupe. (Rouvray. — M. *Emy.*)

460. A. GLOBIFORMIS. *Sahlb.* Plus rare que le précédent. Dijon, Parc, sous des écorces de charmes morts et abattus, et sur du bois mort empilé. Mai.

AGATHIDIUM. *Ill.*

461. A. NIGRIPENNE. *Kugel.* Pas commun. Sous les écorces d'arbres morts et abattus. Mars, mai, juillet. Dijon, au Parc, sous des écorces de charmes morts et abattus, et sur du bois mort empilé. (Rouvray. — M. *Emy.*)

462. A. ATRUM. *Payk.* Rare. Trouvé trois exemplaires seulement : le premier, le 6 avril, au vol, à Dijon, à la Combe-aux-Serpents; le deuxième, le 8 juin, à Fixin, dans



le bois qui est près du chemin de fer , sous des ételles humides , dans une coupe en exploitation ; enfin le troisième par terre , le 8 juillet , sur un chemin humide , à Plombières , dans la combe de Neuvon.

463. A. SEMINULUM. *Linn.* Rare. Saint-Nicolas-les-Cîteaux ; avec l'espèce suivante.

464. A. BADIUM. *Ziegl.* Rare. Saint-Nicolas-les-Cîteaux , dans la partie en futaie de la forêt de Cîteaux , sous les écorces de charmes morts sur pied , le 31 juillet. (Rouvray , battue des haies sèches. — M. *Emy.*)

465. A. LAEVIGATUM. *Erichs.* Deux exemplaires. Gevrey , bois d'aulnes près du petit étang de Satenay , sous un tas d'ételles ; 10 juin.

CLAMBUS. *Fisch.*

466. C. PUBESCENS. *Redt.* Rare. Dijon , dans la ville , sur le mur de la Préfecture , contre l'urinoir , à l'angle de la rue Neuve-Suzon. 25 juin.

467. C. ARMADILLUS. *De Géer.* Commun. Sous les pierres. Mars , avril. Dijon , chemins entre celui d'Ahuy et celui de Fontaine ; chemin de Daix ; bord du Canal , du côté de Plombières , etc. Gevrey , dans la combe près de la fontaine , en fauchant , 11 juin. (Beaune , sous les meules de foin ; octobre. — M. *Bourlier.*)

CALYPTOMERUS. *Redt.*

468. C. ENSHAMENSIS. *Westw.* Rare. Dijon , dans la ville , dans les caves , sous des morceaux de bois humide et sur des fruits. Septembre , novembre.

---





## PHALACRI.

PHALACRUS. *Payk.*

469. P. CORRUSCUS. *Panz.* Commun. Sous les écorces de platane et de sycomore. Janvier à avril. Dijon, au Parc. Chambolle. (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

470. P. SUBSTRIATUS. *Gyll.* Pas rare. Environs de Dijon, en fauchant. (Beaune. — MM. *Arias* et *André.*)

OLIBRUS. *Erich.* — PHALACRUS. *Payk.*

471. O. CORTICALIS. *Sch.* Très-commun. Sous les écorces de platane et de sycomore. Janvier à avril, décembre. Dijon, au Parc. Talant, trouvé quelquefois le soir, au mois de mai, sur l'*Erysimum cheirifolium*. (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

472. O. ÆNEUS. *Ill.* Rare. Environs de Dijon. (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier.*)

473. O. BICOLOR. *F.* Commun. Sur différentes plantes, notamment le *Carduus nutans*. Printemps, été. Dijon, vieux Suzon, etc. (Beaune. — M. *Bourlier.* Sous les écorces et en fauchant. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

474. O. LIQUIDUS. *Erichs.* Pas commun. Environs de Dijon.

475. O. AFFINIS. *Sturm.* Rare. Juillet. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Plombières, combe de Neuven. Blaisy-Bas, en fauchant dans le bois. (Villenote, près Semur. Septembre. — M. *Lombard.*) (Beaune. — M. *Arias.*)

476. O. MILLEFOLI. *Payk.* Pas commun. Sur l'*Achillea millefolium*. Juillet, août. Dijon, entre le Canal et l'Ouche du côté de Plombières, chemin de Mirande par les Argentières, etc.

477. O. PYGMEUS. *Storm.* — PUSILLUS. *Dej.* Rare. Dijon, chemin de Daix, sur l'*Achillea millefolium*. Juillet.

478. O. GEMINUS. *Ill.* — TESTACEUS. *Gyll.* Commun. En fauchant, surtout dans les bois. Juin, juillet, août, septembre. Dijon, chemin de Daix, sur différentes plantes et au vol le soir; trouvé aussi sous les pierres en avril. Gevrey, dans la combe et dans le bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Villenote, près Semur. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. André et Bourlier.)

479. O. PICEUS. *Knoch.* Très-commun. En fauchant dans les endroits humides. Juillet, août, septembre. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, en fauchant et sous les détritrus. Plombières, combe de Neuvon. Villenote, près Semur. (Beaune, sous les écorces; rare. — M. Arias.)

480. O. IMMACULATUS. *Latr.* (Rouvray. — M. Emy.)

481. O. APICALIS. *Latr.* (Rouvray. — M. Emy.)

---

## NITIDULÆ.

---

### CERCUS. *Latr.*

482. C. PEDICULARIUS. *Linn.* Pas commun. Sur les plantes en fauchant. Juin. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans la forêt de Cîteaux. (Beaune. — M. Bourlier.) (Rouvray. — M. Emy.)

483. C. SAMBUCI. *Erichs.* (Environs de Dijon. — M. Tarnier.)

484. — C. RUFILABRIS. *Latr.* — RUBICUNDUS. *Dej.* Pas rare, en fauchant dans les endroits humides, surtout dans le voisinage des étangs. Juin. Gevrey; bord des étangs de Satenay. Fixin, fossés du chemin de fer près du bois. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans la forêt de Cîteaux.





BRACHYPTERUS. *Kugel.* — *CERCUS. Latr.*

485. B. GRAVIDUS. *Ill.* — *PULICARIUS. Latr.* Pas rare. Sur les plantes et les fleurs, en fauchant. Juillet. Dijon, au bord des chemins de Daix, de Fontaine, etc. Blaisy-Bas, près du ruisseau. Gevrey, bord du petit étang de Satenay.

486. B. PUBESCENS. *Erich.* — *URTICÆ, var. c. Gyll.* Commun. Sur les fleurs et les feuilles de l'ortie dioïque, *Urtica dioïca*. Fin juin, juillet. Dijon, chemin de Daix. Plombières, combe de Neuvo. Blaisy-Bas, près du ruisseau.

487. B. *URTICÆ. F.* Environs de Dijon. (Beaune. — *M. Arias.*)

CARPOPHILUS. *Leach.* — *IPS. Dej.*

488. C. HEMIPTERUS. *Linn.* — *BIMACULATUS. Oliv.* (Rouvray. — *M. Emy.*)

489. C. SEXPUSTULATUS. *F.* — *ABBREVIATUS. Panz.* Commun. Ecorces humides d'arbres morts, abattus ou sur pied. Printemps, automne. Dijon, au Parc, sous les écorces de charme. Chambolle, écorces des souches de chêne. (Savigny, près Beaune, Fontaine-Froide, sous les écorces; octobre. — *M. Bourlier.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

EPURÆA. *Erich.* — *NITIDULA. F.*

490. E. DECENGUTTATA. *F.* (Environs de Dijon. — *M. Tarnier.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

491. E. MELINA. *Erich.* Commune. Sur les fleurs. Juin. Environs de Dijon. Plombières, combe de Neuvo à Darois, en fauchant. (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune. — *M. Bourlier.*)

492. E. ÆSTIVA. *Linn.* — *DEPRESSA. Ill.* Commune. Sur les fleurs et les plantes; en fauchant. Avril, juin, juillet. Environs de Dijon. Plombières, combe de Neuvo. Gevrey,



près du petit étang de Satenay. Fixin, bois près du chemin de fer. (Beaune. — MM. *André* et *Bourtier*. En battant les arbres; printemps, été; pas commune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

493. E. VARIEGATA. *Herbst*. Pas rare. Sous les écorces et en fauchant. Mai, juin, septembre. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Dijon, au Parc, sur des troncs d'orme coupés et sous l'écorce. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux, sur le suc suintant d'une souche. (Rouvray. — M. *Emy*.)

494. E. PARVULA. *Sturm*. Pas commune. Sous les écorces d'arbres. Environs de Dijon.

495. E. PYGMÆA. *Gyll*. Pas commune. Plombières, combe de Neuvon à Darois, 26 juin.

496. E. PUSILLA. *Ill*. Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

497. E. LONGULA. *Erichs*. Pas commune. Environs de Dijon.

498. E. FLOREA. *Erich*. — *ÆSTIVA*. *Ill*. Pas rare. Dijon, au Parc, sur l'extrémité de troncs d'ormes coupés. Mai.

499. E. MELANOCEPHALA. *Marsh*. — *FERRUGINEA*. *Hér*. Pas commune. Environs de Dijon. Plombières, combe de Neuvon à Prenois, en fauchant. Juillet. (Beaune; pas rare. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

500. E. LIMBATA. *F*. Un seul exemplaire. Gevrey, près de la ferme du Pontot, dans un saule mort et en décomposition; 22 juillet.

#### NITIDULA. *F*.

501. N. BIPUSTULATA. *Linn*. Pas rare. Sur le lard suspendu dans les maisons à la campagne. Mai, juin. Chambole. Flavignerot, etc. (Beaune. — M. *Bourlier*. Sous les écorces; rare. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

502. N. OBSCURA. *F*. Pas rare. Sur les fleurs et sous les





cadavres desséchés. Mai, juin, juillet, août. Dijon, chemin au midi de Montmuzard, sur un cadavre desséché. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Flavignerot. Chambolle, sur des fleurs de campanule. (Beaune. — M. *Bourlier*. Sous les écorces; rare. — M. *Arias*.)

503. N. QUADRIPISTULATA. *F.* Pas commune. Sous les cadavres desséchés. Mai, juin. Dijon, au champ de manœuvre de la Maladière, chemin au midi de Montmuzard. (Beaune. — M. *Bourlier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

SORONIA. *Erich.* — NITIDULA. *F.*

504. S. PUNCTATISSIMA. *Ill.* Très-rare. Combe de Gevrey, en fauchant sur les pousses de chêne. Mai.

505. S. GRISEA. *Linn.* — Variété VARIA. *F.* Pas commune. Mai, juin. Combe de Gevrey en fauchant dans une coupe. Dijon, au vol près des saules le soir, à la fontaine de Larrey et près du ruisseau qui sort du clos de Pouilly. (Beaune; sous les écorces. — M. *Arias*.) (Rouvray; commune. — M. *Emy*.)

AMPHOTIS. *Erich.* — NITIDULA. *F.*

506. A. MARGINATA. *F.* Pas rare. Sous les écorces, dans le bois pourri, sous les pierres, etc. Dijon, au Parc, dans le bois pourri au bas d'un charme creux, en société avec la *Formica fuliginosa*, septembre; chemin près du vieux Suzon, sous une pierre avec la même espèce de fourmi, mai; fontaine de Larrey, le soir au vol et en fauchant, juin. Plombières, combes de Neuvon à Darois et de Neuvon à Prenois, en fauchant, juin, juillet. Gevrey, sur le chemin de Saulon, près du bois, dans le terreau au pied d'un saule creux, en société avec la *Formica fuliginosa*; août. Curley, bois des Liards, entre des plateaux de hêtre superposés dans une coupe. Fin septembre, 10 novembre. (Rouvray; pas commune. — M. *Emy*.)

OMOSITA. *Erich.* — NITIDULA. *F.*

507. O. DEPRESSA. *Linn.* — SORDIDA. *F.* Très-rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*)

508. O. COLON. *Linn.* Rare. Avril, juin, juillet. Dijon, trouvée sur la barrière au-dessus du débarcadère du chemin de fer; le soir au vol, dans la ville et à la fontaine de Larrey. (Beaune. — MM. *André* et *Bourlier*. En battant les arbres; printemps. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

509. O. DISCOIDEA. *F.* — DISCOIDES. *F.* Pas rare. Sur les os provenant des aliments, surtout ceux de bœuf lorsqu'on les expose dans les cours ou les jardins. Avril, mai. Dijon. sur les os de bœuf, et quelquefois sur les vitres dans les maisons. Chambolle. (Rouvray. — M. *Emy.*)

PRIA. *Kirby.* — NITIDULA. *F.*

510. P. DULCAMARÆ. *Ill.* Commune. Sur la douce-amère, *Solanum dulcamara*, sur la fleur et les feuilles de cette plante. Fin juin, juillet. Dijon, le long de l'Ouche, près des Blanchisseries et près de la route de Plombières. Talant, entre le village et la route de Plombières. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Govrey, près du petit étang de Satenay, sur le *Solanum*; et dans le bois d'aulnes, sous les détritrus, le 3 septembre. (Beaune, — M. *André.*)

MELIGETHES. *Kirby.* — NITIDULA. *F.*

511. M. RUFIPES. *Gyll.* Commun. Sur les plantes et les fleurs dans les bois, surtout les fleurs de campanules. Mai, juin. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant dans une jeune taille. Chambolle. (Beaune. — MM. *Arias*, *André* et *Bourlier.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)





512. M. LUMBARIS. *Sturm.* — RUTIPES, var. b. *Gyll.* Pas commun. Environs de Dijon.

513. M. HERES. *Erichs.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

514. M. ÆNEUS. *F.* Très-commun. Sur les fleurs de différentes plantes et surtout des crucifères. Depuis le mois d'avril au commencement de juillet. Dijon, autour de la ville, dans les champs de navette, sur la fleur de cette plante; au Parc, sur les fleurs de *Ficaria ranunculoides*; sur la barrière au-dessus du débarcadère du chemin de fer, etc. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Blaisy-Bas, dans le bois en fauchant. Chambolle, sur différentes fleurs, pissenlit, etc. (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

515. M. VIRIDESCENS. *F.* — ÆNEUS. Var. VIRIDESCENS. *Dej.* Pas très-commun. Sur les plantes et les fleurs. Printemps, été. Dijon, au Parc, sur des fleurs de la petite pervenche, *Vinca minor*. Gevrey, près du grand étang de Satenay en fauchant dans un fossé. (Rouvray; rare. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *André.*)

516. M. CORACINUS. *Sturm.* Pas commun. Plombières, combe de Neuvon. Juillet.

517. M. CORVINUS. *Erichs.* Pas rare. En fauchant dans les bois ombragés. Avril, mai. Dijon, au Parc, sur les fleurs de *Ficaria ranunculoides*. Fixin, bois près du chemin de fer. (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

518. M. SUBRUGOSUS. *Gyll.* — PEDICULARIUS. Var. SUBRUGOSUS. *Dej.* Commun. Sur les fleurs d'*Helleborus foetidus*, *Anemone pulsatilla*, *Ficaria ranunculoides* et autres fleurs printanières. Avril. Dijon, au Parc, à la Combe-aux-Serpents, etc. Plombières, combe de Neuvon, etc. Trouvé aussi en juillet.

519. M. SYMPHYTI. *Hér.* Pas rare. Dans les fleurs de



*Symphytum officinale*. Mai, juillet. Gevrey, bord du petit étang de Satenay.

520. M. OCHROPUS. *Sturm*. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant. Juin, juillet, septembre.

521. M. PEDICULARIUS. *Gyll*. Pas rare. Environs de Dijon. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Juillet.

522. M. SERRIPES. *Gyll*. Commun. Environs de Dijon. (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

523. M. TRISTIS. *Sturm*. Pas commun. Environs de Dijon.

524. M. FLAVIPES. *Sturm*. Pas commun. Avril, mai. Dijon, au Parc, sur les fleurs de *Ficaria ranunculoides*. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant.

525. M. ERYTHROPUS. *Gyll*. — PEDICULARIUS. Var. ERYTHROPUS. *Dej*. Très-commun. Sur les fleurs. Mai, juin, septembre. Environs de Dijon. Talant, sur les fleurs d'*Erysimum cheirifolium*. Plombières, combe de Neuven. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Beaune. — M. *Bourlier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

526. M. SUBENEUS. *Sturm*. Un seul exemplaire. Dijon, au bord de l'Ouche, près du moulin Vesson, sur les fleurs de *Spiraea ulmaria*. 12 août.

THALYCRA. *Erich*. — STRONGYLUS. *Herbst*.

527. T. SERICEA. *Sturm*. Environs de Dijon. Je crois, mais sans en être bien certain, que l'unique exemplaire que je possède a été pris par moi, dans la combe de Neuven, près de Darois, en juillet.

POCADIUS. *Erich*. — STRONGYLUS. *Herbst*.

528. P. FERRUGINEUS. *F*. (Environs de Dijon, au pied d'un frêne cassé sur la route de Gray, près de Montmuzard; mars. — M. *Nodot*.) Villenote, près Semur; pas rare dans





les lycoperdons, dans la partie sud-ouest du bois de Champeaux ; 22 octobre. (Rouvray. — M. Emy.)

CYCHRAMUS. Kugel. — STRONGYLUS. Herbst.

529. C. FUNGICOLA. Héer. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant, un seul exemplaire ; le 26 juin 1851. (Beaune. — MM. Bourlier et André. Pas rare.)

530. C. LUTEUS. F. Rare. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Juillet. Chambolle, dans la combe sur des feuilles. (Beaune ; champignons ; automne ; commun. — MM. Arias, Bourlier et André.) (Rouvray ; pas commun. — M. Emy.)

CRYPTARCHA. Schuck. — STRONGYLUS. Herbst.

531. C. STRIGATA. F. (Rouvray. — M. Emy.)

532. C. IMPERIALIS. F. (Environs de Dijon. — M. Tarnier. (Beaune ; rare. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

IPS. F.

533. I. QUADRINOTATA. F. (Rouvray ; plaies des chênes et autres arbres ; assez rare. — M. Emy.)

534. I. QUADRIPUSTULATA. Linn. Létang-Vergy, sous une écorce de noyer abattu ; un exemplaire ; le 20 octobre 1841. (Rouvray ; comme le précédent. — M. Emy.)

RHIZOPHAGUS. Herbst.

535. R. FERRUGINEUS. Payk. (Rouvray ; pas commun ; sous les écorces. — M. Emy.)

536. R. PARALLELOCOLLIS. Gyll. Pas très-rare. Sur le bois récemment coupé ou abattu. Avril, mai, mai, juin. Dijon, au Parc, sur du bois coupé, ou au vol près de ce bois ; chemin entre celui de Fontaine et celui d'Ahuy, le soir au vol, par un temps très-chaud. Villenote, près Semur, en fauchant dans le bois. (Beaune. — M. Bourlier.)

537. *R. BIPUSTULATUS. F.* Commun. Sous les écorces d'arbres morts, sur pied ou abattus, et aussi sous l'écorce de la souche qui reste après que l'arbre est coupé. Hiver, printemps, automne. Dijon, au Parc, sous les écorces de charme et de platane. Chambolle, écorces de noyers et celles des souches dans les bois. (Savigny près Beaune, Fontaine-Froide. — *M. Bourlier.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

538. *R. POLITUS. Hellw.* Pas commun. Dans les bois, sous les écorces d'arbres abattus, sur les planches et autres bois récemment façonnés dans les coupes en exploitation. Avril, mai, juin, juillet, septembre. Fixin, bois près du chemin de fer. (Epernay. — *M. Saintpère.*) Chambolle. Saint-Nicolas - les - Cîteaux, forêt de Cîteaux, sous les écorces humides. (Rouvray; fort rare. — *M. Emy.*)

TROGOSITA. *Oliv.*

539. *T. MAURITANICA. Linn.* — *CARABOIDES. F.* (Dijon; dans une maison dans la ville; 27 mai. — *M. Tarnier.*)

---

**COLYDII.**

---

DIODESMA. *Meg.*

540. *D. SUBTERRANEA. Ziegl.* Rare. Combe de Flavignerot, en battant des fagots. Avril, juin.

COXELUS. *Ziegl.*

541. *C. PICTUS. Sturm.* Rare. Fixin, bois près du chemin de fer, sous des ételles humides, dans une coupe en exploitation. Mai. (Beaune. — *M. André.*) (Rouvray, très-commun en battant les haies sèches. — *M. Emy.*)





DITOMA. III. — BITOMA. Herbst.

542. D. CRENATA. F. Commune. Dans les bois, sous les écorces d'arbres abattus et des souches restant après que les arbres sont coupés, sur le bois empilé dans les coupes, entre les planches, etc., et au vol le soir. Printemps, automne. Dijon, au parc, sous des écorces d'orme; chantiers de bois à brûler sur le bassin du Canal. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey. Chambolle. Curley. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. (Beaune. — M. Arias. Dans un chantier de charpentier, sous des écorces d'arbres; octobre. — M. Bourlier.) (Rouvray. — M. Emy.)

Variété RUFIPENNIS. F. Avec le type de l'espèce. Elle n'est bien certainement due qu'à une transformation récente.

COLOBICUS. Latr.

543. C. MARGINATUS. Latr. Pas commun. Sous les écorces, sur le bois mort abattu et sur les troncs de tilleuls sur pied, mais qui commencent à être malades. Hiver, printemps. Dijon, au Parc, sous les écorces de sycomore et sur du bois empilé; Allée-de-la-Retraite, sur les tilleuls. Plombières, au bord de la route, sous des écorces de noyers abattus.

SYNCHITA. Hellw.

544. S. JUGLANDIS. F. Rare. Dijon, Allée-de-la-Retraite, le soir sur les troncs de tilleuls qui commencent à se carier. Juin, juillet. (Rouvray; en battant les haies sèches; commencement de juin. — M. Emy.)

CICONES. Curtis. — SYNCHITA. Hellw.

545. C. VARIEGATUS. Hellw. Très-rare. Dijon, au Parc, sur du bois mort empilé; un seul exemplaire; fin de mai.



AULONIUM. *Erichs.* — COLYDIUM. *F.*

546. A SULCATUM. *Oliv.* (Pontailler-sur-Saône, sous des écorces d'arbres abattus dans un bois au bord de la Saône; 2 juin. — M. *Dudrumel.*)

COLYDIUM. *F.*

547. C. ELONGATUM. *F.* Très-rare. Juillet. Trouvé à Dijon dans une maison. (Rouvray; sous les écorces d'une souche, au bois Denier. — M. *Emy.*)

TEREDUS. *Dej.*

548. T. PUNCTICOLLIS. *Dej.* (Rouvray; rare. — M. *Emy.*)


CERYLON. *Latr.*

549. C. HISTEROIDES. *F.* Pas rare. Sous les écorces humides, au pied des arbres morts. Mars, avril, mai, juillet, septembre. Dijon, au Parc, sous les écorces de charme; fontaine de Larrey, au pied d'un saule mort. Chambolle, écorces des souches de chêne et écorces de cerisier. Curley, bois des Liards, entre des plateaux de hêtre. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans la forêt de Cîteaux, sous les écorces de chênes morts sur pied et de souches de chêne. (Savigny, près Beaune; Fontaine-Froide; octobre. — M. *Bourlier.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

550. C. ANGUSTATUM. *Erichs.* Rare. Forêt de Cîteaux, partie en futaie sur le territoire de Saint-Nicolas-les-Cîteaux, sous les écorces de chênes morts sur pied, au bas de l'arbre. Juillet, septembre.

PYCNUMERUS. *Erich.* — CERYLON. *Latr.*

551. P. TEREBRANS. *Oliv.* (Rouvray; rare. — M. *Emy.*)







**CUGUJI.**

**LÆMOPHLOEUS. Dej.**

552. *L. MONILIS. F.* Rare. Quelquefois cependant on le trouve en certaine quantité. Mai, juin, juillet. Dijon, au Parc, sur du bois coupé empilé et sur des troncs sciés de tilleul; sur ces troncs, qui étaient raboteux et très-inégaux, j'ai trouvé cet insecte abondamment en soufflant fortement sur les parties creuses, dans lesquelles il se tenait caché sous l'épiderme et sous quelques débris, on le voyait aussitôt sortir de sa retraite; (rempart de Tivoli. — *M. Nodot.*) (Rouvray; en battant les haies sèches. — *M. Emy.*)

553. *L. TESTACEUS. F.* — *AMYGDALEUS. Sch.* Commun. Sous les écorces d'arbres morts. Presque toute l'année. Dijon, au Parc, sous les écorces de charmes abattus; dans la ville, sur les vitres d'un grenier où se trouvait du bois à brûler. Lux, forêt de Velours, sous les écorces de hêtres abattus. Chambolle, écorces de hêtres abattus et écorces des souches de chênes et autres arbres. (Rouvray. — *M. Emy.*)

554. *L. DUPLICATUS. Waltl.* Rare. Environs de Dijon.

555. *L. PUSILLUS. Sch.* Rare. Environs de Dijon.

556. *L. FERRUGINEUS. Creutz.* Un exemplaire trouvé à Dijon, dans de la soupe, en août. Cet insecte doit vivre dans la farine.

**BRONTES. F.**

557. *B. PLANATUS. Linn.* — *FLAVIPES. F.* Pas rare. Sous les écorces d'arbres morts, sur pied ou abattus, et sur le bois coupé. Printemps, automne, hiver. Dijon, au Parc, sous les écorces de charme et de platane et sur du bois coupé empilé; au vol, près des chantiers du bassin du Canal; sur

la barrière au-dessus du débarcadère ; entre le Canal et l'Ouche , dans la pépinière près de l'écluse de Larrey, sous des écorces de peupliers abattus. (Beaune; dans un chantier de charpentier. — M. *Bourlier*.) (Rouvray ; rare. — M. *Emy*.)

---

## CRYPTOPHAGI.

---

SYLVANUS. *Lutr.*

558. S. FRUMENTARIUS. *F.* — SEXDENTATUS. *F.* Commun. Dans les magasins et les greniers où l'on conserve du blé. Dijon, dans la ville. Villenote, près Semur. Septembre.

559. S. BIDENTATUS. *F.* Pas rare. Sous les écorces. Printemps, été. Fixin, bois près du chemin de fer, sous des ételles dans une coupe. Chambolle, écorces d'arbres abattus. (Savigny, près Beaune, sous des écorces de vieux chênes; octobre. — M. *Bourlier*.)

560. S. UNIDENTATUS. *F.* Très-commun. Sous les écorces d'arbres abattus et des souches. Toute l'année. Dijon, au Parc, sous les écorces de charmes abattus et sur pied. pépinière près de l'écluse de Larrey, sous des écorces de peupliers abattus. Plombières, sous l'écorce d'un noyer abattu sur la route. (Fauverney, à la Bayotte, sous des écorces de vieux chênes coupés. — M. *Nodot*.) Fixin, bois près du chemin de fer. Lux, forêt de Velours, sous l'écorce d'un hêtre abattu. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Chambolle. Curley, bois des Liards, entre des plateaux de hêtre. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *Bourlier*.)

561. S. SIMILIS. *Vesmacl.* (Beaune. — MM. *André et Arias*.) (Rouvray ; en battant les haies. — M. *Emy*.)

562. S. POPULI. *Chevr.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.





PSAMMOECIUS. *Latr.* PSAMMÆCHUS. *Boudier.*

563. P. BIPUNCTATUS. *F.* Pas rare. Gevrey, sous les détritus, dans le bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Avril, mai, août, septembre.

LYCTUS. *F.*

564. L. CANALICULATUS. *F.* Très-commun. Sur le bois coupé et dans les maisons, où il perfore les meubles et les boiseries; on le trouve ordinairement, quand il fait du soleil, sur les vitres des croisées exposées au midi. Mai, juin. Dijon, dans les maisons dans la ville, dans les bûchers et les chantiers de bois à brûler; sur les arbres abattus au Parc et sur les routes. Plombières. Fixin, bois près du chemin de fer. Chambolle, etc., etc. (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

565. L. BICOLOR. *Comolli.* Rare. Plombières-les-Dijon, sur un noyer coupé au bord de la route; 31 mai.

566. L. COLYDIOIDES. *Dej.* (Dijon. — M. *Nodot*, d'après M. *Emy.*)

TELMATOPHILUS. *Hér.* CRYPTOPHAGUS. *Herbst.*

567. T. TYPHEÆ. *Fallen.* Rare. Dijon, fontaine de Larrey, en fauchant sur le bord du ruisseau.

568. T. CARICIS. *Oliv.* Rare. Dijon, sous les feuilles mortes au bas du mur au nord du clos de Pouilly, près du chemin de Ruffey; trouvé aussi dans une maison dans la ville, sur les vitres d'une croisée. Avril, juillet. (Rouvray. — M. *Emy.*)



ANTHEROPHAGUS. *Knoch.*

569. A. NIGRICORNIS. *F.* Rare. Juillet. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Chambolle. (Rouvray, — M. *Emy.*)

570. A. PALLENS. *Gyll.* Pas rare. Fin juin, juillet. Plombières, combes de Neuvon à Darois et de Neuvon à Pre-nois, en fauchant. (Beaune. — M. *Bourlier.*)

CRYPTOPHAGUS. *Herbst.*

571. C. LYCOPERDI. *F.* — CELLARIS. Var. LYCOPERDI. *Dej.* Pas commun. Sous les pierres, et en fauchant dans les bois. Printemps, été. Dijon, chemin de Daix, sous les pierres au bas d'une haie. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Villenote, près Semur, bois de Champeaux, dans les lycoperdons. (Beaune. — M. *André.*)

572. C. SCANICUS. *Linn.* — CELLARIS. Var. SCANICUS. *Dej.* Commun. Dans les maisons, surtout dans les caves sur les tonneaux, dans les latrines et autres lieux un peu obscurs et humides; dans les bois, en fauchant et sous les feuilles mortes et les détritns. Printemps, été, automne. Environs de Dijon et dans la ville. Plombières, combe de Neuvon, en battant les fagots. Gevrey, bord du petit étang de Sate-nay, sous les détritns dans le bois d'aulnes. Chambolle, dans les caves, sur le fond des tonneaux. (Beaune; rare. — MM. *Arias* et *Bourlier.*) Villenote, bois de Champeaux, en fauchant.

Variété CELLARIS. *Sturm.* Comme le type de l'espèce. Commun également; dans les mêmes localités. (Rouvray. — M. *Emy.*)

573. C. ACUTANGULUS. *Gyll.* — CELLARIS. Var. ACUTANGU-lus. *Dej.* Rare. Environs de Dijon.

574. C. FUMATUS. *Gyll.* — CELLARIS. Var. FUMATUS. *Dej.* Pas rare. Sous les pierres. Environs de Dijon, autour de la ville.





575. *C. DENTATUS*. *Herbst*. Commun. Environs de Dijon. (Beaune. — MM. *Arias et Bourlier*.)

576. *C. BICOLOR*. *Sturm*. Rare. Dijon, dans les maisons, surtout les latrines et les lieux où les murs sont humides et présentent quelques traces de moisissure ; par les temps humides. Mars, novembre. (Rouvray. — M. *Emy*.)

577. *C. CRENULATUS*. *Erich*. — *CRENATUS*. *Gyll*. Rare. Environs de Dijon. Dijon, chemin de Daix, le soir au vol. Juillet.

ATOMARIA. *Kirby*. — *CRYPTOPHAGUS*. *Herbst*.

578. *A. NANA*. *Erichs*. Pas commune. Avril, juillet, août, septembre. Dijon, chemin de Daix, sous les pierres. Gevrey, au bord du petit étang de Satenay, sous les détritns, dans le bois d'aulnes.

579. *A. UMBRINA*. *Gyll*. Pas commune. Environs de Dijon. (Beaune ; sous les meules de foin ; octobre. — M. *Bourlier*.)

580. *A. LINEARIS*. *Steph*. Pas rare. Sous les pierres et les détritns. Dijon, chemin de Daix, sous les pierres au bas d'une haie ; 30 avril.

581. *A. MESOMELAS*. *Payk*. (Rouvray. — M. *Emy*.)

582. *A. GUTTA*. *Steph*. Un seul exemplaire. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sous les détritns. Mai.

583. *FUSCIPES*. *Gyll*. Pas commune. Environs de Dijon.

584. *A. NIGRIPENNIS*. *Payk*. Pas commune. Dans les maisons, surtout dans les caves sur les tonneaux moisés. Printemps, été. Dijon, dans les caves et les celliers, sur les tonneaux. Fixin, bois près du chemin de fer, sous des ételles humides et un peu moisies. (Beaune ; commune. — MM. *Arias et Bourlier*.)

585. *A. COGNATA*. *Erichs*. Pas rare. Environs de Dijon. (Beaune ; sous les meules de foin ; octobre. — M. *Bourlier*.)

586. A. ATRA. *Herbst.* — FIMETARIA. *F.* Pas rare. Environs de Dijon.

587. A. GRAVIDULA. *Erichs.* Rare. Environs de Dijon.

588. A. PUSILLA. *Payk.* Très-commune. Le soir, au coucher du soleil, au vol, par un temps très-chaud, à Dijon, à la fontaine de Larrey, en juin, et en fauchant le long du ruisseau sur les graminées. (Beaune; sous les meules de foin; octobre. — M. *Bourlier.*)

589. A. TERMINATA. *Dahl.* Commune. Sous les pierres et les détritüs. Avril, mai, juillet. Dijon, chemin de Daix, sous les pierres au bas des haies, et au vol le soir; Vieux-Suzon, etc. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sous les détritüs. (Beaune; sous les meules de foin; octobre. — MM. *Bourlier* et *André.*)

590. A. VERSICOLOR. *Erich.* Pas commune. Environs de Dijon.

EPISTEMUS. *Erich.*

591. E. DIMIDIATUS. *Sturm.* Commun. Sous les pierres au bord des chemins, surtout celles qui recouvrent du fumier ou des excréments. Avril, septembre. Dijon, chemin de Daix, chemin entre celui de Fontaine et celui d'Ahuy, etc. Fontaine. Villenote, près Semur, en fauchant dans le bois de Champeaux. (Beaune; très-commun sous les meules de foin; octobre. — MM. *Bourlier* et *André.*)

592. E. GLOBULUS. *Payk.* Pas commun. Environs de Dijon. (Beaune; sous les meules de foin; octobre. Un seul exemplaire. — M. *Bourlier.*)

MYCETÆA. *Steph.* — CRYPTOPHAGUS. *Herbst.*

593. M. HIRTA. *Marsh.* Commune. Dans les maisons, surtout les caves, les bûchers, les latrines et les lieux un peu obscurs et humides où se développe de la moisissure.





Printemps, été, automne. Dijon, dans les maisons. Trouvée en décembre sur une bûche de bois mise sur le feu. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

ALEXIA. *Steph.* — HYGROTOPHILA. *Chevr.*

594. A. PILIFERA. *Müll.* — PILIGERA. *Germ.* Pas rare. Sous les écorces, les planches humides, en battant les fagots, etc. Mai, juin, juillet. Dijon, au Parc, sous des écorces de charmes abattus, sur lesquels existait de la moisissure et d'autres petits cryptogames. Flavignerot, en battant de vieux fagots. Fixin, dans le bois près du chemin de fer, sous des ételles humides et un peu moisies en dessous.

ENGIS. *Payk.*

595. E. HUMERALIS. *F.* Rare. Sous les écorces. Janvier à Mai. Dijon, au Parc, sous les écorces d'arbres abattus, surtout d'ormes, et sur du bois coupé empilé. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant, le 13 juillet. (Rouvray. — M. *Emy*.)

TRITOMA. *F.* — TRIPLAX. *F.*

596. T. BIPUSTULATA. *F.* Rare. Dans les champignons qui croissent sur les arbres, sous les écorces, etc. Printemps, été. Dijon, au Parc, sur du bois mort empilé; au bord de l'Ouche dans un saule pourri. Epernay. Chambolle, sur un agaric sur un noyer dans la combe. Concœur, bois de Mantuan, sur un hêtre mort sur pied et couvert de petits champignons. Curley, bois des Liards, sur une feuille. (Rouvray; commune sous les écorces, dans les caries des chênes et en battant les haies sèches. — M. *Emy*.)

TRIPLAX. *Linn.*

597. T. RUSSICA. *Linn.* — NIGRIPENNIS. *F.* Pas rare. Dans les champignons qui croissent sur le tronc des arbres. Juin



à septembre. Dijon, au Parc, sur du bois mort empilé, cours du Parc et route de Langres, dans les agarics sur le tronc des frênes. Chambolle, dans un bolet de noyer dans la combe. (Pontailler. — M. *Dudrumel*.) (Beaune; en battant les arbres; rare. — M. *Arias*.) (Rouvray; rare. — M. *Emy*.)

598. T. RUFIPES. *Payk*. — COLLARIS. *Schaller*. Trouvée communément le 2 juin par M. *Dudrumel* à Pontailler-sur-Saône, sur des champignons qui croissent sur les arbres, dans les bois au bord de la Saône.

SPHINDUS. *Meg*.

599. S. GYLLENHALII. *Dej*. (Rouvray; dans les agarics et en battant les haies sèches. — M. *Emy*.)

---

**LATHRIDII.**

---

MONOTOMA. *Herbst*.

600. M. PICIPES. *Herbst*. Pas rare. Dans les maisons, au vol le soir, etc. Été. Dijon, dans la ville, sur les vitres d'un bûcher, au vol dans les rues le soir au soleil couchant par des temps chauds; bords du bassin du Canal. (Beaune. — M. *Arias*. Sous des meules de foin, octobre. — M. *Bourlier*.)

601. M. CONICICOLLIS. *Guérin*. Rare. Bois de Marsannay-la-Côte, près du parc de Gouville, en fauchant sur l'herbe, près d'une fourmilière de *Formica rufa*, le 27 mai. Plombières, combe de Neuvo, dans les fourmilières de la même espèce de fourmi. Octobre, 1<sup>er</sup> novembre.

602. M. ANGUSTICOLLIS. *Gyll*. Plombières, combe de Neuvo, dans les fourmilières de *Formica rufa*; pas rare. Oc-





tobre. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans les fourmilières de la même fourmi. Septembre. (Rouvray; en fauchant près de la mare de la corne des trois bois, le 19 juillet 1840.

— M. Emy.)

603. M. LONGICOLLIS. *Gyll.* Rare. Environs de Dijon.

604. M. BREVICOLLIS. *Aubé.* Pas commune. Dijon, chemin de Daix, sous des pierres au bas d'une haie, le 30 avril. Fontaine, chemin de Daix à Dijon, sous des pierres recouvrant un fumier. Octobre.

605. M. QUADRICOLLIS. *Aubé.* Rare. Dijon, sur un chemin entre celui d'Ahuy et celui de Fontaine, sous des pierres recouvrant des restes de fumier, le 4 avril.

MYRMECOXENUS. *Chevr.* — MYRMECHIXENUS. *Chevr.*

606. M. SUBTERRANEUS. *Chevr.* Pas rare. Dans les fourmilières de *Formica rufa*, dans les bois, au moyen du tamis. Avril, mai. Plombières, bois près de la ferme de la Cras. Gevrey, bois de la plaine.

LATHRIDIUS. *Herbst.*

607. L. ANGUSTICOLLIS. *Meg. Schüpp.?* (Rouvray. — M. Emy.)

608. L. CONSTRICTUS. *Gyll.* Pas rare. Environs de Dijon. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux, sous les écorces; septembre. (Beaune, sous les meules de foin; octobre. — M. Bourlier.)

609. L. CLATHRATUS. *Dahl.* Rare. Environs de Dijon.

610. L. EXILIS. *Dej.* Rare. Dans les bûchers, sur le bois à brûler. Dijon.

611. L. COLLARIS. *Mann.* — RUFICOLLIS. *Chevr.* (Rouvray; dans les débris de plantes médicinales chez M. Cogniot; 1839. — M. Emy.)

612. L. TRANSVERSUS. *Oliv.* — SCULPTILIS. *Schüpp.* Pas

commun. Sous les pierres. Mars, avril. Dijon, chemin de Daix, etc. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sous les détritrus. (Beaune; sous les meules de foin; octobre. — M. *Bourlier*.)

613. L. PORCATUS. *Herbst*. Très-commun. Dans les maisons, surtout dans les caves, sur les tonneaux, dans les latrines et les autres endroits un peu humides, sur les murs. Presque toute l'année. Dijon, dans les maisons dans la ville. (Beaune; troncs d'arbres; rare. — M. *Arias*. Sous des meules de foin; octobre. — MM. *Bourlier* et *André*.)

614. L. FILIFORMIS. *Dej*. Rare. Dans les maisons. Août, novembre, décembre. Dijon, sur les murs dans les maisons, sous des papiers humides et un peu moisissés; trouvé aussi sur une bûche de bois mise sur le feu.

615. L. CARBONARIUS. *Chevr*. Pas commun. Dans les bûchers sur le bois à brûler. Dijon.

616. L. ELEGANS. *Markel*. (Rouvray; dans les débris de plantes médicinales chez M. *Cogniot*; 1859. — M. *Emy*.)

617. L. IMPRESSUS... (Rouvray. — M. *Emy*.)

618. L. MARGINATUS... (Rouvray. — M. *Emy*.)

CORTICARIA. *Marsh*. — LATHRIDIIUS. *Herbst*.

619. C. PUBESCENS. *Ill*. Commune. Sous les écorces, en battant les fagots, etc. Printemps, été, automne. Dijon, au Parc. Plombières, combe de Neuvo, en battant les fagots. Flavignerot, en battant les fagots. Chambolle. (Beaune; sous les meules de foin; octobre. — MM. *Bourlier* et *André*, en battant les fagots. — M. *Arias*. Savigny, près Beaune, sous les écorces de vieux chênes. M. *Bourlier*.)

620. C. CRENULATA. *Schüpp*. Pas commune. Sous les écorces. Environs de Dijon.

621. C. DENTICULATA. *Schüpp*. Rare. Sous les écorces. Environs de Dijon.

622. C. SERRATA. *Gyll*. Rare. Environs de Dijon.





623. *C. ELONGATA*. *Schüpp.* Commune. Sous les écorces ; dans les bûchers sur le bois. Printemps été. Dijon , intérieur des maisons , dans les latrines ; chemin de Daix , le soir au vol.

624. *C. FERRUGINEA*. *Marsh.* Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sous les détrit<sup>us</sup> dans le bois d'aulnes ; 5 septembre.

625. *C. GIBBOSA*. *Herbst.* Pas rare. Sous les écorces et les détrit<sup>us</sup>. Printemps. Dijon , au Parc, sous les écorces de platane ; au bas du mur au nord du clos<sup>e</sup> de Pouilly, sous les feuilles sèches. (Beaune ; rare. — *M. Arias*. Sous les meules de foin ; octobre. — *MM. Bourlier et André.*)

626. *C. TRANSVERSALIS*. *Schüpp.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Rouvray, sous les écorces et en battant les haies sèches. — *M. Emy.*)

627. *C. SIMILATA*. *Schüpp.* Rare. Environs de Dijon.

628. *C. DISTINGUENDA*. *Chevrier.* Environs de Dijon. (Beaune. — *M. Bourlier.*) (Rouvray, dans les débris de plantes médicinales, chez *M. Cogniot*. — *M. Emy.*)

629. *C. FUSCULA*. *Meg.* Commune. Sous les pierres, les écorces, etc. Mars à juin. Dijon , chemin de Daix, sous les pierres ; barrière au-dessus du débarcadère ; au Parc , sur du bois coupé. Fixin , bois près du chemin de fer, en fauchant.

DASYCERUS. *Brongniart.*

630. *D. SULCATUS*. *Müll.* Un seul exemplaire trouvé à Plombières dans la combe de Neuvon , dans une fourmière abandonnée de *Formica rufa*, le 29 octobre 1854. (Beaune ; sur des bolets, sur un arbre dans un bois. Septembre. — *MM. Bourlier et André.*)

---



## MYCETOPHAGI.

### MYCETOPHAGUS. *Hellw.*

631. *M. QUADRIPUSTULATUS*. *Linn.* — *QUADRIMACULATUS*. *F.*  
Rare; trouvé cependant quelquefois au Parc en assez grande quantité. Sous les écorces. Printemps, été, automne et aussi l'hiver. Dijon, au Parc, sous les écorces d'ormes morts, sur pied où abattus, et sur lesquels se développent des cryptogames, sur du bois coupé empilé; fontaine de Larrey, le soir au vol. (Au Parc, dans un bolet de tilleul. — *M. Tarnier.*)

632. *M. PICEUS*. *F.* — *VARIABILIS*. *Gyll.* Très-rare. Sous les écorces. Dijon, à l'Arquebuse, sous une écorce de platane; Allée-de-la-Retraite, sur un tronc de tilleul, le soir, en juin. (Rouvray; pas commun. — *M. Emy.*)

633. *M. ATOMARIUS*. *F.* Rare. Sous les écorces d'arbres morts et sur le bois mort coupé. Février, avril, mai, juin, août. Dijon, dans les maisons, sur du bois à brûler provenant de vieux hêtres pourris; au Parc, sur du bois coupé. Concoeur, bois de Mantuan, sur un vieux hêtre creux abattu. (Courlon, écorces de hêtre. — *M. Eug. Guillaume* [1].) (Pontailler-sur-Saône, dans les champignons qui croissent sur les arbres, dans les bois près de la Saône. — *M. Dudrumel.*) (Rouvray, dans les vieux hêtres; pas commun. — *M. Emy.*)

634. *M. QUADRIGUTTATUS*. *Müller.* — *TETRATOMA*. *Dej.*  
Trouvé plusieurs exemplaires de cette espèce à Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans la forêt de Cîteaux, en tamisant de la poussière de bois recueillie au bas du tronc d'un chêne creux; 23 septembre.

---

(1) Actuellement sculpteur à Paris. S'est occupé d'Entomologie à Dijon en 1835, 1836 et 1837.





LITARGUS. *Erich.* — *TRIPHYLLUS. Meg.*

635. L. BIFASCIATUS. *F.* Commun. Sous les écorces d'arbres morts et sur les arbres abattus. Toute l'année. Dijon, au Parc, sous des écorces de platane, de charme et autres arbres morts, sur du bois mort empilé. Fixin, bois près du chemin de fer, sous une écorce de chêne abattu. Chambolle, écorces de hêtre. Curley, bois de Mantuan, écorces de hêtre. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. (Rouvray, en battant les haies sèches. — *M. Emy.*) (Beaune. — *M. Arias.* Dans un chantier de charpentier, sous les écorces d'arbres ; octobre. — *M. Bourlier.*)

DIPLOCOELUS. *Guérin.* — *TRIPHYLLUS. Meg.*

636. D. FAGI. *Chevrolat.* — *SERRATUS. Dej.* Pas commun. Ecorces de hêtres abattus. Printemps, automne. Chambolle. Curley, bois de Mantuan.

TIPHÆA. *Kirb.* — *TRIPHYLLUS. Meg.*

637. T. FUMATA. *Linn.* Très-commune. Au vol, le soir surtout, près des chantiers de bois à brûler, etc. Été. Dijon, chantiers près du bassin du Canal, à la fontaine de Larrey, sur le chemin de Daix, quelquefois même dans les rues de la ville, par les soirées très-chaudes. (En fauchant dans les bois. — *M. Nodot.*) (Beaune, sous les meules de foin ; octobre. — *M. Bourlier.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

---

## DERMESTÆ.

---

BYTURUS. *Latr.*

638. B. TOMENTOSUS. *F.* Assez commun. Sur les fleurs de ronce, surtout dans les bois, et en fauchant. Juin, juillet.

Dijon, Combe-aux-Serpents. Plombières, combe de Neuvon. Blaisy-Bas, dans le bois. (Beaune. — M. *Bourlier*. Dans les champignons, l'été; pas commun. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

659. B. FUMATUS. *Linn.* — TOMENTOSUS. Var. FUMATUS. *F.* Très-commun. Dans les bois, sur les fleurs des plantes printanières. Mai, juin, commencement de juillet. Dijon, au Parc, sur les fleurs de *Leontodon taraxacum*, d'*Anthriscus sylvestris*, de *Ficaria ranunculoides*, etc. Plombières, combe de Neuvon. (Beaune; rare. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

DERMESTES. *Linn.*

640. D. VULPINUS. *F.* Pas commun. Sur les cadavres d'animaux. Printemps Environs de Dijon. Ahuy, sous les pierres au bord de Suzon, près du lavoir; novembre. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

641. D. FRISCHII. *Kug.* Pas rare. Sur les cadavres. Printemps. Environs de Dijon. Dijon, Combe-aux-Serpents.

642. D. MURINUS. *Linn.* — CATTI. *Panz.* Rare. Sur les cadavres. Printemps. Environs de Dijon. Dijon, cours du Parc, sur l'herbe des fossés. (Pontailler-sur-Saône, sous la mousse; octobre. — M. *Dudrumet*.) (Beaune; pas rare. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

643. D. UNDULATUS. *Brahm.* Pas rare. Sur les cadavres. Mai, juin. Dijon, autour de la ville; fossés du cours du Parc, sur l'herbe; champ de manœuvre de la Maladière. Talant. (Rouvray; pas commun. — M. *Emy*.)

644. D. MUSTELINUS. *Erich.* — MURINUS. *Dej.* Pas rare. Sur les cadavres. Environs de Dijon. (Beaune. — M. *Bourlier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

645. D. LANIARIUS. *Ill.* Commun. Sur les cadavres. Juin. Dijon, champ de manœuvre à la Maladière, etc. (Beaune. M. *Bourlier*.)





646. D. ATER. *Oliv.* Rare. Sous les écorces et dans le bois pourri d'orme. Dijon, au Parc. Février.

647. D. LARDARIUS. *Linn.* Commun. Dans les maisons, sur les peaux, le lard suspendu, etc. Printemps, quelquefois en septembre. Dijon, dans les armoires de la galerie zoologique de la Faculté des sciences. Chambolle, etc. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

648. D. BICOLOR. *F.* (Beaune; une seule fois. — M. *Arias.*)

ATTAGENUS. *Latr.*

649. A. MEGATOMA. *F.* Très-rare. Environs de Dijon, un seul exemplaire. (Beaune; très-commun dans les maisons. — M. *Arias.*)

650. A. PELLIO. *Linn.* Très-commun. Dans les maisons. Fin mars, avril, commencement de mai; plus ou moins précoce selon les années. Dijon, etc. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

MEGATOMA. *Herbst.* — ATTAGENUS. *Latr.*

651. M. UNDATA. *Linn.* Pas commune. Sous les écorces, sur le bois mort, etc. Février à juin, octobre. Dijon, dans les maisons de la ville; au Parc, sous les écorces de charmes et d'ormes abattus, sur du bois mort empilé, et au vol près de ce bois; au-dessus de la fontaine de Larrey, sous des écorces de sycomore; (sur un frêne cassé sur la route de Gray, près de Montmuzard. — M. *Nodot*); sur la barrière au-dessus du débarcadère; trouvée dans une boîte d'insectes; obtenue d'éclosion, provenant de fragments de lierre rapportés du Parc; (obtenue également d'éclosion, provenant de morceaux de tilleul pourris. — M. *Dudrumet.*) Chambolle, sous une écorce de noyer. (Rouvray, sur les vieux charmes. M. *Emy.*)



HADROTOMA. *Erich.* — *ATTAGENUS.* *Latr.*

652. H. NIGRIPES. *F.* Assez commun. Dijon, au Parc, sur les fleurs de l'*Anthriscus sylvestris*, ombellifère très-commune dans les allées couvertes. Mai.

TRINODES. *Meg.*

653. T. HIRTUS. *F.* Rare. Dans les vieux tilleuls creux, où il est retenu quelquefois dans des toiles d'araignées. Juin, juillet. Dijon, Allée-de-la-Retraite et cours du Parc; intérieur du Parc, sur une feuille de sureau près d'une pile de bois mort.

ANTHRENU.S. *Geoffroy.*

654. A. SCROPHULARIÆ. *Linn.* Pas rare. Sur les fleurs. Mai, juin. Dijon, au Parc, sur les fleurs d'*Anthriscus sylvestris*; fontaine de Larrey, en fauchant. (Rouvray. — M. Emy.)

655. A. PIMPINELLE. *F.* Commun. Comme le précédent. Mai, juin. Dijon, au Parc, sur les fleurs d'*Anthriscus sylvestris*; dans la ville, dans les jardins, sur différentes fleurs. (Fixin. — M. Tarnier.) (Rouvray. — M. Emy.)

656. A. VARIUS. *F.* — TRICOLOR. *Herbst.* Var. VERBASCI. *Gyll.* Très-commun. Sur les fleurs; dans les maisons. Fin avril, mai, juin, commencement de juillet. Dijon, dans les jardins dans la ville, dans les maisons, les collections d'objets d'histoire naturelle, où il fait souvent de grands ravages. (Fixin, Gevrey, sur les ombellifères. — M. Tarnier.) (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

657. A. MUSEORUM. *Linn.* Pas rare. Dans les maisons et sur les fleurs. Printemps. Dijon, dans les maisons dans la ville; sur les fleurs, dans les jardins et dans les bois. (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

TROGODERMA. *Latr.*

658. T. VERSICOLOR. *Creutz.* M. Tarnier a obtenu cette espèce de l'éclosion de larves contenues dans des coléop-





tères renfermés dans une boîte qui lui a été envoyée en 1855 de Cordoue (Espagne); ces *Trogoderma* sont éclos en juillet et août 1854 et 1855.

Je fais figurer ici cet insecte, non que je le considère comme spontané dans le département, mais parce que je crois qu'il pourrait très-bien s'y naturaliser.

659. T. ELONGATULA. *F.* Rare. Dans les tilleuls creux et quelquefois au vol près de ces arbres. Juin, juillet. Dijon, Allée-de-la-Retraite, rempart de Tivoli.

TIRESIAS. *Stephens.* — MEGATOMA. *Latr.*

660. T. SERRA. *F.* Rare. Sur les arbres creux, sur le bois mort et coupé, etc. Mai. Dijon, au Parc, sur du bois mort empilé; Allée-de-la-Retraite, dans les tilleuls creux; (dans les plaies des tilleuls. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

---

## GEORYSSI.

---

GEORYSSUS. *Latr.*

661. G. PYGMEUS. *F.* (Rouvray; pas rare; dans les sables au bord des rivières. Juin et juillet. — M. *Emy.*)

---

## BYRRHI.

---

ASPIDIOPHORUS. *Latr.*

662. A. ORBICULATUS. *Gyll.* Rare. Sous les écorces des arbres morts où croissent de petits cryptogames, et en fauchant dans les bois ombragés. Juin, juillet. Dijon, au Parc, sous des écorces de charmes abattus et où se développent

des moisissures ou autres végétaux cryptogames. Plombières, combes de Neuvon à Darois et de Neuvon à Prenois, en fauchant. Fixin, bois près du chemin de fer, sous des ételles humides et présentant des moisissures, dans une coupe en exploitation. (Rouvray. — M. Emy.)

LIMNICHUS. Latr.

663. L. PYGMEUS. Sturm. Très-rare. Environs de Dijon.

SYNCALYPTA. Dillwin. — BYRRHUS. F.

664. S. SPINOSA. Rossi. — ARENARIA. Duft. Pas très-rare. Au vol par les soirées chaudes du printemps, dans le voisinage de l'eau ou en fauchant dans les bois humides. Mai, juin. Dijon, bords du Canal du côté de Larrey. Chambolle.

NOSODENDRON. Latr.

665. N. FASCICULARE. F. Pas rare, à Dijon, au Parc dans les plaies humides des ormes. Mai, juin.

BYRRHUS. Linn.

666. B. PILULA. Linn. Commun. Sous les pierres et la mousse, sur l'herbe, surtout dans les bois. Fin avril, mai, commencement de juin, plus rarement en juillet. Dijon, au bord de Suzon du côté d'Ahuy et quelquefois dans la ville. Flavignerot. Plombières, combe de Neuvon. (Fixin, Gevrey. — M. Tarnier.) Chambolle, sous la mousse et sur les chênes. (Beaune; pas commun; été. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

667. B. FASCIATUS. F. (Rouvray; 1843. — M. Emy.)

668. B. DORSALIS. F. Rare. Fixin, bois près du chemin de fer, sur la barrière au bord de ce chemin. 21 mai.

669. B. MURINUS. F. Rare. Environs de Dijon. (Beaune. — M. André.)





CYTILLUS. *Erich.* — BYRRHUS. *F.*

670. C. VARIUS. *F.* Pas commun. Dans les bois, par terre et en fauchant; rarement dans les champs. Fin avril, mai, juin. Dijon, dans les rues de la ville, à l'Arquebuse, au bord de Suzon près de la route d'Auxonne. Flavignerot. Marsannay-la-Côte, en fauchant et sur la boue d'une ornière. Fixin, bois près du chemin de fer. (Fixin, bois de la montagne. Gevrey. — M. Tarnier.) Blaisy-Bas, dans le bois, en fauchant. Villenote, près Semur, bois de Champeaux. (Rouvray. — M. Emy.)

MORYCHUS. *Erich.* — BYRRHUS. *F.*

671. M. ÆNEUS. *F.* (Environs de Dijon, sur des plantes aquatiques; 23 mars. — M. Nodot.)

---

**THROSCI.**

---

THROSCUS. *Latr.*

672. T. DERMESTOIDES. *Linn.* — ADSTRICTOR. *F.* Commun. Dans les bois, en fauchant dans les parties ombragées et un peu humides, sous les écorces, en battant les fagots, etc. Avril, mai, juin. Dijon, au Parc, sous les écorces de charme, en fauchant et sur du bois mort coupé; fontaine de Larrey, le soir en fauchant. Flavignerot, en battant des fagots. Fixin et Gevrey, bois de la plaine, en fauchant. St-Nicolas-lez-Cîteaux, en fauchant dans la forêt de Cîteaux. (Rouvray; très-rare. — M. Emy.)

673. T. PUSILLUS. *Hér.* Pas commun. Dans les bois en battant les fagots, et sur le bois mort. Mai, juillet. Dijon,



barrière au-dessus du débarcadère du chemin de fer. Flavi-gnerot, en battant de vieux fagots. Gevrey, près du petit étang de Satenay, sous les détritns au pied des vieilles souches d'aulne.

## HISTRI

PLATYSOMA. *Leach.*

674. P. FRONTALE. *Payk.* (Rouvray; rare; dans le bois mort. — M. *Emy.*)

675. P. OBLONGUM. *F.* Très-rare. Dans les bois, sous les écorces des souches de chêne. Environs de Chambolle.

676. P. DEPRESSUM. *F.* Commun. Dans les bois, sous les écorces humides des arbres abattus ou des souches, principalement celles des chênes; sur le bois récemment coupé. Mai, juin, juillet, septembre. Dijon, au Parc, sur du bois coupé. Marsannay-la-Côte. Chambolle. Curley, bois des Liards, entre des plateaux de hêtre un peu humides. (Rouvray; rare. — M. *Emy.*)

677. P. ANGUSTATUM. *Ent. Hefte.* (Environs de Dijon. — M. *Tarnier.*)

HISTER. *Linn.*

678. H. QUADRIMACULATUS. *Linn.* — LUNATUS. *F.* Assez commun. Dans les excréments, surtout ceux des vaches et des chevaux; quelquefois sous les pierres à la fin de l'hiver. Printemps et automne. Dijon, autour de la ville, dans les lieux où l'on fait paître les vaches et autres animaux. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

679. H. QUADRINOTATUS. *Scriba.* — QUADRIMACULATUS. *F.* Commun. Comme le précédent. Fin de l'hiver, printemps et automne. Dijon, Talant, près de la Fontaine-aux-Fées,





dans les excréments de mouton. Fixin, etc. (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray; pas commun. — M. Emy.)

680. H. HELLUO. *Truqui*. Pas très-rare. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sous les détritns au pied des souches d'aulnes. Avril, mai, juin.

681. H. UNICOLOR. *Linn*. Pas très-commun. Comme le *Quadrinaculatus*. Printemps, automne. Environs de Dijon. (Beaune. — M. Arias.)

682. H. FIMETARIUS. *Herbst*. Très-rare. Environs de Dijon.

683. H. MERDARIUS. *Ent. Hefte*. Pas commun. Dans les excréments; quelquefois au vol. Printemps. Dijon, autour de la ville, etc.

684. H. CADAVERINUS. *Ent. Hefte*. Commun. Dans les cadavres et les excréments. Printemps. Dijon, autour de la ville. (Beaune; printemps, automne. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

685. H. VENTRALIS. *De Marscul*. Rare. Environs de Dijon.

686. H. CARBONARIUS. *Ent. Hefte*. Rare. Dans les excréments. Printemps. Environs de Dijon.

687. H. NIGELLATUS. *Germ*. (Rouvray, un seul exemplaire. — M. Emy.)

688. H. PURPURASCENS. *Payk*. Assez commun. Dans les excréments de vache et de cheval; quelquefois sous les pierres. Printemps. Dijon, autour de la ville. Talant, etc. (Beaune; rare. — M. Arias.)

689. H. STERCORARIUS. *Ent. Hefte*. Assez commun. Dans les excréments. Printemps, automne. Environs de Dijon. (Beaune. — M. Arias.)

690. H. SINUATUS. *Payk*. Rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. Emy.)

691. H. BISSEXTRIATUS. *Payk*. (Beaune; pas commun. — M. Arias.)

692. H. CORVINUS. *Germ*. Assez commun. Dans les excré-

ments et le fumier. Printemps. Dijon, autour de la ville ; trouvé plusieurs fois sous des pierres posées sur du fumier. (Beaune ; un seul exemplaire. — M. *Arias*.)

695. H. BIMACULATUS. *Linn*. Pas rare. Dans les excréments. Printemps. Dijon, autour de la ville. (Fixin. — M. *Tarnier*.) Saint-Nicolas-les-Cîteaux, sous une écorce humide dans le bois ; septembre. (Beaune ; rare. — M. *Arias*.) (Rouvray ; pas commun. — M. *Emy*.)

694. H. DUODECIMSTRIATUS. *Payk*. Assez commun. Dans les fumiers et sous les pierres. Printemps. Dijon, autour de la ville, chemin de Daix, etc. (Rouvray. — M. *Emy*.)

HÆTERIUS. *Godet*.

695. H. QUADRATUS. *Ent. Hefte*. Très-rare. Quelques exemplaires de cet insecte ont été trouvés à l'Etang-Vergy, par M. *J. Saintpère*, sous des pierres, avec une petite espèce de fourmi noire.

DENDROPHILUS. *Leach*.

696. D. PUNCTATUS. *Payk*. Rare. Sous les écorces d'arbres morts et sur le bois coupé dans les bois. Mai, juin. Dijon, au Parc, sur du bois mort empilé. (Rouvray. — M. *Emy*.)

697. D. PYGMÆUS. *Linn*. Plombières-les-Dijon, combe de Neuvon, dans les fourmilières de *Formica rufa* ; octobre. Rare. (Rouvray. — M. *Emy*.)

PAROMALUS. *Erich*. — PLATYSOMA. *Leach*.

698. P. FLAVICORNIS. *Payk*. Pas rare. Sous les écorces des souches de chêne, dans les bois. Septembre. Chambolle. Concéur, bois de Mantuan, etc. (Rouvray ; rare. — M. *Emy*.)





SAPRINUS. *Erich.* — DENDROPHILUS. *Leach.*

699. S. ROTUNDATUS. *Ill.* Rare. Sous les écorces des arbres morts et sur les arbres coupés, dans les bois. Mai. Dijon, au Parc.

HISTER. *Linn.*

700. S. NITIDULUS. *F.* Commun. Dans les cadavres et les excréments. Printemps, été. Dijon, autour de la ville, dans les champs et sur les chemins. (Beaune. — M. *Arias.*)

701. S. SUBNITIDUS. *De Marseul.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

702. S. FURVUS. *Erichs.* Rare. Environs de Dijon.

703. S. CHALCITES. *Ill.* — AFFINIS. *Payk.* Rare. Environs de Dijon.

704. S. SPECULIFER. *Latr.* Pas commun. Environs de Dijon. (Beaune ; dans les bouses, l'été. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

705. S. ÆNEUS. *F.* Pas commun. Environs de Dijon. (Rouvray ; commun. — M. *Emy.*)

706. S. CONJUNGENS. *Payk.* Rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*)

707. S. RUGIFRONS. *Ent. Hefte.* — METALLICUS. ? *F.* Très-rare. Environs de Dijon. Un seul exemplaire.

TERETRIUS. *Erich.* — PLATYSOMA. *Leach.*

708. T. PICIPES. *F.* Rare. Sous les écorces des arbres morts et sur le bois coupé. Mai, juin, octobre. Dijon, sur la barrière au-dessus du débarcadère du chemin de fer. Velars-sur-Ouche, sur la maçonnerie d'un petit viaduc du chemin de fer, entre Neuvo et Velars. Chambolle. (Rouvray ; en battant les haies sèches. — M. *Emy.*)



ONTHOPHILUS. *Leach.*

709. O. STRIATUS. *F.* (Fixin, le soir au vol dans la combe ; un seul exemplaire. — M. *Tarnier.*) (Beaune, en battant des fagots de chêne, dans le bois de la plaine ; octobre. — M. *Arias.* Trouvé aussi par M. *André.*) (Rouvray ; assez rare ; dans les bouses. — M. *Emy.*)

PLEGADERUS. *Erich.* — ABRÆUS. *Leach.*

710. P. COESUS. *F.* Très-rare. Dans le bois de saule pourri. Fin mars, milieu d'avril. Dijon, à l'Île, sur le bord de l'Ouche ; fontaine de Larrey ; un seul exemplaire dans chacune de ces localités. (Rouvray ; très-rare ; dans le bois pourri au pied des chênes. — M. *Emy.*)

ABRÆUS. *Leach.*

711. A. GLOBULUS. *Creutz.* Rare. Dijon, cours du Parc, dans des champignons dans l'intérieur d'un tilleul creux.

712. A. GLOBOSUS. *Ent. Hefte.* Rare. Dans les matières végétales en décomposition. Dijon, au Parc, sous des détritus au pied d'une souche de charme ; 1<sup>er</sup> avril. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans du bois de chêne pourri et humide ; 25 septembre. (Rouvray, dans les bolets et sous les écorces de hêtre ; rare. — M. *Emy.*)

713. A. GRANULUM. *Erich.* Rare. Dijon, cours du Parc, dans un champignon en décomposition dans l'intérieur d'un tronc de tilleul.

714. A. MINUTUS. *F. De Marseul.* Assez rare. Environs de Dijon.

715. A. NIGRICORNIS. *Ent. Hefte.* Commun. Sous les pierres qui recouvrent du fumier. Avril, mai. Dijon, chemins entre celui d'Ahuy et celui de Fontaine ; chemin de la fontaine Sainte-Anne, etc.





**SCARABÆI.**

—  
**PLATYCERUS.** *Geoffr.*

716. *P. CARABOIDES.* *F.* Pas rare. Sur les branches de chêne dans les bois, quelquefois au vol ou sur les fagots; la femelle se tient ordinairement dans l'intérieur des bourgeons de chêne. Paraît dès la fin d'avril les années précoces, mais toujours lorsque la feuille de chêne commence à se développer; on le trouve pendant tout le mois de mai. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte, dans la grande combe et sur le plateau près du parc de Gouvillle. Messigny, fontaine de Jouvence. Fixin, dans la combe et dans le bois près du chemin de fer. Gevrey, Chambolle, etc. (Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide; rare. — *M. Arias.*) (Rouvray; assez commun. — *M. Emy.*)

Variété *RUFIPES.* *Muls.* Rare. Comme le type de l'espèce et aux mêmes époques. Plombières, combe de Neuvon. Combe de Marsannay. (Rouvray. — *M. Emy.*)

**LUCANUS.** *Scop.*

717. *L. CERVUS.* *F.* Pas rare. Dans les bois, la journée sur les arbres, et le soir, après le coucher du soleil, au vol. Du 11 juin aux premiers jours de juillet; j'ai cependant trouvé des femelles en août et au commencement de septembre sur des souches de chêne où elles déposaient sans doute leurs œufs; cet insecte a aussi été trouvé dans la terre, bien développé, le 9 mai. Dijon, au Parc; quelquefois à la fontaine de Larrey, sur les saules, où j'ai observé une fois plusieurs mâles se battant avec leurs mandibules près d'une partie du tronc qui laissait suinter un liquide jaunâtre. Marsannay-la-Côte. Fixin. Gevrey. Chambolle, etc. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. *M. Emy.*)

Les exemplaires de très-grande et de très-petite dimension sont rares. J'en possède de 25 et de 52 millimètres de longueur, mesurés depuis la partie antérieure du labre jusqu'à l'extrémité suturale des élytres.

DORCUS. *Mac-Leay.*

718. D. PARALLELIPIEDUS. *Linn.* Commun. Sur les troncs d'arbres creux par les soirées chaudes de l'été, sur les vieilles souches. Du 15 mai au 20 juillet; trouvé cependant le 25 avril, sous une pierre dans un bois, et le 16 septembre. Dijon, cours du Parc, rempart de Tivoli et Allée-de-la-Retraite, sur les tilleuls; fontaine de Larrey, sur les saules, quelquefois au vol le soir; route de Langres, sur un frêne; bord du bassin du Canal, sur des troncs de chênes, le matin. Plombières, combe de Neuvon, sur une vieille souche de chêne. Flavignerot. Marsannay. Chambolle, etc. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

SINODENDRON. *F.*

719. S. CYLINDRICUM. *Linn.* (Environs de Rouvray, dans l'intérieur de très-vieux hêtres, 7 juillet. — M. *Nodot* et M. *Emy.*)

GEOTRUPES. *Latr.*

720. G. STERGORARIUS. *Linn.* Pas rare. Dans les excréments de cheval et dans les trous que l'insecte se creuse en terre sous ces excréments. Été. Dijon, chemin de la rente de Morvau, etc. (Beaune; sur la route de Dijon, par terre; octobre. — M. *Arias.* Trouvé aussi par M. *André.*)

721. G. PUTRIDARIUS. *Esch.* Assez commun. Dans les excréments et au vol le soir, sur les routes et les chemins. Printemps, été. Dijon, chemin d'Ahuy, chemin de la rente de Morvau, Vieux-Suzon, etc. (Rouvray. — M. *Emy.*)

722. G. MUTATOR. *Marsh.* Très-commun. Dans les excré-





ments de vache, de cheval et ceux de l'homme, et le soir au vol. Printemps, été. Dijon, sur les routes et les chemins autour de la ville; chemin d'Ahuy, chemin de Daix, etc. Plombières; octobre. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. André.)

723. G. HYPOCRITA. *Schn.* (Beaune; pas commun. — M. Arias.) (Rouvray; très-rare. — M. Emy.)

724. G. SYLVATICUS. *Panz.* Pas commun. Dans les bois, par terre et sous les champignons. Mai. Combe de Gevrey. Chambolle. (Rouvray; très-commun. — M. Emy.)

725. G. VERNALIS. *Linn.* Commun. Dans les excréments. Printemps. Dijon, chemins autour de la ville, chemin de Saint-Joseph à Gouvillle, etc. (Beaune. — M. Arias.)

CERATOPHYUS. *Fisch.* — GEOTRUPES. *Latr.*

726. C. TYPHÆUS. *Linn.* Pas rare. Le soir au vol, surtout après une pluie chaude. Fin avril, mai. Dijon, chemin de la Charmette, près de Saint-Martin; très-rarement dans d'autres localités; chemin de Fontaine, chemin d'Ahuy, lit de Suzon. (Rouvray; pas commun. — M. Emy.)

BOLBOCERAS. *Kirb.*

727. B. MOBILICORNIS. *F.* Ce remarquable insecte a été jusqu'ici considéré comme très-rare, et moi-même j'avais eu la même opinion; mais j'ai pu me convaincre, comme l'a fait M. Aubé, l'un des premiers entomologistes de Paris (1), que la rareté de cette espèce résultait seulement de la difficulté de sa recherche lorsqu'on ne connaît pas les circonstances indispensables pour la rencontrer avec certitude. J'ai indiqué ces circonstances dans une lettre que j'ai adressée à M. Aubé, et qui a été insérée dans les *Annales de la Société*

---

(1) *Note sur le Bolbocerus mobilicornis.* Annales de la Société entomologique de France, 2<sup>e</sup> série, tome 10, 1852, p. 639 et suiv.



*entomologique de France* (1). Je vais les rappeler en abrégé. Cet insecte vole le soir au crépuscule, très-près de terre, depuis les derniers jours de mai jusqu'au milieu de juillet, lorsqu'il fait une grande chaleur; et c'est toujours de huit heures et demie à neuf heures du soir que je l'ai rencontré, excepté quelquefois par un temps très-couvert et orageux, où j'ai pris le *Bolboceras* dès les sept heures un quart; il se trouve en outre dans les lieux humides ou dans leur voisinage. Il faut, après avoir réuni les conditions de lieu, de saison et d'heure, y ajouter celle d'un ciel sans nuage ou à peu près, et se placer alors de manière à ce que l'insecte en volant se détache sur le ciel; autrement l'obscurité ne permettrait pas de l'apercevoir; il faut pour cela se baisser presque jusqu'à terre. J'ai pris ainsi près de Dijon, sur le petit chemin de Ruffey, près du ruisseau qui sort du clos de Pouilly, une certaine quantité de *B. Mobilicornis*, ordinairement cinq ou six pendant la demi-heure que dure cette chasse, quelquefois un plus grand nombre, quelquefois aussi deux ou trois seulement. J'ai également trouvé cette espèce près de Dijon, à la fontaine de Larrey, sur le chemin d'Ahuy près de Suzon, sur le chemin de Fontaine, rarement dans la première de ces localités, et un seul exemplaire dans chacune des deux autres; deux exemplaires ont été trouvés le 4 juin (var. jaune) par M. J. Luce, au commencement du chemin de Daix; elle a été prise également une fois au Parc, et une autre fois par M. Tarnier, à Fixin; toujours le soir au vol.

### GYMNOPLEURUS. III.

728. G. MOPSUS. *Pallas*. — *PILLULARIUS*. *F.* Commun. Dans les excréments de l'homme, principalement sur les montagnes ou dans leur voisinage. Printemps. Dijon,

---

(1) 3<sup>e</sup> série, t. 1, 1853, Bulletin, p. xxv et xxvi.





Combe-aux-Serpents. Marsannay-la-Côte, sur le chemin de la combe de Gouville. Chambolle. (Beaune. — M. *Arias*.)

SISYPHUS. *Latr.*

729. S. SCHLEFFERI. *Linn.* Commun. Comme le *Gymno-pleurus mopsus*; aussi au printemps. Marsannay-la-Côte, chemin de la combe de Gouville. (Fixin. — M. *Tarnier*.) Chambolle. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray; fort rare. — M. *Emy*.)

COPRIS. *F.*

750. C. LUNARIS. *Linn.* — Femelle. EMARGINATA. *F.* Assez commun. Dans les excréments de cheval et de vache. Printemps. Dijon, derrière le Parc du côté de Longvic; chemin de la rente de Morvau. (Fixin. — M. *Tarnier*.) Chambolle. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

ONTHOPHAGUS. *Latr.*

731. O. LEMUR. *F.* Assez commun. Dans les excréments de l'homme, principalement sur les montagnes. Printemps. (Fixin. — M. *Tarnier*.) Chambolle. (Beaune; pas commun. — M. *Arias*.) (Rouvray; pas commun. — M. *Emy*.)

732. O. MAKI. *Ill.* (Beaune; rare. — M. *Arias*.)

733. O. NUCHICORNIS. *Linn.* (Beaune; pas rare. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

734. O. FRACTICORNIS. *Preysl.* Assez commun. Dans les excréments de vache, etc. Printemps, automne. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées, dans des excréments de mouton. Fixin, Chambolle, sur les pâturages des montagnes. (Beaune; pas commun. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

755. O. NUTANS. *F.* Pas rare. Dans les excréments. Environs de Dijon. (Beaune. — MM. *Arias* et *André*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

756. O. CŒNORITA. *Herbst.* Pas rare. Dans les excréments

de l'homme. Printemps. Dijon, chemin près de la Combe-aux-Serpents, etc. (Beaune; rare. — MM. *Arias* et *André*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

737. *O. VACCA*. *Linn.* — *MEDIUS*. *F.* — *AFFINIS*. *Sturm.* Commun. Dans les excréments de vache. Printemps. Dijon. Fixin, etc. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

738. *O. TAURUS*. *Linn.* — *CAPRA*. *F.* Pas commun. Dans les excréments de vache. Dijon, environs de Mirande. (Beaune; très-commun. — MM. *Arias* et *Bourlier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

739. *O. SCHREBERI*. *Linn.* Très-commun. Dans les excréments de vache. Printemps. Dijon, environs de Mirande. Chambolle. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

740. *O. OVATUS*. *Linn.* Très-commun. Dans les excréments de vache. Printemps, été. Dijon. Environs de Mirande, etc. (Fixin. — M. *Tarnier*.) Chambolle. (Beaune. — MM. *Arias* et *André*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

ONITICELLUS. *Lepellet*.

741. *O. FLAVIPES*. *F.* Commun. Dans les excréments de vache. Printemps. Dijon, chemin de la rente de Morvau, environs de Mirande, etc. Chambolle. (Beaune; rare. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

COLOBOPTERUS. *Muls.* — *APHODIUS*. *F.*

742. *C. ERRATICUS*. *F.* Très-commun. Dans les excréments de vache. Printemps, été. Dijon, chemin de Morvau, environs de Mirande, chemin de Daix, etc. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

EUPLEURUS. *Muls.* — *APHODIUS*. *F.*

743. *E. SUBTERRANEUS*. *Linn.* Pas rare. Dans les excréments de vache. Printemps, été. Dijon, environs de Mirande. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)





OTOPHORUS. *Muls.* — APHODIUS. *F.*

744. O. HEMORRHOIDALIS. *Linn.* Pas rare. Dans les excréments. Printemps. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*)

TEUCHESTES. *Muls.* — APHODIUS. *F.*

745. T. FOSSOR. *Linn.* Commun. Dans les excréments de vache. Mai à août. Dijon, chemin de la rente de Morvau; derrière le Parc du côté de Longvic. Fixin. Chambolle. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

Variété SYLVATICUS. *Ahrens.* Assez rare. Fixin. Chambolle. (Beaune. Rouvray.)

APHODIUS. *III.*

746. A. SCYBALARIUS. *F.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

747. A. FOETENS. *F.* Rare. Environs de Dijon. (Juillet; dans les bouses. — M. *Nodot.*)

748. A. FIMETARIUS. *Linn.* Excessivement commun. Dans les excréments de vache, de cheval, et ceux de l'homme; au vol au premier printemps, et même à la fin de l'hiver, par les temps sereins, auprès des excréments. Depuis le milieu de février jusqu'en automne. Dijon, fossés du cours du Parc, environs de Mirande, chemin de la rente de Morvau, chemin de Daix, etc. Fixin. Chambolle, etc. (Pontailier. — M. *Dudrumel.*) (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

749. A. ALPINUS. *Scopoli.* — RUBENS. *Dej.* (Beaune; rare. — M. *Arias.*)

750. A. CONSTANS. *Meg.* — VERNUS. *Muls.* Pas commun. Environs de Dijon.

751. A. GRANARIUS. *Linn.* — CARBONARIUS. *Sturm.* Commun. Dans les excréments et au vol. Environs de Dijon. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)



752. A. BIMACULATUS. *F.* Pas commun. Environs de Dijon. (Beaune. — MM. *Arias* et *André*.)

753. A. PLAGIATUS. *Linn.* — NIGER. *Gyll.* (Rouvray. — M. *Emy*.)

754. A. QUADRIMACULATUS. *Linn.* — QUADRIPUSTULATUS. *F.* Pas commun. Environs de Dijon.

755. A. TRISTIS. *Panz.* (Beaune; rare. — M. *Arias*.)

756. A. PUSILLUS. *Herbst.* Commun. Dans les excréments et au vol. Environs de Dijon. Plombières, combe de Neuvon, en fauchant, 26 juin. (Beaune; rare. — MM. *Arias* et *André*.)

757. A. SORDIDUS. *F.* Commun. Dans les excréments de vache. Printemps, été. Dijon, environs de Mirande, etc. (Beaune. — M. *Bourlier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

Variété RUFESCENS. *F.* Assez commun. Comme le précédent. Dijon, environs de Mirande. (Rouvray. — M. *Emy*.)

758. A. LUGENS. *Creutz.* Pas rare. Dans les excréments de vache et au vol le soir. Juillet, août. Dijon, environs de Mirande; fontaine de Larrey, etc. (Beaune; rare. — M. *Arias*.)

759. A. IMMUNDUS. *Creutz.* Commun. Dans les excréments de vache. Été. Dijon, environs de Mirande. (Beaune. — M. *Bourlier*.)

760. A. NITIDULUS. *F.* Pas rare. Dans les excréments. Environs de Dijon. (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

761. A. MERDARIUS. *F.* Commun. Dans les excréments. Printemps. Dijon, Combe-aux-Serpents, etc. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

762. A. LIVIDUS. *Oliv.* — ANACHORETA. *F.* Rare. Dans les excréments et au vol. Environs de Dijon. (Beaune. — M. *Arias*.)

763. A. MELANOSTICTUS. *Schüpp.* — CONSPURCATUS. *F.* Pas rare. Dans les excréments et au vol. Été. Dijon, environs de Mirande, chemin de Saint-Martin à Fontaine, etc. (Rouvray. — M. *Emy*.)





764. A. INQUINATUS. *Herbst*. Rare. Environs de Dijon. (Beaune. — MM. *Arias* et *André*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

765. A. CONSPUTUS. *Creutz*. Pas commun. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy*.)

766. A. QUADRIGUTTATUS. *Herbst*. — QUADRIMACULATUS. *F*. Rare. Dans les excréments. Mai. Dijon, environs de Mirande. (Fixin. — M. *Tarnier*.)

ACROSSUS. *Muls*. — APHODIUS. *F*.

767. A. RUFIPES. *Linn*. Pas rare. Dans les excréments de vache et le soir au vol. Été, automne. Dijon, environs de Mirande, fontaine de Larrey, petit chemin de Ruffey, etc. Talant. (Fixin. — M. *Tarnier*.) (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

768. A. LURIDUS. *F*. Commun. Dans les excréments de vache et de mouton. Printemps. Dijon, Combe-aux-Serpents. Flavignerot. (Fixin. — M. *Tarnier*.) (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

Variété VARIEGATUS. *Herbst*. Flavignerot. Rare.

Variété GAGATINUS. *Fourcr*. — NIGRIPES. *F*. Comme le type de l'espèce et dans les mêmes lieux ; encore plus commun. (Beaune. — M. *André*.)

769. A. DEPRESSUS. *Kugel*. (Beaune ; rare. — M. *Arias*.)

770. A. PECARI. *F*. Pas rare. Dans les excréments. Printemps. Dijon, environs de Mirande. (Fixin, près de la ferme de la Fortelle. — M. *Tarnier*.) (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

MELINOPTERUS. *Muls*. — APHODIUS. *F*.

771. M. OBLITERATUS. *Heyden*. Très-commun. Dans les excréments de l'homme, et au vol près de ces excréments, par les temps chauds et sereins. Octobre. Dijon, au bord des chemins. Fixin. (Beaune ; dans les excréments de cheval, sur les routes, en automne. — M. *Arias*.)

772. M. PRODRONUS. *Brahm.* Commun. Au vol, près des excréments de l'homme. Printemps, automne. Dijon, fossés du cours du Parc, etc. (Beaune; comme le précédent. — M. *Arias.*) Villenote, près du bois de Champeaux. (Rouvray; dans les bouses un peu desséchées, sur l'Erigny, 16 avril. — M. *Emy.*)

HEPTAULACUS. *Muls.* — *APHODIUS. F.*

773. H. SUS. *Herbst.* — PUBESCENS. *Sturm.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

AMMOECIUS. *Muls.* — *APHODIUS. F.*

774. A. ELEVATUS. *F.* (Beaune; pas commun. — M. *Arias.*)

775. A. BREVIS. *Erich.* (Fixin. Rare. — M. *Tarnier.*)

PLAGIOGONUS. *Muls.* — *APHODIUS. F.*

776. P. ARENARIUS. *Oliv.* Rare. Environs de Dijon.

OXYOMUS. *Esch.*

777. O. PORCATUS. *F.* Très-commun. Au vol, par les soirées chaudes. Printemps, été. Dijon, sur les chemins, cours du Parc, fontaine de Larrey, etc. (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

PLEUROPHORUS. *Muls.* — *OXYOMUS. Esch.*

778. P. COESUS. *Panz.* Pas rare. Au vol le soir par les temps très-chauds et orageux. Printemps, été. Dijon, sur les chemins entre celui de Fontaine et celui d'Ahuy, etc. (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

RHYSEMUS. *Muls.* — *OXYOMUS. Esch.*

779. R. GERMANUS. *Linn.* — ASPER. *F.* Très-rare. Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cette espèce, au vol par une soirée très-chaude, à Dijon, au bord du jet-d'eau de la porte Saint-Pierre, le 28 mai.





TROX. F.

780. T. PERLATUS. *Scriba*. Pas rare. Sous les cadavres desséchés. Printemps, été. Dijon, chemin de Talant, chemin de Fontaine près de la promenade de Montchapet, etc. Plombières, combe de Neuvon, sur des excréments de renard, 28 mai. (Beaune; été, automne; rare. — M. *Arias*.) (Rouvray; pas commun. — M. *Emy*.)

781. T. HISPIDUS. *Laichart*. (Rouvray; assez rare. — M. *Emy*.)

782. T. SABULOSUS. *Linn*. Pas commun. Le soir au vol par les temps chauds et quelquefois aussi sous les cadavres desséchés. Printemps, été. Dijon, chemin de Talant, chemin de Saint-Martin à Fontaine, etc. Chambolle.

783. T. SCABER. *Linn*. — ARENARIUS. F. Pas rare. Le soir au vol par les temps chauds. Du 25 mai au 13 juillet. Dijon, fontaine de Larrey; petit chemin de Ruffey; bord de Suzon, sur un peuplier; Allée-de-la-Retraite, sur un tilleul. (Fixin. — M. *Tarnier*.) (Rouvray; pas commun. — M. *Emy*.)

ORYCTES. III.

784. O. NASICORNIS. *Linn*. (Châtillon-sur-Seine, dans le tan. — M. *Nodot*.)

POLYPHYLLA. *Harris*. — MELOLONTHA. F.

785. P. FULLO. F. (Saulieu. — M. *Lombard*.)

MELOLONTHA. F.

786. M. ALBIDA. *Dej*. Un exemplaire de cet insecte a été trouvé à Dijon sur la route de Plombières, au bord de l'Ouche, sur un jeune peuplier, près du moulin Vesson, par M. L. *Humbert*.

787. M. VULGARIS. *Linn*. Cet insecte n'est que trop commun, surtout certaines années; il paraît avec les premières



feuilles, à la fin d'avril, quelquefois dès le 15 quand l'année est précoce, et ne disparaît qu'au commencement de juillet; mais c'est pendant le mois de mai qu'il est le plus commun. Partout, sur les arbres des jardins et des promenades, ainsi que sur ceux des bois; sur les haies; le soir au vol. Trouvé une fois dans la terre dès le mois de février.

RHIZOTROGUS. *Latr.*

788. R. *ÆSTIVUS. Oliv.* Très-commun. Le soir au vol au bord des chemins; dans les champs; autour des haies. Du 16 avril au 4 mai. Dijon, autour de la ville. Trouvé une fois sous une pierre le 14 avril, derrière le mur du Parc du côté de Longvic. (Fixin. — M. *Tarnier.*) (Beaune; juin, juillet. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

789. R. *CICATRICOSUS. Muls.* — *MERIDIONALIS. Dej.* (Beaune; rare; juin, juillet. — M. *Arias.*)

AMPHINALLUS. *Latr.* — RHIZOTROGUS. *Latr.*

790. A. *ATER. Herbst.* Commun. Le mâle se trouve ordinairement le matin au vol au bord des chemins et dans les champs, où il se cramponne quelquefois aux tiges de blé ou de seigle. La femelle se trouve par terre sur les chemins, souvent sur la poussière. Du 17 juin au 25 juillet. Dijon, cours du Parc et intérieur de cette promenade, Vieux-Suzon, bord du Canal, chemin de Daix. Plombières, bord de la route. Velars-sur-Ouche, dans la combe de La Cude. Gervrey. (Nantoux, près Beaune. — M. *Péragallo.*) (Beaune; dans les fossés et sur les *Sedum* des terrains incultes; juin; très-commun. — M. *Arias.*)

791. A. *SOLSTITIALIS. Linn.* Commun. Le soir au vol, dans les prés, au bord des chemins et autour des peupliers. Juillet. (Juin. — M. *Nodot.*) Dijon, dans les prés entre le Canal et l'Ouche, surtout autour des jeunes peupliers; derrière le Parc; bord du Canal; chemin de Daix; Vieux-Suzon; chemin d'Ahuy, autour des peupliers qui bordent le lit de Suzon, etc.





792. A. OCHRACEUS. *Knoch.* — *FALLENII. Sch.* Pas commun. Environs de Dijon.

793. A. RUFICORNIS. *F.* — *PAGANUS. Oliv.* Pas commun. Au vol le matin, au bord des chemins. Juin. Dijon, Allée-de-la-Retraite. Plombières, bord de la route. (Nantoux, près Beaune. — *M. Péragallo.*) (Beaune; très-commun sur les routes et les fossés. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

ANOMALA. *Meg.*

794. A. FRISCHII. *F.* — *JULII. F.* Var. (Auxonne; 20 juillet environ; sur les fleurs de rosiers dans les jardins. — *M. Eug. Guillaume.*)

PHYLLOPERTA. *Kirby.* ANISOPLIA. *Meg.*

795. P. HORTICOLA. *Linn.* Assez commune. Sur les fleurs des rosiers sauvages. Juin. Dijon, chemin d'Ahuy, chemin de Daix, intérieur du Parc sur des feuilles. Asnière, sur les feuilles dans le bois. Flavignerot, sur des ombellifères dans la combe. (Beaune; sur les herbes au bord des ruisseaux; mai et juin. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

Variété USTULATIPENNIS. *Villa.* Moins commune que le type. Dijon, chemin d'Ahuy. (Rouvray. — *M. Emy.*)

ANISOPLIA. *Meg.*

796. A. FRUTICOLA. *F.* (Rouvray; assez rare. — *M. Emy.*)

797. A. AGRICOLA. *F.* (Rouvray; assez rare. — *M. Emy.*)

798. A. TEMPESTIVA. *Erichs.* — *AUSTRIACA. Muls.* Var. *DELETA. Muls.* J'ai trouvé deux exemplaires de cet insecte, le 4 juillet, sur des tiges de seigle, à Perrigny, près de la ferme de Sans-Fond.

SERICA. *Mac Leay.* — OMALOPLIA. *Meg.*

799. S. BRUNNEA. *Linn.* Rare. Juillet. Plombières, combe de Neuvo à Darois. Cet insecte doit avoir des habitudes

nocturnes; j'en ai trouvé quelques individus morts pris dans des toiles d'araignées tendues sur des plantes. (Fixin, au vol, le soir dans la combe, trouvée avec une lanterne à 10 heures. — M. Tarnier.) (Rouvray. — M. Emy.)

OMALOPHIA. Steph.

800. O. HOLOSERICEA. Scop. — VARIABILIS. F. Très-rare. Environs de Dijon.

BRACHYPHYLLA. Muls. — OMALOPHIA. Meg.

801. B. RURICOLA. F. Pas rare. Le matin au vol sur les pelouses, dans les champs, au bord des chemins, sur la lisière des bois. Commencement de juillet. Dijon, combe Saint-Joseph; fossés à l'ouest du cours du Parc, autour des tas d'herbe coupée, par un temps couvert, dans l'après-midi. Flavignerot. Chambolle. La variété noire est plus rare.

HOPLIA. III.

802. H. PHILANTHUS. Sulz. — ARGENTEA. Oliv. Commune. Autour des saules, dans les lieux un peu humides. Juin, juillet. Dijon, le long du cours de Suzon, près la route d'Auxonne; chemin d'Ahuy, sur les chardons. (Crimolois, au vol autour des saules. — M. Tarnier.) Gevrey, au-dessus du grand étang de Satenay. (Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide. Pommard, sur le chemin de Nantoux. — M. Pérégallo.) (Beaune; pas commune; dans les bois sur les plantes. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

803. H. FARINOSA. Linn. — SQUAMOSA. F. Commune. Sur les fleurs des rosiers sauvages et des ombellifères, surtout dans les bois des montagnes. 31 mai, juin. Marsannay-la-Côte, chemin de la combe et dans le bois. Plombières, bois de Bonveau et combe de Neuvo. Flavignerot. Fixin. Gevrey. Chambolle. (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray; très-rare. — M. Emy.)





VALGUS. *Scriba.*

804. V. HEMIPTERUS. *Linn.* Pas rare. Dans les arbres creux et sur le bois mort. Avril, mai, commencement de juin. Dijon, cours du Parc dans les tilleuls creux et sur l'herbe des fossés; intérieur du Parc dans un peuplier creux et sur du bois mort empilé; serre chaude du Jardin botanique, 12 mars. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

TRICHIUS. *F.*

805. T. FASCIATUS. *Linn.* Pas rare. Dans les bois, sur les fleurs de ronce et d'ombellifères. Juin, juillet, août. Plombières, combe de Neuvo à Darois. (Rouvray. — M. *Emy.*)

806. T. GALLICUS. *Dej.* Commun. Sur différentes fleurs, les roses, les ombellifères, etc. Mai, juin, juillet. Dijon, dans les jardins de la ville sur les roses; le long du Canal, sur les ombellifères; bord de l'Ouche, sur les fleurs d'yèble, *Sambucus ebulus*, etc. (Fixin. Gevrey. — M. *Tarnier.*) Chambolle, sur les fleurs d'héraclée, *Heracleum sphondylium*. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

OSMODERMA. *Lepellet.*

807. O. EREMITA. *Scop.* Pas commune. Sur les troncs d'arbres creux, principalement de tilleuls et de saules, et sur le bois mort. Cet insecte exhale une odeur assez forte, ressemblant à peu près à celle de la prune ou de l'abricot, et qui le fait facilement découvrir à l'entrée des cavités des arbres sur lesquels il se tient dans l'après-midi lorsqu'il fait chaud (1). Du 28 juin au 12 août. Dijon, intérieur et cours du Parc, rempart de Tivoli, fontaine de Larrey. Plombières.

---

(1) Cette odeur est assez prononcée pour qu'une personne qui la connaît puisse sentir un insecte de cette espèce à 20 mètres environ de distance en se plaçant sous le vent.



Concœur, sur un noyer près du château d'Entre-deux-Monts. (Beaune. — M. *Arias*.) (Villenote, près Semur. — M. *Lombard*.) (Dompierre-en-Morvant, au pied d'un prunier carié, près du hameau de Genouilly; trouvée une seule fois. — M. *Emy*.)

GNORIMUS. *Lepellet*.

808. G. NOBILIS. *Linn*. Pas rare. Sur les fleurs, surtout les ombellifères et les roses, sur les arbres et le bois mort. Du 26 mai au 10 juillet. Dijon, au Parc sur du bois mort empilé; dans l'intérieur de la ville, sur les roses dans les jardins; fontaine de Larrey, sur les saules. Fontaine-lez-Dijon, sur des roses dans un jardin. (Beaune; fleurs d'yèble, *Sambucus ebulus*. — M. *Arias*. Au jardin anglais. — M. *Péragallo*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

CETONIA. *F*.

809. C. STICTICA. *Linn*. Commune. Sur les fleurs, dans les jardins, les haies, au bord des chemins, etc. Avril à juillet. Dijon, dans les jardins sur différentes fleurs; au bord des chemins sur les fleurs de plantain; dans les haies sur les fleurs d'aubépine; fontaine de Larrey, etc. (Fixin. — M. *Tarnier*.) (Beaune; sur les fleurs, le blé, etc. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

810. C. HIRTELLA. *Linn*. — HIRTA. *F*. Commune. Sur différentes fleurs, pissenlit (*Leontodon taraxacum*), aubépine, plantain, etc., au bord des chemins. Avril à juin. Dijon, Parc, chemin de Chenôve, chemin de Daix, etc. Marsannay-la-Côte. (Fixin. — M. *Tarnier*.) Chambolle. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

811. C. AURATA. *Linn*. Très-commune. Sur différentes fleurs, roses des jardins et sauvages, ombellifères, fleurs d'yèble, etc. Avril, mai, juin; 27 mars sous une pierre. Dijon, dans les jardins dans la ville, au bord des chemins sur les haies,





sur les ombellifères dans les prés et dans les bois, sur le bois mort au Parc. Flavignerot. (Fixin. — M. Tarnier.) Chambolle. (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.) On trouve la larve et la nymphe de cette espèce dans le terreau au bas des tilleuls en août, et c'est à cette époque qu'elle subit sa dernière métamorphose dans sa coque pour ne sortir qu'au printemps suivant.

812. C. MORIO. *F.* (Rouvray; rare. — M. Emy.)

813. C. METALLICA. *Payk.* Variété OBSCURA. *Andersch.* Moins commune que l'*Aurata*. Aussi sur différentes fleurs. Printemps. Dijon, cours du Parc, etc. (Beaune; rare; sur les roses; l'été. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

Variété METALLICA. *F.* (Rouvray; rare. — M. Emy.)

814. C. MARMORATA. *F.* Rare. Sur le bois mort, dans les creux des arbres et au vol près des arbres morts ou creux. Mai, juin. (25 avril. — M. Nodot.) Dijon, intérieur et cours du Parc. Concœur, bois de Mantuan, près du Télégraphe. (On trouve, dans le terreau au pied des tilleuls, au cours du Parc, à la fin de juillet et en août, la nymphe de cette espèce, qui ne tarde pas à se métamorphoser dans sa coque, où elle reste jusqu'au printemps suivant. — M. Tarnier.)

---

## BUPRESTI.

---

PTOSIMA. *Solier.*

815. P. NOVENMACULATA. *F.* Rare. Sur les ronces et les rosiers. Du 30 mai au 1<sup>er</sup> juillet. (Dijon, trouvée une fois au Parc par M. Eug. Guillaume.) (Gevrey, près d'une fontaine dans les vignes au bord du bois du Chaignot. — M. Tarnier.) M. Piffond, conseiller à la Cour impériale de Dijon, m'a donné un certain nombre d'exemplaires de cet insecte pris par lui dans son jardin, à Chambolle. (Rouvray; extrêmement rare. — M. Emy.)

CAPNODIS. *Esch.*

816. C. TENEBRIONIS. *Linn.* Rare. Sur les prunelliers couverts de lichens. Du 30 mai au 29 juin ; en septembre et jusqu'au 16 octobre. (Dijon, combe Saint-Joseph. — M. *Drumel.*) Marsannay-la-Côte. Chambolle, dans la combe ; au bord du bois, contre les champs d'Entre-deux-Monts ; combe d'Orvau.

BUPRESTIS. *Linn.* — *LAMPRA. Meg.*

817. B. RUTILANS. *F.* Pas rare. Sur le tronc des tilleuls au soleil. Du 25 mai au 19 juillet. Dijon, cours et intérieur du Parc, Allée-de-la-Retraite, remparts autour de la ville, route de Langres. (Beaune. — MM. *Arias* et *Péragallo.*)

CHRYSOBOTHRIIS. *Esch.*

818. C. AFFINIS. *F.* Rare. Dans les bûchers et les chantiers de bois à brûler et dans les bois sur les arbres coupés. Fin juin, juillet. Dijon, dans les bûchers et les chantiers de la ville, surtout sur le bois de hêtre et de tremble ; au Parc sur un arbre coupé. Chambolle, dans la combe sur un noyer abattu. Curley, bois des Liards, sur un hêtre abattu, dans une coupe en exploitation.

AGRILUS. *Curtis.*

819. A. GUERINII. *Lacord.* (Châtillon-sur Seine ; un exemplaire de ce bel insecte a été trouvé par M. *Gontard*, en présence de M. *Emy*, dans le parc de M<sup>me</sup> de Rochechouard.)

820. A. BIGUTTATUS. *F.* Pas rare. Sur les jeunes pousses de chêne qui croissent sur les gros troncs coupés, sur les arbres abattus et le bois coupé dans les coupes en exploitation. Du 25 mai au 23 juin. Corcelles-les-Monts, bois près de la route de Paris. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Gevrey. Chambolle. Concéur. (Beaune. — M. *Arias.*) (Rou-





vray ; au vol à la cime des grands chênes et sous les écorces des souches des gros chênes coupés deux ans auparavant. M. Emy.)

821. A. SINUATUS. *Oliv.* Très-rare. Marsannay-la-Côte, près du parc de Gouville, dans une coupe de deux ans, sur une feuille de noisetier, 10 juin ; un seul exemplaire. Un second m'a été donné comme pris aux environs de Semur.

822. A. AUBEI. *Lap.* et *Gory.* Pas rare. Sur les pousses de chêne. 21 mai, 25 juin. Fixin, bois près du chemin de fer.

823. A. FALLAX. *Perroud.* Inédit (d'après M. Reiche). Pas rare. Juin. Fixin, bois de la plaine.

824. A. GRAMINIS. *Laferté.* Inédit (d'après M. Reiche). Pas rare. Sur les pousses de chêne. Mai. Fixin, bois de la plaine.

825. A. VIRIDIPENNIS. *Lap.* et *Gory.* Très-rare ; environs de Dijon. (Rouvray. — M. Emy.)

826. A. AURIPENNIS. *Solier.* (Rouvray ; rare ; sur le tremble dans le bois Darié ; juin. — M. Emy.) J'en possède un exemplaire qui m'a été donné comme provenant des environs de Semur.

827. A. CINCTUS. *Oliv.* (Rouvray ; pas rare. — M. Emy.)

828. A. DERASOFASCIATUS. *Lacord.* Rare. Flavignerot, en fauchant dans le bois ; 28 mai.

829. A. CYANEUS. *Oliv.* (Rouvray, peu commun. — M. Emy.)

830. A. LATICORNIS. *Ill.* Rare. Environs de Dijon, je crois dans les bois de la plaine au bas de Fixin et de Perrigny. (Beaune, pousses de chêne ; juin. — M. Arias.)

831. A. LINEARIS. *F.* — ROBERTI. *Chevr.* Pas rare. Sur les pousses de chêne dans les coupes d'un an, dans les bois de la plaine. Juin, commencement de juillet. Crimolois. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bois près de la voie romaine. (Beaune ; un seul exemplaire, bois de chêne. — M. Arias.)

832. A. NOCIVUS. *Ratz.* (Beaune ; rare ; juin. — M. Arias.)

833. A. TENUIS. *Ratz.* — VIRIDIS. *F.* Commun. Dans les



bois, sur les pousses de chêne et sur le bois coupé. Fin mai, juin. Dijon, au Parc et dans les chantiers de bois à brûler dans la ville et près du bassin du Canal. Marsannay-la-Côte. Chambolle, etc. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

854. *A. ANGUSTULUS. Ratz. Ill.* Pas rare. Fixin, bois de la plaine, en fauchant. Mai, juin. (Rouvray. — *M. Emy.*)

*CORRÆBUS. Lap. et Gory. — AGRILUS. Meg.*

855. *C. UNDATUS. F.* Très-rare. Juillet, août. Sur les pousses de chêne. Environs de Dijon. (Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide. — *M. Arias.*)

856. *C. AMETHYSTINUS. Oliv.* Pas rare. En fauchant dans les bois, sur les jeunes taillis. Du 18 mai au 2 juillet. Plombières, combe de Neuvo et coteaux. Corcelles-les-Monts, bois près de la route de Paris. Flavignerot. Blaisy-Bas. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey. Curley, bois de la Reine. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux.

857. *C. ELATUS. F.* Très-rare. Trouvé une seule fois dans la combe de Chambolle, sur une graminée, le 29 juin.

*ANTHAXIA. Esch.*

858. *A. MANGA. F.* Pas rare. Sur les fagots d'orme, les troncs d'orme, le bois coupé, etc. Du 5 mai au 1<sup>er</sup> juin. Dijon, au Parc sur des ormes coupés, sur une barrière et des fagots d'orme; cours du Parc sur les petits ormes sur pied entourés d'épines; (chemin du réservoir de la montée de Montmuzard, sur le tronc des jeunes ormes. — *M. Dudrumet.*) dans la ville, dans les bûchers et les chantiers de bois à brûler. Plombières, bois de Bonveau, sur des fagots; Marsannay-la-Côte, sur des feuilles de noisetier dans la combe. (Savigny-sous-Beaune, bois de Chenôve, sur des rejetons de chêne; juin. — *M. Arias.*) (Rouvray; rare. — *M. Emy.*)

859. *A. NITENS. F. — NITIDA. Rossi.* Commune. Sur les





roses sauvages, les ombellifères, les renoncules, l'*Achillea millefolium* et d'autres fleurs. Du 15 mai au 8 août. Dijon, chemin de Daix, bords du Canal, bords de l'Ouche, fontaine de Larrey, chemins entre celui de Fontaine et celui d'Ahuy. Flavignerot. Marsannay-la-Côte, petit chemin près de la combe et dans la combe. (Fixin. — M. Tarnier.) Gevrey, dans la combe. Chambolle. (Savigny-sous-Beaune, bois de Chenôve, sur les rejetons de chêne; pas commune. — M. Arias.) (Pommard. — M. Pérageallo.) (Rouvray; sur les roses églantines et sur les radiées. — M. Emy.)

840. A. CICHORII. *Oliv.* Commune. Sur les fleurs de carotte et de l'*Achillea millefolium*. Du 1<sup>er</sup> juillet au 15 août. Dijon, chemin de Daix; bord de Suzon, près la route d'Auxonne; bords du Canal. (Beaune. Nantoux, 17 juin. — M. Pérageallo.) (Savigny-sous-Beaune, bois de Chenôve, sur les rejetons de chêne; juin. — M. Arias.)

841. A. INCULTA. *Germ.* (Rouvray. — M. Emy.)

842. A. LETA. *F.* (Dijon; commune, mêmes lieux que la *Nitens*. — M. Nodot, d'après M. Emy.)

843. A. NITIDULA. *Linn.* Pas rare. Dans les bois, sur les jeunes pousses de chêne et de noisetier, les ombellifères, les roses sauvages, les ronces, et en fauchant. Du 9 mai au 3 août. Dijon, au Parc. Plombières, combes de Bonveau et de Neuvon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Gevrey, dans la combe. Chambolle. (Rouvray; mêmes lieux que la *Nitens*. — M. Emy.)

844. A. FUNERULA. *Ill.* (Rouvray. — M. Emy.)

#### TRACHYS. *F.*

845. T. PYGMAEA. *F.* Très-rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. Emy.)

846. T. PUMILA. *Ill.* — MINUTA. *F.* Commune. Dans les bois sur les feuilles, principalement celles de noisetier et de tilleul. Du 8 mai au 3 juillet et le 3 septembre. Dijon, au Parc.

Corcelles-les-Monts, Combe-aux-Serpents. Flavignerot, dans la combe. Plombières, combe de Neuvon. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, sur le saule Marceau. (Beaune; pas commune. — M. *Arias*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

847. T. NANA. *F*. Trouvé un seul exemplaire sur une pierre au soleil, le 27 mai, sur un chemin près de la combe de Marsannay-la-Côte.

848. T. ÆNEA. *Mann*. Rare. Environs de Dijon, dans les bois.

APHANISTICHUS. *Latr*.

849. A. EMARGINATUS. *F*. Pas commun. Dans les bois de la plaine, sur le saule Marceau; rarement dans les bois de montagne. Du 16 au 29 juin. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Gevrey, près du grand étang de Satenay. Chambolle, jardin de M. *Piffond*, sur une tige de graminée. Saint-Nicolas-les-Cîteaux; forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy*.)

850. A. PUSILLUS. *Oliv*. Très-rare. Plombières-les-Dijon, combe de Neuvon à Darois, en fauchant, le 26 juin. Curtil-Vergy, bois de Mantuan, sur une pierre au soleil, le 17 septembre. Un seul exemplaire dans chacune de ces localités.

---

**ELATERES.**

---

MELASIS. *Oliv*.

851. M. BUPRESTOIDES. *Linn*. — FLABELLICORNIS. *F*. Très-rare. Sur le vieux bois. 25 mai, 16 juin. Dijon, au Parc, sur du bois mort empilé. Chambolle, sur du vieux bois de char-





pente dans le village; (dans la combe. — M. Tarnier.)  
(Rouvray. — M. Emy.)

CEROPHYTUM. Latr.

852. C. ELATEROIDES. Latr. Rare. Sous les écorces des arbres morts et dans les troncs creux des arbres. Du 31 mars au 30 mai. Dijon, au Parc, sous les écorces d'érables morts sur pied, sous les écorces de platanes vivants, sur un tronc de peuplier creux, sur du bois mort empilé; Allée-de-la-Retraite, dans un tronc de tilleul creux. (Rouvray; extrêmement rare. — M. Emy.)

EUCNEMIS. Ahrens.

853. E. CAPUCINUS. Ahrens. Rare. Sur les tilleuls et peupliers creux. Du 18 mai au 6 juillet. Dijon, au Parc, sur un tronc de peuplier creux et sur du bois mort empilé; cours du Parc, sur les troncs de tilleuls creux; Allée-de-la-Retraite et rempart de Tivoli, aussi sur des tilleuls creux. (Rouvray. — M. Emy.)

854. E. EMYI. Rouget. Inédit. (1) J'ai trouvé trois exemplaires de cette espèce en fauchant dans les bois; le premier

---

(1) J'extraits d'une description manuscrite, que je me propose d'adresser à la Société Entomologique de France, la diagnose suivante, qui suffira pour faire reconnaître facilement cette nouvelle espèce :

*Elongatus, niger, confertim punctatus, cinereo-pilosus; capite convexo, non carinato, antennis longioribus, serratis; pronoto latitudine breviori, convexo, basi transversim impresso, postice medio longitudinaliter carinato, antice angustato, lateribus rectis, angulis posticis valde productis, acutissimis, supra carinatis; prosterno brevi, scrobibus antennarum profundis, rectis; elytris stria suturali tantummodo conspicua, apice summo laxè subseriatim foveolato-punctatis; tibiis tarsisque testaceis, his tenuibus, posticis elongatis.*

MAS. *Antennis quarta parte corpore brevioribus, acutissime serratis.*

FEM. *Antennis tertia parte corpore brevioribus.*

(Long. 0<sup>m</sup>,0033-0<sup>m</sup>,0038. — Lat. 0<sup>m</sup>,0011-0<sup>m</sup>,0012.)



le 12 juin, à Flavignerot, au bas de la combe, et les deux autres les 20 et 24 juillet, à Plombières, dans la combe de Neuvon à Darois.

SYNAPTUS. *Esch.*

855. *S. FILIFORMIS. F.* Rare. Bois de la plaine, en fauchant. Juin. Fixin, bois près du chemin de fer. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune; sur les plantes. — MM. *Arias* et *Bourlier.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

MELANOTUS. *Esch.* — CRATONYCHUS. *Dej.*

856. *M. NIGER. F.* Trouvé une seule fois à Dijon, par terre dans une rue, le 19 mai. (Beaune; pas commun; l'été; sur des plantes. — M. *Arias.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

857. *M. CASTANEIPES. Payk.* — *OBSCURUS. F.* Pas rare. Dans les bois sur les pousses de chêne. Du 16 mai au 11 juin. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bois du Chaignot et de Château-Renaud. Plombières, combe de Neuvon, sous l'écorce d'une vieille souche de chêne. Chambolle. (Beaune. — M. *Bourlier.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

LACON. *Laporte.* — AGRYPNUS. *Esch.*

858. *L. MURINUS. Linn.* Très-commun. Sur les tiges des plantes et au vol. Mai, juin. Dijon, au cimetière, à la Combe-aux-Serpents, sur les bords de Suzon, dans les fossés du cours du Parc, etc. (Quetigny. — M. *Tarnier.*) Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant. Chambolle, etc. (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

ATHOUS. *Esch.*

859. *A. RHOMBEUS. Oliv.* Rare. Le soir au vol autour des saules, à huit heures environ, lorsqu'il fait très-chaud; quelquefois la journée sur le tronc des tilleuls. Du 15 juin





au 7 août. Dijon, fontaine de Larrey, bord du Canal près de Larrey, cours du Parc, (rempart de Tivoli. — M. *Nodot*).

860. A. *HIRTUS*. *Herbst*. Commun. Sur les graminées et les feuilles d'arbres, surtout dans les bois. Juin. Dijon, au Parc et dans les fossés du cours du Parc. Gevrey. Chambolle. (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

861. A. *LONGICOLLIS*. *F*. Commun. Sur les plantes et les feuilles d'arbres, surtout dans les bois. Juin, juillet. Dijon. Gevrey, bois de la plaine et de la montagne. Etc. (Fauverney, en fauchant, sur les chênes près de la Bayotte. — M. *Nodot*.) (Beaune; rare. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

862. A. *HEMORRHOIDALIS*. *F*. Très-commun. Dans les bois, en fauchant dans les taillis de deux ou trois ans. Mai, juin. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois de la montagne et bois de la plaine. Etc. (Beaune. — MM. *Arias* et *André*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

863. A. *INUNCTUS*. *Panz*. Rare. Dans les saules pourris, en creusant le bois. Avril. (Dijon, bord de l'Ouche, près du moulin Vesson. — M. *Tarnier*.) Quetigny, au bord du ruisseau; moins rare qu'à Dijon. (Rouvray; pas commun. — M. *Emy*.)

864. A. *CRASSICOLLIS*. *Dej*. Pas commun. Sur les plantes, par terre et dans les bois en fauchant. Fin juin, juillet. Dijon, dans les rues de la ville, par terre, à l'époque où se font les provisions de bois à brûler; rempart de Tivoli et cours du Parc, par terre; barrière au-dessus du débarcadère du chemin de fer. Talant, du côté de Dijon, sur le *Carduus nutans*. Fixin, bois près du chemin de fer.

865. A. *VITTATUS*. *F*. Commun. Dans les bois, en fauchant dans les jeunes taillis. Mai, juin. Dijon, bord de l'Ouche; avril. Plombières, combe de Neuvo. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. (Fixin. — M. *Tarnier*.) Gevrey. Chambolle, etc. (Beaune; rare. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

866. A. DILUTUS. *Kugel.* — SUBFUSCUS. *Gyll.* Rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. Emy.)

867. A. LUGENS. *Redt.* Rare. Dans les tilleuls creux et sur le bois mort. Mai, juin. Dijon, cours du Parc et Allée-de-la-Retraite; chantiers de bois à brûler près du bassin du Canal.

CREPIDOPHORUS. *Muls.* — ATHOUS. *Esch.*

868. C. MUTILATUS. *Rosenh.* — FOVEOLATUS. *Hampe.* — ANTHRACINUS. *Muls. Opusc. Ent. 2.* Très-rare. Je n'ai trouvé qu'une seule fois cet insecte, au nombre de deux exemplaires, le 14 juin, au Parc, sur le tronc d'un peuplier creux.

CAMPYLUS. *Fisch.*

869. C. LINEARIS. *F.* Rare. Dans les bois de la plaine sur le saule Marceau, très-rarement dans les bois de montagne. Du 13 mai au 7 juillet. Dijon, au Parc sur du bois coupé; (cours du Parc. — M. Nodot). Fixin et Gevrey, bois de la plaine. Epernay. Curley, bois des Liards. Concéur, bois de Mantuan, sur un vieux hêtre creux abattu. (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

Variété MESOMELAS. *F.* Comme le type, mais beaucoup plus rare. Dijon, au Parc, sur du bois mort coupé. Fixin et Gevrey, bois de la plaine. (Rouvray. — M. Emy.)

LIMONIUS. *Esch.*

870. L. NIGRIPES. *Gyll.* Commun. Sur les graminées et dans les bois, en fauchant. Mai. Dijon, fossés du cours du Parc, intérieur du Parc, Combe-aux-Serpents, etc. J'ai aussi trouvé cet insecte le 3 avril, sous une pierre, au bas du mur au nord du clos de Pouilly. Fixin, bois de la montagne et de la plaine. (Beaune. — MM. Arias et Bourlier.) (Rouvray. — M. Emy.)





871. *L. MINUTUS. Linn.* Pas commun. Dans les tilleuls creux. Du 12 avril au 20 mai. Dijon, cours du Parc et Allée-de-la-Retraite. J'ai aussi obtenu cet insecte d'éclosion; il provenait de tiges de lierre mort rapporté du Parc. (Beaune. — *M. André.*)

872. *L. BRUCTERI. F.* (Rouvray; très-rare. — *M. Emy.*)

873. *L. BIPUSTULATUS. Linn.* Pas commun. Sur les ombellifères dans les bois et en fauchant, sous les écorces d'arbres morts et abattus, sur le bois mort, quelquefois dans les maisons sur le bois à brûler. Du 3 mai au 8 juin; 24 mars, sous des écorces. Dijon, au Parc, en fauchant sur les fleurs d'*Anthriscus sylvestris*, sur du bois mort empilé, sous des écorces de charmes abattus, sur le mur de la maison du concierge; sur la barrière au-dessus de la gare du chemin de fer; trouvé aussi, en février, dans les maisons sur du bois mis sur le feu. Fixin, bois de la plaine près du chemin de fer. (Pontailler-sur-Saône, dans l'intérieur du bois mort et sous les écorces de chêne; octobre. — *M. Dudrumel.*) (Beaune. — *M. André.*) (Rouvray; rare; sous les mousses. — *M. Emy.*)

J'ai trouvé au Parc et à Fixin une très-jolie variété de cet insecte, dont les élytres sont entièrement d'un rouge testacé; mais cette variété est très-rare. On trouve aussi quelquefois des exemplaires dont la tache humérale disparaît presque complètement.

874. *L. PARVULUS. Panz.* — *Mus. Ill.* Très-commun. En fauchant dans les bois sur les jeunes taillis. Mai. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois de la plaine et de la montagne. Gevrey. Chambolle. (Beaune. — *MM. Arias et Bourlier.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

#### CARDIOPHORUS. *Esch.*

875. *C. THORACICUS. F.* Pas commun. Sur le bois à brûler, dans les chantiers, et dans les troncs d'arbres creux. Avril, mai, commencement de juin. Dijon, cours du Parc,



dans les tilleuls ; à Larrey, sur un mur ; dans les maisons, sur le bois à brûler. (Beaune ; sous les écorces de vieux saules. — *M. Arias*. — *M. Bourlier*.) (Rouvray. — *M. Emy*.)

876. *C. RUFIPES. F.* (Fauverney ; en fauchant, sur les chênes à la Bayotte ; 13 juin. — *M. Nodot*.) (Rouvray ; pas commun. — *M. Emy*.)

877. *C. RUBRIPES. Germ.* — *ALBIPES. Meg.* (Rouvray ; commun. — *M. Emy*.)

*ELATER. Linn. — AMPEDUS. Meg.*

878. *E. SANGUINEUS. Linn.* Pas commun. Dans les bois, sur les fleurs et les feuilles, sous les écorces et dans le bois pourri. Fin février, mars, mai, juillet, septembre. Dijon, au Parc, dans l'intérieur de branches mortes tombées par terre ; près de l'Île, dans un peuplier pourri. Velars-sur-Ouche, coteau au-dessus de la forge. Gevrey, près du petit étang de Satenay, sur les feuilles d'aulne, dans les souches mortes de cet arbre et sur des piles de bois. Curley, bois des Liards, sur les ombellifères, en fauchant, et sous des écorces de cerisiers morts. (Beaune. — *M. Arias*.) (Rouvray. — *M. Emy*.)

879. *E. LYTROPTERUS. Germ.* (Beaune ; pas commun. — *M. Arias*.)

880. *E. EPHIPIUM. F.* Rare. Dans le bois pourri. Mai, juillet, septembre. Quetigny, dans un saule pourri abattu. (Pontailler-sur-Saône, bois au bord de la Saône, dans le bois mort. — *M. Dudrumel*.) Gevrey, sur des piles de bois d'aulne, près du petit étang de Satenay.

881. *E. PREUSTUS. F.* Rare. Dans les bois. Du 16 mai au 5 juin. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant. Gevrey, bois du Chaignot, un seul exemplaire, en fauchant. (Beaune. — *M. Bourlier*.)

882. *E. POMORUM. Geoffr.* — *FERRUGATUS. Ziegl.* Pas rare. Dans les saules pourris. Avril à septembre. Dijon, bords de





l'Ouche ; fontaine de Larrey, dans les saules, sur les feuilles de cet arbre et au vol le soir. (Beaune. — M. *Bourlier*.)

883. E. CROCATUS. *Geoffr.* Pas rare. Comme le précédent. Avril à juillet. Dijon, fontaine de Larrey, saules et peupliers pourris, sur les feuilles des saules, en fauchant sur les herbes au bord de l'eau, et au vol le soir. Quetigny. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sur des piles de bois d'aulne. (Rouvray. — M. *Emy*.)

884. E. BALTEATUS. *Linn.* (Rouvray; fort rare. — M. *Emy*.)

885. E. ELONGATULUS. *F.* Assez commun. Sur le saule Marceau dans les bois de la plaine. Mai, juin. Fixin et Gevrey, sur les rejets de saule Marceau, dans les jeunes taillis, et en fauchant; bord du petit étang de Satenay, sur des piles de bois d'aulne. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux, en fauchant. (Rouvray. — M. *Emy*.)

886. E. MEGERLEI. *Germ.* Très-rare. Deux exemplaires ont été trouvés à l'Allée-de-la-Retraite par M. *Tarnier*, l'été, sur des troncs creux de tilleuls, le soir.

887. E. BRUNNICORNIS. *Germ.* — *ÆTHIOPS.* *Frælich.* Rare. Dans le bois pourri des tilleuls, sur le bois mort et sous les écorces d'arbres morts. Février, mars, mai, juin, août. Dijon, (Allée-de-la-Retraite, Cours-Fleury, dans le bois pourri des tilleuls. — M. *Dudrumet*; il a également obtenu d'éclosion cet insecte chez lui, après avoir renfermé dans une chambre du bois pourri de tilleul provenant de ces localités); Parc, écorces de charmes abattus; trouvé dans une chambre dans la ville à la fin de l'hiver; il sortait sans doute de vieux bois à brûler mis sur le feu. Curley, bois des Liards, écorces de cerisiers morts.

ISCHNODES. *Germ.* — AMPEDUS. *Meg.*

888. I. SANGUINICOLLIS. *Panz.* J'ai trouvé un seul exemplaire de ce très-rare insecte, à Dijon, au Parc, sur un banc en bois, le 15 mai. Un deuxième exemplaire existe dans la

collection du Muséum de la ville de Dijon ; il provient sans doute aussi des environs de cette ville.

CRYPTOHYPNUS. *Esch.*

889. C. PULCHELLUS. *Linn.* (Dijon, le long de l'Ouche derrière le Parc ; 23 avril. — M. *Nodot.*) (Rouvray ; rare ; sur les sables au bord des ruisseaux. — M. *Emy.*)

890. C. TETRAGRAPHUS. *Germ.* — QUADRIPUSTULATUS. *Payk.* Commun. Dans le sable et sous les détritux au bord de l'eau. Avril, juin, août, novembre. Dijon, bord de l'Ouche au-dessous de Dijon, bord de Suzon. Ahuy, bord de Suzon. (Rouvray. — M. *Emy.*)

891. C. DERMESTOIDES. *Herbst.* — MINIMUS. *Dej.* (Rouvray ; rare ; sous une pierre près du moulin Fricot ; fin avril. — M. *Emy.*)

892. C. LAPIDICOLA. *Westerh.* — EXIGUUS. *Dej.* Un seul exemplaire trouvé dans les environs de Dijon, je crois dans la combe de Neuvon, près Plombières.

893. C. MINUTISSIMUS. *Germ.* Rare. En fauchant dans les bois. 3 et 24 juin. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot, au bas de la combe.

LUDIUS. *Latr.* — STEATODERUS. *Esch.*

894. L. FERRUGINEUS. *Linn.* Assez rare. Sur les feuilles et sur le tronc des saules, sur les troncs creux des peupliers, des tilleuls et des marronniers d'Inde. Du 23 juin au 8 août. Dijon, fontaine de Larrey, bords de l'Ouche sur les saules ; cours du Parc et Allée-de-la-Retraite, dans les tilleuls creux ; (rempart du Château, troncs creux des marronniers d'Inde. — M. *Dudrumel.*) (Beaune. — M. *Arias.*)

La variété à prothorax noir a été prise une fois à la fontaine de Larrey par M. *Tarnier*. Elle a été trouvée aussi près de Semur.





CORYMBYTES. *Latr.* — *LUDIUS. Latr.*

895. C. HÆMATODES. *F.* Pas commun. Dans les bois de la plaine, sur le saule Marceau. Du 24 avril au 19 juin. Fixin, bois près du chemin de fer, sur les pousses de saule Marceau et sur la barrière du chemin de fer. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux, sur les saules Marceau, au bord du fossé du chemin de Saint-Nicolas à Nuits et dans un faux chemin dans la partie en futaie de la forêt. Trouvé aussi, mais rarement, à Flavignerot, sur les ombellifères dans le pré de la combe, par MM. *Ch.* et *L. Humbert.* (Semur, autour des arbres fruitiers en fleurs; avril. — *M. Nodot.*) (Rouvray; assez commun dès le commencement de la feuillaison des chênes, il voltige à la cime des jeunes cépées. — *M. Emy.*)

896. C. CASTANEUS. *Linn.* Très-rare. J'ai trouvé une femelle de cet insecte dans la forêt de Cîteaux, près de Saint-Nicolas, sur un saule Marceau, le 19 juin. (Rouvray. — *M. Emy.*)

897. C. TESSELLATUS. *Linn.* J'ai trouvé un exemplaire de cet insecte le 8 juin, en fauchant dans un petit pré situé entre les bois, au bord de la voie romaine, sur le territoire de la commune de Fénay, et deux autres à Gevrey, au bord du petit étang de Satenay, en fauchant et sur le saule Marceau, le 10 juin. (Rouvray; pas rare. — *M. Emy.*)

DIACANTHUS. *Latr.* — *LUDIUS. Latr.*

898. D. HOLOSERICEUS. *F.* Commun. Dans les bois de la plaine, sur le saule Marceau et en fauchant. Du 24 avril au 30 juin. (Dijon, au Parc, sur l'*Anthriscus sylvestris*; une seule fois. — *M. Tarnier.*) Fixin et Gevrey, bois de la plaine. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune; pas commun. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

899. D. METALLICUS. *Payk.* Pas très-rare. Dans les bois de la plaine, sur le saule Marceau. Du 16 mai au 23 juillet.



Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bois de la plaine; une seule fois en montagne dans le bois du Chaignot. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. (Rouvray. — M. Emy.)

900. D. LATUS. *F.* Commun. Sur les graminées, dans les clairières et sur la lisière des bois de montagne. Du 13 mai au 14 juin. Corcelles-les-Monts, Combe-aux-Serpents et Mont-Afrique. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. (Fixin. — M. Tarnier.) Gevrey. Chambolle. (Beaune; sur les fleurs; printemps et automne. — MM. Arias et Bourlier.) (Rouvray. — M. Emy.)

AGRIOTES. *Esch.*

901. A. PILOSUS. *F.* Assez commun. Dans les bois, sur les feuilles, en fauchant et au vol. Du 24 avril au 26 juin. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois de la plaine et de la montagne. Gevrey. Chambolle. Reulle-Vergy, bois de Mantuan. (Beaune. — M. Bourlier.) (Rouvray. — M. Emy.)

902. A. GALLICUS. *Dej.* Commun. Sur les ombellifères et autres fleurs. Août. Dijon, au bord des chemins autour de la ville; chemin de Daix, sur les fleurs de carotte; etc. (Beaune. — M. André.) (Rouvray. — M. Emy.)

903. A. GRAMINICOLA. *Redt.* — GILVELLUS. *Ziegl.* Commun. Sur les fleurs d'yèble et de carotte. Juillet, août. Dijon, au bord du Canal et au bord des prés de l'Ouche vis-à-vis la Combe-aux-Serpents, chemin de Daix et la plupart des petits chemins peu fréquentés autour de la ville. (Beaune. — MM. Arias et André.) (Rouvray. — M. Emy.)

On trouve, aussi communément que le type, les deux variétés de cette espèce; la première avec les élytres plus ou moins obscures à leur partie postérieure, et la deuxième avec les élytres entièrement obscures.

904. A. SEGETIS. *Bierk.* Assez commun. Sous les pierres, dans les champs et les prés au bord de l'eau. Fin de l'hiver, printemps. Dijon, bords de Suzon et de l'Ouche. Ahuy.





(Beaune. — MM. *Arias* et *André*. Savigny, près Beaune, Fontaine-Froide, sous des écorces; octobre. — M. *Bourlier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

905. *A. OBSCURUS*. *Linn.* — *VARIABILIS*. *F.* Pas rare. Sous les pierres, dans les prés. Avril, mai. Dijon, près du bord de l'Ouche, près le moulin Vesson. (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

906. *A. SPULATOR*. *Linn.* Commun. Sur les fleurs, surtout les ombellifères. Juillet. Environs de Dijon, au bord des chemins dans les lieux cultivés en vigne. (Beaune; pas commun. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

907. *A. RUFULUS*. *Dej.* Très-rare. Environs de Dijon.

908. *A. FALLAX*.... (Rouvray; très-rare. — M. *Emy*.)

*SERICOSOMUS*. *Serv.*

909. *S. FUGAX*. *F.* (Rouvray; très-rare. — M. *Emy*.)

*DOLOPIUS*. *Meg.*

910. *D. MARGINATUS*. *Linn.* Commun. Dans les bois, en fauchant et sur les ombellifères. Mai, juin. Dijon, au Parc, sur les fleurs de l'*Anthriscus sylvestris*. Plombières, combe de Neuvon. Fixin, bois près du chemin de fer. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

*ADRASTUS*. *Meg.*

911. *A. PALLENS*. *F.* Commun. Dans les bois en fauchant. Mai, juin. Flavignerot. Marsannay-la-Côte, etc. (Beaune. — M. *Bourlier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

912. *A. PUSILLUS*. *F.* Commun. Sur les graminées, au bord de l'eau et dans les bois. Juin, juillet. Dijon, fontaine de Larrey, le soir; bords de l'Ouche, le soir, sur les *Dipsacus* et autres plantes, au bord des prés, après la fauchaison.

Chambolle, dans un jardin, sur des noisetiers. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux (Beaune. — MM. *Arias* et *André*.)

913. A. *QUADRIMACULATUS*. *F.* (Beaune; rare. — M. *Arias*.)

914. A. *UMBRINUS*. *Germ.* (Beaune; pas commun. — M. *Arias*.)

---

## CYPHONES.

---

ATOPA. *Payk.*

915. A. *CERVINA*. *F.* Pas commune. Dans les bois de montagne, sur le noisetier dans les jeunes taillis, sur les ombellifères et en fauchant; on le trouve quelquefois noyé dans l'eau retenue par les feuilles des *Dipsacus*. Du 6 juin au 13 juillet. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Gevrey. Chambolle. L'Etang-Vergy. Blaisy-Bas.

D'après des observations récentes, la larve de cet insecte vivrait dans les bulbes d'orchidées.

916. A. *CINEREA*. *F.* Comme la précédente, avec laquelle on la trouve presque toujours, mais plus rarement. J'ai trouvé une fois la *cinerea* accouplée avec la *cervina*; celle-ci était une femelle. Je suis très-disposé à croire que la *cinerea* n'est qu'une variété du mâle de la *cervina*.

ELODES. *Latr.* — *CYPHON*. *F.*

917. E. *LIVIDA*. *F.* Pas rare. Dans les endroits humides près de l'eau. Juin. Plombières, combe de Neuvon. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Etc. (Beaune; été. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

918. E. *VARIABILIS*. *Thunb.* — *PUBESCENS*. *F.* (Rouvray; commune. — M. *Emy*.)





919. *E. COARCTATA*. *Payk.* — *GRISEA*. *F.* Commune. Sur les plantes, au bord de l'eau. Juin, juillet, septembre. Dijon, fontaine de Larrey. Fixin, fossés du chemin de fer, près du bois. Gevrey, au-dessus du grand étang de Satenay et sous les détritiques dans le bois d'aulnes près du petit étang.

920. *E. SERRICORNIS*. *Müll.* — *TESTACEA*. *Dej.* Très-rare. Dijon, dans l'intérieur du Parc, sur une feuille du lierre qui entourait un gros orme, 29 juin; un exemplaire. Velars-sur-Ouche, près des terres à l'est de la ferme du Fays, au-dessus d'un coteau, en fauchant, sur de jeunes pousses de chêne, dans une coupe en exploitation; 8 juillet; trois exemplaires.

921. *E. PALLIDA*. *F.* Assez commune. Sur les plantes, au bord de l'eau. 20 mai, juin, juillet. (Messigny, vallon de Sainte-Foy. — *M. Nodot.*) Gevrey, au bord des ruisseaux, près des étangs de Satenay. Blaisy-Bas, au bord du ruisseau, sur le *Nasturtium officinale* et d'autres plantes. (Beaune; pas commun. — *MM. Arias et André.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

#### SCIRTES. III.

922. *S. HEMISPHERICUS*. *Linn.* Commun. Sur les plantes aquatiques, au bord de l'eau. Fin juin, juillet. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant; très-abondant au bord des fossés du chemin de fer, sur le saule Marceau, les roseaux, les prêles, etc. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. (Beaune. — *MM. Arias et Bourlier.*) (Rouvray; lieux humides; en automne. — *M. Emy.*)

#### EUCINETUS. *Schüpp.* — *NYCTEUS*. *Latr.*

923. *E. HÆMORRHOIDALIS*. *Germ.* — *HÆMORRHUS*. *Ziegl.* Rare. Sous les pierres. Du 17 mars au 30 avril. Dijon, chemins entre celui d'Ahuy et celui de Fontaine; chemin de Daix, au bas d'une haie.



## TELEPHORI.

### LYGISTOPTERUS. *Dej.*

924. L. SANGUINEUS. *F.* Très-rare. Trouvé à Epernay par M. J. Saintpère, le 29 juin, sur un vieux chêne; quatre exemplaires. (Rouvray. — M. Emy.)

### DICTYOPTERUS. *Latr.*

925. D. AURORA. *F.* Très-rare. Trouvé dans la combe de Flavignerot, le 25 juin, par M. Ch. Humbert.

926. D. MINUTUS. *F.* Très-rare. Trouvé un exemplaire, mort récemment, à Dijon, au Parc, sous la mousse qui recouvrait une souche, au commencement de septembre.

### OMALISUS. *Geoffr.*

927. O. SUTURALIS. *F.* Commun. En fauchant, dans les bois. Du 28 mai au 30 juin. (Messigny, vallon de Sainte-Foy. — M. Nodot.) Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot. Marsannay, dans la combe et vers le parc de Gouville. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey. Chambolle. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. Emy.)

### LAMPYRIS. *Linn.*

928. L. NOCTILUCA. *Linn.* Commune. Tout le monde connaît la femelle, que sa lumière phosphorescente fait aisément découvrir par terre, entre les herbes et les plantes, dans les soirées chaudes de l'été; le mâle, qui n'est pas lumineux, ou seulement quelquefois peu distinctement, se trouve souvent accouplé avec la femelle; si l'on a pris une de ces dernières, il n'y a qu'à la placer dans un endroit





découvert (sur son chapeau, par exemple), et, en la visitant de temps à autre, on trouvera fréquemment des mâles auprès d'elle; on peut aussi chercher à prendre les mâles au vol, ce qui n'est pas très-facile à cause de l'obscurité; mais, si l'on se munit d'une lanterne ou si l'on expose une lumière sur une fenêtre, dans une maison de campagne, ces insectes viennent voltiger à l'entour, souvent en grand nombre. Juin et juillet les deux sexes; août, seulement des femelles. Dijon, bords du Canal, talus des deux routes de Paris, aux Perrières, etc. Talant. Fixin. Chambolle. (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

Je n'ai jamais trouvé cet insecte pendant le jour; je ne sais où il se tient caché alors. On ne le rencontre que le soir lorsque l'obscurité est à peu près complète, et la nuit.

La larve se trouve assez communément dans les endroits secs, sous les pierres, presque toute l'année. Cette larve est quelquefois un peu lumineuse, pendant les soirées chaudes d'août et de septembre.

PHOSPHÆNUS. Lap. — GEOPYRIS. Dej.

929. P. HEMIPTERUS. F. Pas commun. Par terre sur les chemins la journée, surtout par un temps chaud, lorsque la terre est un peu humide; on le trouve aussi le soir, mais il est à peine lumineux et par conséquent très-difficile à apercevoir. Du 24 mai au 24 juillet. Dijon, au Parc, sur les chemins autour de la ville, au bord des routes; je l'ai trouvé une fois, au nombre de plusieurs centaines, le 6 juin, dans les ornières du chemin de Pouilly à Fontaine, entre la route de Langres et Suzon; presque tous ces insectes étaient noyés dans l'eau de pluie retenue dans les parties profondes de ces ornières. Plombières, combe de Neuvon, en fauchant. Talant, chemin de Dijon. Flavignerot, dans la combe. Marsannay-la-Côte, sur le chemin de Dijon. Chambolle. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. Emy.)

J'ai trouvé deux ou trois exemplaires de la larve de cette espèce ; elle est faiblement lumineuse, peut-être même n'est-ce pas en tout temps. Un de ces exemplaires a été trouvé au mois de mai, le soir, près de Marsannay-la-Côte, sur le chemin de Dijon, et un autre à Gevrey, au bord du petit étang de Satenay, sous les détritns.

DRILUS. Oliv.

930. D. FLAVESCENS. F. Mâle, pas rare. Au bord des chemins, sur les graminées et sur les haies. Du 23 mai au 26 juin. Dijon, fontaine de Larrey, etc. Plombières, combe de Neuvon. Marsannay-la-Côte, dans la combe. (Fixin. — M. Tarnier.) (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

La femelle de cet insecte est aptère, comme celle des *Lampyrus* ; elle est excessivement difficile à trouver ; elle vit dans les *Helix*. M. Tarnier en a pris une à Fixin.

J'ai trouvé la larve de cette espèce à Dijon, une fois par terre sur la route devant la porte de l'Arquebuse, et une autre fois au bas d'un mur sur le chemin qui va du faubourg Raines à l'Asile des Aliénés ; en août. J'ai également récolté un certain nombre d'exemplaires de cette larve, vers le milieu d'août, au Jardin botanique de Dijon, dans les coquilles de l'*Helix hortensis* (n° 31 du *Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles du département de la Côte-d'Or*, de M. Barbié), dont elle dévore le mollusque ; j'en ai recueilli dans la même localité au mois d'octobre et au mois de février ; dès la première de ces époques cette larve a atteint tout son développement et habite le fond de la spire de l'*Helix* ; elle y reste immobile tout l'hiver, s'y transforme en nymphe, et l'insecte parfait n'écloît qu'à la fin de mai suivant ou au commencement de juin. J'espère, cette année (1856), obtenir l'éclosion de mes larves, et me procurer ainsi quelques femelles de *Drilus*, que j'ai vainement cherchées depuis que je collige des Coléoptères.





Pour se procurer ces larves, il suffit, après l'hiver, au mois de février ou de mars, de ramasser des coquilles vides d'*Helix hortensis*, qui sont très-communes à cette époque, par terre, surtout au bas des murs exposés au nord et au pied des haies vives, dans le voisinage des vignes ou dans les endroits un peu humides. On peut aisément reconnaître celles des coquilles où se trouvent des larves de *Drilus*, en faisant un petit trou, après le premier tour de spire, contre la bouche de ces coquilles; on voit alors aisément, lorsqu'il existe une larve, la peau provenant de sa dernière mue; en détournant cette peau, on aperçoit l'abdomen de la larve: cependant, quand celle-ci est de petite taille, elle est plus avancée vers le fond de la coquille, et il faut alors faire l'ouverture sur une partie de la spire un peu plus éloignée de la bouche.

Voyez, au surplus, les détails intéressants donnés par MM. *Mielzinski* et *Desmarest* dans les *Annales des Sciences naturelles*, 1824, t. I, p. 67, s. pl. VII, et t. II, p. 257, s. pl. XV.

TELEPHORUS. Geoffr. — CANTHARIS. Linn.

931. T. FUSCUS. *Linn.* — ANTICUS. *Märkel.* Commun. Sur les graminées et les haies vives. Mai. Environs de Dijon. Blaisy-Bas, dans le bois; 6 juin. (Beaune. — M. *Arias.*)

932. T. RUSTICUS. *Fallen.* — FUSCUS. *F.* Très-commun. Sur les graminées, surtout au bord des chemins. Mai, commencement de juin. Dijon, fossés du cours du Parc, etc. (Beaune. — M. *André.*) (Rouvray; rare. — M. *Émy.*)

933. T. DISPAR. *F.* Assez commun. Sur les graminées et les feuilles d'arbres, dans les bois. Mai, commencement de juin. Dijon, intérieur du Parc et fossés du cours du Parc. Fixin, bois près du chemin de fer. (Beaune. — M. *Bourlier.*) (Rouvray; commun. — M. *Émy.*)

J'ai trouvé un mâle de cette espèce accouplé avec une femelle du *Lividus* (n° 942).



934. *T. PELLUCIDUS*. *F.* Pas commun. Environs de Dijon. (Beaune; très-commun. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

935. *T. VIOLAGEUS*. *Payk.* Un exemplaire de cette espèce a été trouvé aux environs de Beaune, en 1835, par M. *André*.

936. *T. NIGRICANS*. *F.* Assez commun. Environs de Dijon. Plombières, combe de Neuvon, en fauchant, sur les chênes, 4 juin. (Beaune; rare. — MM. *Arias* et *Bourlier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

937. *T. OBSCURUS*. *F.* Pas commun. Dijon, chemin de Marsammy-la-Côte, etc. Mai. (Beaune; très-commun; sur les plantes. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

938. *T. LATERALIS*. *Linn.* Très-commun. Dijon, Combe-aux-Serpents, etc. Mai. Gevrey, bord du petit étang de Saatenay, sur les chardons, 10 juin. (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.) (Rouvray; rare. — M. *Emy*.)

939. *T. PULICARIUS*. *F.* Commun. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy*.)

940. *T. ITALICUS*. *Dej.* — *FLAVICOLLIS*. *Dej.* (Rouvray. — M. *Emy*.)

941. *T. FULVICOLLIS*. *F.* (1). Pas rare. Je ne l'ai trouvé que dans la forêt de Cîteaux, sur le territoire de Saint-Nicolas, dans la partie en futaie, en fauchant, le 29 juin.

942. *T. LIVIDUS*. *F.* Commun. Au bord des chemins, sur les graminées et les haies vives; dans les bois. Mai, 2 juin. Dijon, chemins autour de la ville, fossés du cours du Parc. Fixin, bois près du chemin de fer. (Beaune; sur les blés. — MM. *Arias* et *André*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

Voyez l'observation à la suite du *T. Dispar* (n° 933).

943. *T. RUFUS*. *Linn.* Rare. Environs de Dijon.

---

(1) Dans le catalogue de M. Gaubil cette espèce est placée par erreur dans le genre *Ragonycha*, mais elle appartient réellement au genre *Telephorus*.





944. *T. BICOLOR. F.* Pas commun. Environs de Dijon. (Beaune. — M. André.) (Rouvray; rare. — M. Emy.)

945. *T. LITURATUS. Gyll.* Pas rare. Environs de Dijon.

946. *T. CLYPEATUS. Ill.* Assez commun. Sur les feuilles d'arbres et de plantes. Mai. Dijon, bords des chemins autour de la ville; chemin de Marsannay-la-Côte, etc. (Rouvray. — M. Emy.)

RAGONYCHA. Esch. — CANTHARIS. Linn.

947. *R. MELANURA. F.* Très-commune. Sur les graminées et différentes plantes, surtout le soir au coucher du soleil; dans les bois; etc. Mai, juin, juillet, août. Dijon, presque partout autour de la ville au bord des chemins, sur les fleurs d'yeble, les chardons, etc. Pare, Vieux-Suzon, etc. Fixin, bois près du chemin de fer et bois de la montagne. (Beaune. — MM. Arias et André.) (Rouvray. — M. Emy.)

948. *R. TESTACEA. Linn.* Commune. Dans les bois en fauchant. Mai, juin. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.) (Rouvray. — M. Emy.)

949. *R. FUSCICORNIS. Oliv.* Pas rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. Emy.)

950. *R. PALLIDA. F. — PALLIPES. F.* Commune. Dans les bois en fauchant. Juin. Fixin, bois près du chemin de fer, etc. (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.) (Rouvray. — M. Emy.)

MALTHINUS. Latr.

951. *M. MINIMUS. Oliv. — FLAVUS. Latr.* Pas rare. Dans les bois en fauchant. Juin. Fixin, bois près du chemin de fer. Chambolle. (Beaune. — M. André.)

952. *M. FASCIATUS. Oliv.* Assez commun. Dans les bois en fauchant. Juin. Fixin, bois près du chemin de fer. (Rouvray; rare. — M. Emy.)

953. *M. BIGUTTULUS*. *Payk.* Rare. Trouvé les 19 et 25 mai, à Dijon, au Parc, sur du bois mort empilé.

954. *M. BIGUTTATUS*. *Linn.* Commun. Dans les bois et les prés. Mai, juin. Dijon, au Parc, sur les fleurs d'*Anthriscus sylvestris*; sur les prés au bord de l'Ouche. (Messigny, vallon de Sainte-Foy. — *M. Vodot.*) Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey. (Beaune; pris une seule fois, en août, dans un jardin. — *MM. Arias, Bourlier et André.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

955. *M. MARGINATUS*. *Latr.* — *MINIMUS*. *Gyll.* (Rouvray. — *M. Emy.*)

956. *M. SANGUINICOLLIS*. *Sch.* Très-rare. Un seul exemplaire, pris en fauchant, sur les prés au bord de l'Ouche, à Dijon, le 1<sup>er</sup> juin.

957. *M. BREVICOLLIS*. *Payk.* Pas rare. Dans les prés et sur les haies. Mai, juin. Dijon, près au bord de l'Ouche; fontaine de Larrey; chemin de Daix, sur une haie. (Rouvray; sur les fleurs d'aubépine. — *M. Emy.*)



## MALACHII.

—

### MALACHIUS. *F.*

958. *M. RUBRICOLLIS*. *Fallen.* Pas rare. En fauchant dans les bois sur les jeunes taillis. Juin, juillet. Fixin, bois près du chemin de fer. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Collonges-les-Premières. (Beaune; printemps. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

959. *M. MARGINALIS*. *Dej.* Commun. Dans les bois en fauchant. Juin. Plombières, combe de Neuvon. Fixin, bois près du chemin de fer. Collonges-les-Premières. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune; pas commun. — *MM. Arias et André.*)

960. *M. PULICARIUS*. *F.* Commun. En fauchant dans les





prés et au bord de l'eau. Juin, juillet. Dijon, près au bord de l'Ouche, bords de la fontaine de Larrey et bords du Canal. (Rouvray. — M. Emy.)

961. M. SPINOSUS. *Dej.* (Rouvray. — M. Emy.)

962. M. ELEGANS. *Oliv.* Pas rare. Sur les plantes, les feuilles des arbres, les haies. Mai, juin. Dijon, autour de la ville. Chambolle. (Beaune. — MM. Arias et André.) (Rouvray. — M. Emy.)

963. M. MARGINELLUS. *F.* Commun. Sur les plantes au bord des ruisseaux. Juillet. Dijon, fontaine de Larrey. (Beaune. — MM. Arias et André.) (Rouvray. — M. Emy.)

964. M. RUFUS. *F.* (Beaune; rare; printemps. — M. Arias.)

965. M. VIRIDIS. *F.* Variété. BIPUSTULATUS. *Ill.* Commun. Sur différentes fleurs au bord des chemins. Juin, juillet, août. Dijon, chemin entre celui d'Ahuy et celui de Fontaine, sur les fleurs de plantain; chemin de Mirande par les Petites-Roches, sur les fleurs de carotte. Plombières, combe de Neuvon à Darois. (Beaune. — MM. Arias et André.)

966. M. BIPUSTULATUS. *Linn.* Commun. Sur les fleurs au bord des chemins. Mai, juin. Dijon, fontaine de Larrey, etc. Plombières, combe de Neuvon. (Beaune. — MM. Arias et André.) (Rouvray. — M. Emy.)

967. M. SCUTELLARIS. *Erichs.* Très-rare. Environs de Dijon.

968. M. ÆNEUS. *F.* Pas rare. Sur les graminées. Juin, juillet. Dijon, dans les jardins, au Parc, etc. (Beaune. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)

ANTHOCOMUS. *Erichs.* — MALACHIUS. *F.*

969. A. EQUESTRIS. *F.* Commun. Dans les maisons, dans la ville au vol dans les rues, dans les arbres creux. Du 12 avril au 30 mai. Dijon, dans les maisons, au vol et sur les murs dans les rues, cours du Parc dans les tilleuls creux, intérieur du Parc sur une souche, hors la ville du côté du nord. (Beaune; pas commun. — M. Arias.) (Rouvray. — M. Emy.)



970. A. FASCIATUS. *F.* Pas rare. Dans les bois, en fauchant et quelquefois dans les maisons. Du 11 mai au 8 juin. Dijon, dans les maisons, au Parc sur les fleurs d'*Anthriscus sylvestris*. Flavignerot, dans la combe. Fixin, bois près du chemin de fer. Blaisy-Bas. (Châtillon-sur-Seine. — M. Gontard d'après M. Emy.)

Variété. REGALIS. *Charp.* Très-rare. Un seul exemplaire trouvé à Dijon, au Parc sur du bois mort empilé, en mai.

971. A. LOBATUS. *Oliv.* Rare. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant dans les jeunes taillis; 21 mai et 5 juin.

EBÆUS. *Erichs.* — MALACHIUS. *F.*

972. E. PEDICULARIUS. *Schrank.* Très-rare. Environs de Dijon.

973. E. THORACICUS. *F.* Commun. Sur les chardons, les *Onopordon*, les feuilles des rejets de tilleul au pied du tronc, dans les tilleuls creux, etc. Du 19 mai au 17 juillet. Dijon, Allée-de-la-Retraite sur les chardons et les *Onopordon*, cours du Parc dans les tilleuls creux et sur les feuilles des rejets au bas du tronc, sur la barrière au-dessus du débarcadère du chemin de fer. Chambolle, au vol dans le village. (Rouvray. — M. Emy.)

974. E. ALBIFRONS. *F.* Pas commun. Environs de Dijon. Dijon, cours extérieur de Suzon, près de la route de Gray, sur un tronc de peuplier; 2 août.

975. E. FLAVIPES. *F.* — PRÆUSTUS. *F.* Pas rare. Dijon, cours du Parc dans le tronc des tilleuls creux et sur les feuilles des rejets qui poussent au pied du tronc; trouvé aussi dans les maisons. Mai.

CHAROPUS. *Erichs.* — MALACHIUS. *F.*

976. C. PALLIPES. *Oliv.* Rare. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant; 22 juillet. (Rouvray. — M. Emy.)





TROGLOPS. *Erichs.* — *MALACHIUS. F.*

977. *T. ALBIGANS. Linn.* — *ANGULATUS. F.* Rare. Environs de Dijon.

DASYTES. *F.*

978. *D. FLORALIS. Oliv.* Rare. Plombières, combe de Neuvon, en fauchant; 26 juin, 3 août.

979. *D. NIGRICORNIS. F.* (Beaune; pas commun. — *M. Arias.*)

980. *D. ANTIQUUS. Sch.* Assez rare. Sous les écorces. Mars. Dijon, sous les écorces de sycomore au-dessus de la source de la fontaine de Larrey. (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune. — *M. André.*)

981. *D. NOBILIS. Ill.* Commun. Sur les fleurs. Du 9 mai au 3 août. Dijon, chemin entre celui d'Ahuy et celui de Fontaine, sur des fleurs de renoncule. Plombières, combe de Neuvon, en fauchant. Marsannay-la-Côte, bois près du parc de Gouville. Fixin, bois près du chemin de fer. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

982. *D. CŒRULEUS. F.* Rare. Dijon, cours du Parc sur un tronc creux de tilleul; 17 mai. (Beaune. — *M. André.* Un exemplaire.)

983. *D. NIGER. F.* Rare. Environs de Dijon. Collonges-les-Premières, 12 juillet.

984. *D. SUBENEUS. Sch.* (Rouvray. — *M. Emy.*)

985. *D. SCABER. Müll.* Pas commun. Juin, juillet, août. Environs de Dijon. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées, sur l'*Erysimum lanceolatum* (1). Plombières, combe de Neuvon à Darois. (Beaune. — *MM. Arias et André.*)

---

(1) Par suite d'une erreur, cette plante a été désignée précédemment sous le nom spécifique de *Cheirifolium*. Elle appartient réellement à l'*E. lanceolatum* R. Br. (*Cheiranthus* Pers.).

986. D. FLAVIFES. *F.* Assez commun. Dans les bois, sur les fleurs et en fauchant. (Mai. — M. *Turnier.*) Juin, juillet. Plombières, combe de Neuvon. Fixin, bois près du chemin de fer. Chambolle, Collonges-les-Premières. (Rouvray; pas commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*) (Pommard. — M. *Arias.*)

987. D. FUSCULUS. *Ill.* Pas commun. Sur les fleurs et en fauchant. Mai, juin, juillet. Dijon, chemin de Talant, dans les fleurs d'églaïtier, barrière au-dessus de la gare, etc. Talant, sur un *Verbascum*. Plombières, combe de Neuvon à Darois. (Beaune. — M. *Arias.*)

988. D. PLUMBEUS. *Oliv.* Pas rare. Environs de Dijon. (Rouvray, commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

989. D. FILIFORMIS. *Dej.* Pas rare. En fauchant, surtout dans les bois. Juillet. Dijon, au bord des chemins; chemin de Talant, sur un *Onopordon acantium*, etc. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt.

990. D. PALLIPES. *Ill.* Commun. Sous les pierres en mars et avril, et sur les fleurs en mai, juin et juillet. Dijon, chemin de Daix, sous les pierres, sur les fleurs d'aubépine, de ronce, etc. Chambolle. (Beaune, MM. *Arias* et *André.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

991. D. VULPINUS... (Rouvray. — M. *Emy.*)

DOLICHOSOMA. *Steph.* — DASYTES. *F.*

992. D. LINEARIS. *F.* Pas commun. Environs de Dijon. Rouvray, sur la camomille sauvage. — M. *Emy.*)





## CLERI.

---

### TILLUS. F.

993. T. *ELONGATUS*. *F.* (Environs de Rouvray, rare; dans les bois du Morvant, sur les vieux hêtres; au milieu de juin. — M. *Emy*.)

994. T. *UNIFASCIATUS*. *Latr.* Pas rare. Sur les arbres coupés, les fagots, les fleurs, etc.; quelquefois dans les maisons. Du 17 avril au 24 juin. Dijon, sur les murs, dans les maisons, sur la barrière au-dessus du débarcadère du chemin de fer, au Parc sur du bois mort empilé et sur des fagots. Plombières, sur un noyer coupé, sur la route. Marsannay-la-Côte, sur un cerisier abattu. Fixin, dans la combe; et dans le bois près du chemin de fer, sur le bois coupé et sur la barrière. Gevrey, bord du petit étang de Satenay sur les piles de bois d'aulne. (Combe de Gevrey. — M. *Tarnier*.) Chambolle, sur du bois dans une coupe en exploitation. (Beaune, sur les fleurs d'aubépine. — M. *Pérageallo*; en fauchant et en battant au parapluie, été. — M. *Arias*.)

### THANASIMUS. *Latr.* — CLERUS. *F.*

995. T. *FORMIGARIUS*. *F.* Commun. Sous les écorces, en hiver, au commencement du printemps et en automne; sur le bois coupé et dans les maisons, en avril et mai. Dijon, au Parc, sous les écorces de platane et sur du bois mort empilé; dans les maisons et dans les rues, sur les murs; dans les chantiers de bois à brûler; route de Gray, près de Montmuzard, sous une écorce de frêne. Chambolle, écorces d'érable-plane et sur le bois coupé dans les bois. (Beaune, écorces de platane. — M. *Arias*.)

### OPILUS. *Latr.* — NOTOXUS. *F.*

996. O. *MOLLIS*. *F.* Rare. Sous les écorces. Janvier à mai



Dijon, au Parc, sous les écorces de platane et sous celles des charmes morts sur pied. Chambolle, dans un jardin sous une écorce de pommier. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

TARSOSTENUS. *Spin.* — NOTOXUS. *F.*

997. T. UNIVITTATUS. *Rossi.* J'ai trouvé quinze exemplaires de cette espèce, à Dijon, sur la barrière au-dessus du débarcadère du chemin de fer, du 23 au 30 juin 1852.

TRICHODES. *F.*

998. T. ALVEARIUS. *F.* Assez commun. Sur les fleurs et les graminées, surtout dans les jardins. Mai. Dijon, au Parc, dans les fossés du cours du Parc, dans les jardins. (Beaune, printemps et été. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

999. T. APIARIUS. *F.* Pas commun. Dans les jardins près des ruches d'abeilles. Printemps. Dijon. Chambolle. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

NECROBIA. *Latr.* — CORYNETES. *F.*

1000. N. RUFIPES. *Fabr.* Un exemplaire de cette espèce a été pris par *M. Tarnier* à la gare de Gevrey, le 27 juin.

1001. N. RUFICOLLIS. *F.* Trouvé un seul exemplaire sur la barrière au-dessus du débarcadère du chemin de fer, le soir, après le coucher du soleil, le 16 mai.

1002. N. VIOLACEA. *Latr.* Deux exemplaires, également sur la barrière au-dessus du débarcadère, les 16 et 21 mai, le dernier le soir. (Beaune, rare ; été. — *M. Arias.*) (Rouvray, commun. — *M. Emy.*)

CORYNETES. *F.*

1003. C. VIOLACEUS. *Payk.* — CHALYBEUS. *Knock.* Commun. Sous les écorces, sur le bois coupé, dans les arbres creux, dans les maisons, sur les cadavres desséchés. Janvier





à juillet. Dijon, cours du Parc et Allée-de-la-Retraite, dans les tilleuls creux, surtout en mai; dans les maisons; sur la barrière au-dessus du débarcadère du chemin de fer. Flavignerot, sur un cadavre de cheval desséché. (Fixin, au vol, le soir. — M. *Tarnier*.) (Beaune, sur les fleurs. — M. *Arias*.) (Rouvray, — M. *Emy*.)



## PTINI.



HEDOBIA. *Ziegl.* — PTINUS. *Linn.*

1004. II. IMPERIALIS. *Linn.* Pas commun. Sur le bois mort, dans les arbres creux, dans les bois en fauchant, etc. Du 2 mai au 21 juin. Dijon, au Parc sur du bois mort empilé, cours du Parc dans les tilleuls creux, sur les murs et dans les jardins dans la ville, sur la barrière au-dessus du débarcadère du chemin de fer; fontaine de Larrey, le soir au vol. J'ai obtenu cet insecte d'éclosion; il provenait de branches de lierre mort rapportées du Parc. Blaisy-Bas, en fauchant dans le bois. (Beaune. — M. *Arias*.) Villenote, près Semur, au vol. (Rouvray, en battant les haies. — M. *Emy*.)

PTINUS. *Linn.*

1005. P. VARIEGATUS. *Rossi.* — ORNATUS. *Dahl.* (Beaune, dans les maisons; commun. — M. *Arias*.)

1006. P. SEXPUNCTATUS. *Panz.* Pas commun. Sous les écorces. Hiver. Dijon, sous les écorces de sycomore, au Parc et au-dessus de la fontaine de Larrey. (Rouvray, en battant l'aubépine en fleur. — M. *Emy*.) (Beaune, bois de Battant, sous une écorce de chêne sur pied; décembre. — M. *Bourlier*.)

1007. P. FUR. *Linn.* Commun. Sous les écorces d'arbres et dans les maisons. Automne, hiver et printemps. Dijon.

au Parc, sous les écorces de platane et de sycomore; dans les maisons, par les temps humides, surtout dans les latrines. (Beaune. — M. *Arias*.) (Rouvray; très-commun, en battant les haies. — M. *Emy*.)

1008. P. ORNATUS. Müll. — FUSCUS. Dej. Pas commun. Environs de Dijon. Trouvé en assez grande quantité par feu M. J. *Saintpère*, dans son bûcher, à Dijon, sur du bois de tremble provenant de l'Etang-Vergy.

1009. P. RAPTOR. Sturm. Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1010. P. RUFIPES. F. Rare. Sur le bois mort. Mai. Dijon, au Parc, sur du bois mort empilé. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant. (Rouvray; très-commun, en battant les haies. — M. *Emy*.)

1011. P. AUBEI. Boëldieu. Rare. Environs de Dijon. M. *André* a découvert, aux environs de Beaune, l'habitat très-remarquable de cet insecte; ayant recueilli, le 18 septembre 1857, dans les bois de la plaine, des galles de chêne tombées à terre et presque pourries, il trouva en les ouvrant le *P. Aubei*; dans plusieurs galles il découvrit la larve et la nymphe de cette espèce, qui ne tardèrent pas à se métamorphoser. Cet insecte a été pris également quelques jours après dans les mêmes circonstances et en certain nombre (1).

1012. P. PUSILLUS. Sturm. Rare. Environs de Dijon.

1013. P. LATRO. F. Pas commun. Dans les maisons. Dijon. (Beaune; commun. — M. *Arias*.)

1014. P. SULCIGOLLIS. Dej. (Rouvray; battue des haies sèches. — M. *Emy*.)

#### GIBBIUM. Scop.

1015. G. SCOTIAS. F. Pas rare. Dans les maisons, surtout dans les endroits peu éclairés et malpropres. Juin, juillet. Dijon. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

---

(1) Voyez la note publiée dans les *Annales de la Société entomologique de France*, année 1857, bulletin page cxi.





## ANOBII.

### ANOBIUM. F.

1016. A. PANICEUM. F. Commun. Dans les maisons ; il se trouve à l'état de larve dans la farine un peu ancienne, dans les pains à cacheter et dans d'autres substances farineuses. Dijon. Juillet. (Beaune. — MM. Arias et Bourlier.) (Rouvray. — M. Emy.)

1017. A. RUFIPES. F. (D'après M. Aubé, cette espèce devrait être rapportée, quoiqu'avec doute, à l'A. *Cinnamomeum*. Sturm.) Rare. Dijon, à la fontaine de Larrey, le soir au vol et sur le tronc d'un saule mort. Fin juin. Villers-les-Pots, au vol dans une coupe en exploitation, 28 juin.

1018. A. STRIATUM. Ill. — PERTINAX. F. Très-commun. Dans les maisons, où il perfore les meubles et les boiseries ; dans les bois, sur le bois coupé. Juin. Dijon, dans la ville ; je l'ai obtenu d'éclosion ; il provenait de branches de lierre mort rapportées du Parc. Fixin, bois près du chemin de fer. (Rouvray ; en battant les haies. — M. Emy.)

1019. A. PERTINAX. Linn. — STRIATUM. F. (Beaune, pas commun ; sur les échelas dans les vignes ; juin. — M. Arias.)

1020. A. CHEVRIERI. Kunze. Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1021. A. TESSELATUM. F. Assez commun. Dans les arbres creux, sur le bois mort, dans les maisons. Du 30 avril au 28 mai. Dijon, cours du Parc dans les tilleuls creux, chemin de la Charmette dans un cerisier creux, au Parc sur du bois mort empilé ; dans les maisons et sur les murs dans les rues. (Beaune ; sur le bois de chauffage. — M. Arias.) (Rouvray ; en battant les haies sèches et sur les vieux chênes. — M. Emy.)

1022. A. PLUMBEUM. Ill. Pas commun. Sur le bois coupé,



sur les échalas dans les vignes, au vol, etc. Du 3 mai au 4 juin. Dijon, au Parc sur du bois mort empilé et sur un petit arbre près de ce bois, sous une écorce de charme abattu un exemplaire mort trouvé le 2 novembre; chemin de Daix et fontaine de Larrey, le soir au vol. Gevrey, à l'extrémité des échalas dans les vignes. (Beaune; juin. — M. *Arias*.)

La variété de couleur chataine se trouve plus rarement que le type.

1023. A. VARIABLE. *Dej.* (Beaune, sur les échalas; juin. — M. *Arias*.)

1024. A. SERICEUM. *Duft.* Rare. En fauchant. Juin, juillet. Talant, près du clos Echalié, sur le *Carduus nutans*. Fixin, bois près du chemin de fer en fauchant.

1025. A. HEDERÆ. *Boudier.* (Rouvray; sur le lierre, en quantité. Juin et juillet. — M. *Emy*.)

#### OCHINA. *Ziegl.*

1026. O. HEDERÆ. *Germ.* Commune. Sur le lierre. Du 24 mai au 9 juillet. Dijon, au Parc sur le lierre qui croît autour des troncs d'arbres et sur les murs; en rapportant des branches de lierre mort on obtient très-abondamment cet insecte, qui vit dans ce bois à l'état de larve; en cassant ces branches j'ai trouvé l'insecte parfait dès le 1<sup>er</sup> mai; je l'ai trouvé aussi sur du bois mort empilé au Parc. Fixin, bois près du chemin de fer, sur du bois coupé dans une coupe en exploitation. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1027. O. SANGUINICOLLIS. *Duft.* Très-rare. Un exemplaire de cet insecte a été trouvé par feu P. *Ormancey*, pharmacien à Lyon, le 4 juin, sur le territoire de la commune de Velars-sur-Onche, sur une haie, entre La Cude et les bois de la combe de Flavignerot. Un second exemplaire a été trouvé à la fin de mai par M. *Tarnier*, à Gevrey, dans les bois de la plaine. (Rouvray; assez rare; en battant les aubépines au moment de la floraison. — M. *Emy*.)





CIS. Latr.

1028. C. BOLETI. *Scop.* Commun. Dans les bolets qui croissent sur le bois mort. Avril à octobre. Dijon, au Parc sur du bois mort empilé; chantiers de bois à brûler au bord du bassin du Canal, dans les bolets qui se trouvent sur les bûches de tremble; fontaine de Larrey, le soir au vol. Plombières, combe de Neuvon, dans des bolets sur une souche de chêne. Combe de Gevrey. Chambolle, au vol le soir et dans les bolets sur les souches de chêne et d'autres arbres. (Rouvray. — M. Emy.)

1029. C. HISPIDUS. *Payk.* Pas rare. Environs de Dijon. Plombières, combe de Neuvon, sous des bolets croissant sur une vieille souche de chêne; 8 avril.

1030. C. BIDENTATUS. *Oliv.* Pas commun. Environs de Dijon.

1031. C. PUNCTULATUS. *Gyll.* Pas commun. Environs de Dijon.

1032. C. FUSCATUS. *Mellié.* Rare. Environs de Chambolle.

1033. C. MINUTUS... (Rouvray; dans les agarics et en battant les haies sèches. — M. Emy.)

ENNEARTHRON. *Mellié.* — CIS. Latr.

1034. E. AFFINE. *Gyll.* Commun. Dans les bolets et sur le bois mort. Mai à octobre. Dijon, au Parc sur du bois mort empilé et au vol près de ce bois. Chambolle, dans les bolets des souches dans les bois. (Rouvray; dans les agarics et en battant les haies sèches. — M. Emy.)

1035. E. FRONTICORNE. *Panz.* (Rouvray; commun dans les lichens des souches. — M. Emy.)

OCTOTEMNUS. *Mellié. — CIs. Latr.*

1036. O. GLABRICULUS. *Gyll.* Pas commun. Environs de Dijon. Gevrey, dans des bolets sur des souches; 26 avril.

DORGATOMA. *Herbst.*

1037. D. DRESDENSIS. *Herbst.* Pas commun. Sur le bois mort. Juillet. Dijon, dans les tilleuls creux au cours du Parc; on l'obtient assez facilement en rapportant chez soi des morceaux de tronc de tilleul pourri; l'insecte en sort les premiers jours de juillet. Fixin, bois près du chemin de fer, au vol le soir près d'une pile de bois dans une coupe en exploitation. (Rouvray; en battant les haies sèches. — M. Emy.)

1038. D. BOVISTE. *Ent. Hefte.* J'ai obtenu cet insecte d'éclosion, du 1<sup>er</sup> au 13 juin; il provenait de *Lycoperdon bovista* que j'avais rapportés l'hiver des bois de Chaignay.

XYLETINUS. *Latr.*

1039. X. PECTINATUS. *F.* (Rouvray; très-rare. — M. Emy.)

1040. X. ATER. *Panz.* Pas commun. Dans les bois en fauchant. Du 21 mai au 24 juillet. Plombières, combe de Neu-von à Darois. Fixin, bois près du chemin de fer. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux.

1041. X. LATICOLLIS. *Sturm.* Un seul exemplaire trouvé sur le mur qui est au-dessus de la gare de Dijon, le 19 mai.

1042. X. HEDERLE. *Dufour.* J'ai obtenu cet insecte d'éclosion; il provenait de lierre mort rapporté du Parc de Dijon; l'insecte est sorti du 13 au 18 juin.

PTILINUS. *Geoffr.*

1043. P. PECTINICORNIS. *Linn.* Rare. Sur le bois mort. Juin. Dijon, au Parc sur du bois mort empilé. (Rouvray; sur les vieux hêtres: 7 juillet. — MM. Emy et Nodot.)





1044. *P. COSTATUS*. *Gyll.* — *FLABELLICORNIS*. *Meg.* Pas rare. Sur le bois mort, surtout sur les vieux saules percés de petits trous. Du 25 mai au 4 juillet. Dijon, bords de l'Ouche et fontaine de Larrey, sur les vieux saules, quelquefois au vol ; au Parc, sur du bois mort. (Rouvray ; sur les vieux hêtres. — *M. Emy.*)

*XYLOPERTHA*. *Guérin.* — *APATE*. *F.*

1045. *X. SINUATA*. *F.* Pas commun. Sur le bois coupé, et au vol le soir près de ce bois. Du 18 mai au 21 juin. Dijon, fontaine de Larrey, le soir au vol. Velars-sur-Ouche, coteau au-dessus de la forge. Gevrey, au vol près de bois équarris vers la gare. Chambolle, au vol le soir près de bois à brûler dans le village, et dans une coupe en exploitation dans le bois. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)

*SINOXYLON*. *Duft.* — *APATE*. *F.*

1046. *S. SEXDENTATUM*. *Oliv.* (Rouvray. — *M. Emy.*)

*BOSTRICHUS*. *F.* — *APATE*. *F.*

1047. *B. CAPUCINUS*. *Linn.* Commun. Sur les arbres abattus, surtout les chênes, dans les bois. Du 21 mai au 19 juin. Dijon, sur des troncs d'orme devant la porte du Parc, bassin du Canal sur des chênes coupés et d'autres arbres. Plombières, sur un noyer coupé sur la route. Crimolois, sur des chênes coupés dans le bois. Marsannay-la-Côte, sur un cerisier abattu et dans la combe sur les chênes. Fixin, bois près du chemin de fer. Chambolle, Saint-Nicolas-les-Cîteaux. (Beaune. — *M. Arias.*) (Rouvray. — *M. Emy.*)





## BOSTRICHI.

PLATYPUS. *Herbst.*

1048. P. CYLINDRUS. *F.* Pas rare. Dans les bois, sur les troncs des gros chênes abattus et sur la souche; on reconnaît sa présence à une poussière jaunâtre formant de petits amas par terre ou sur l'écorce: cette poussière provient d'un trou creusé par l'insecte dans l'écorce épaisse et même dans le bois; en enlevant l'écorce on parvient à l'extraire assez facilement de ce trou. Juillet, septembre, octobre. Dijon, sur des troncs de chêne au bord du bassin du Canal. (Fauverney, à la Bayotte. — M. *Nodot.*) Concœur, bois de Mantuan, sur les souches des gros chênes coupés depuis un an ou deux. (Rouvray. — M. *Emy.*)

La larve se trouve comme l'insecte parfait.

TOMICUS. *Latr.* — BOSTRICHUS. *F.*

1049. T. LARICIS. *F.* Rare. Sur le bois coupé. Environs de Dijon.

1050. T. EUPHORBÆ. *Küster.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1051. T. BISPINUS. *Meg.* Pas rare. Sur le bois coupé et en fauchant. Environs de Dijon. Gevrey, près du petit étang de Satenay. Blaisy-Bas. (Rouvray. — M. *Emy.*)

1052. T. MONOGRAPHUS. *F.* Rare. Sur le bois coupé. Environs de Dijon. (Au vol; mai. — M. *Nodot.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

1053. T. BIDENS. *F.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

1054. T. DACTYLIPERDA. *F.* Commun. Dans les noyaux de vieilles dattes. Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*)

1055. T. BICOLOR. *Herbst.* Pas rare. Dijon, au Parc, au





vol près de bois mort empilé. Mai. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1056. T. *DISPAR*. *Hellwig*. Rare. Sur le bois mort. Chambolle. (L'Etang-Vergy, sur un chêne mort, cinq exemplaires du mâle trouvés par feu M. J. *Saintpère*.) (Rouvray. — M. *Emy*.)

1057. T. *DRYOGRAPHUS*. *Erichs*. Commun. Sur le bois coupé. Environs de Dijon. Chambolle.

1058. T. *SAXESENII*. *Ratz*. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1059. T. *FUSCUS*. *Marsh*. (Rouvray. — M. *Emy*.)

*CRYPHALUS*. *Erichs*. — *BOSTRICHUS*. *F*.

1060. C. *TILLE*. *F*. Rare. Environs de Dijon.

962593

## **HYLESINI.**

*SCOLYTUS*. *Geoffr*.

1061. S. *DESTRUCTOR*. *Oliv*. Commun. Sur les arbres morts, principalement les ormes, sous leurs écorces et au vol. Mai, juin, octobre. Dijon, au Parc sur du bois d'orme coupé. L'Etang-Vergy, sous l'écorce d'un poirier mort; 20 octobre. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1062. S. *PYGMÆUS*. *F*. Commun. Sur le bois coupé. Mai. Dijon, au Parc sur du bois d'orme coupé, chantiers au bord du bassin du Canal. Fixin, bois près du chemin de fer, sur les piles de bois, dans une coupe en exploitation. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune; en fauchant le long de la rivière; 7 juillet. — M. *Bourlier*.)

1063. S. *INTRICATUS*. *Koch*. (Beaune; sur le bois de chauffage; été. — M. *Arias*.)

PHLOIOTRIBUS. *Latr.*

1064. *P. OLEÆ. F.* Un seul exemplaire trouvé à Chambolle, dans un jardin, sur un jeune châtaignier.

HYLESINUS. *F.*

1065. *H. VARIUS. F.* — *FRAXINI. F.* Très-commun. Sur le tronc des frênes et au vol près de ces arbres, sur le bois mort. Du 5 avril au 9 mai. Dijon, cours du Parc, au vol au bord des fossés et sur le tronc des frênes, au premier printemps, lorsqu'il fait un temps chaud et serein ; sur du bois empilé, dans l'intérieur du Parc ; sur la barrière au-dessus du débarcadère du chemin de fer de Paris à Lyon, et sur celle du chemin de fer de Besançon, près de la Colombière. (Beaune ; sur le bois de chauffage ; été. — *M. Arias*. En fauchant au bord d'un chemin ; 1<sup>er</sup> juin. — *M. Bourlier*.) (Rouvray. — *M. Emy*.)

1066. *H. VITTATUS. F.* Commun. Dijon, au Parc, au vol, autour de bois coupé empilé. Du 8 mai au 4 juin. (Rouvray. — *M. Emy*.)

HYLURGUS. *Erichs.*

1067. *H. PINIPERDA. Linn.* Un seul exemplaire trouvé à Dijon le soir, le 2 juin, encore vivant, collé sur la peinture récente de l'écluse du Canal, près de Larrey.

HYLASTES. *Erichs.* — *HYLURGUS. Latr.*

1068. *H. PALLIATUS. Gyll.* (Rouvray. — *M. Emy*.)


1069. *H. ANGUSTATUS. Herbst.* Je n'ai trouvé que deux exemplaires de cet insecte, à Dijon, sur la barrière au-dessus du débarcadère du chemin de fer et sur un mur voisin, le 24 avril.

1070. *H. TRIFOLI. Müll.* Commun. Dans les bois, en fau-





chant. Mai, juin. Marsannay-la-Côte. Plombières, combe de Neuvon, sous une pierre. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Beaune. — M. André. En fauchant sur les herbes des fosses le long des chemins. — M. Bourlier.)



## CURCULIONES.

RHYNCOLUS. Creutz.

1071. R. CHLOROPUS. *F.* Trouvé une seule fois, au nombre de plusieurs exemplaires, dans du bois pourri sec au pied d'un chêne, le 23 septembre, à Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans la forêt de Cîteaux.

1072. R. CULINARIS. *Reich.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1073. R. TRUNCORUM. *Schüpp.* — CULINARIS. *Sturm.* Pas rare. Sur les troncs creux des arbres et dans l'intérieur du bois pourri. Avril, mai, juin. Dijon, dans les tilleuls creux du cours du Parc et de l'Allée-de-la-Retraite; au Parc sur du bois mort empilé, dans les arbres creux, et sous des écorces d'orme en février; bord de l'Ouche derrière le Parc, dans des saules creux, fin mars. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans du bois pourri sec au pied d'un chêne, dans la forêt de Cîteaux, 23 septembre. (Rouvray; juin; dans la poussière au pied des hêtres. — M. Emy.)

1074. R. CYLINDRIROSTRIS. *Oliv.* Pas commun. Dijon, intérieur du Parc, sur un tronc de tilleul abattu, avril. (Rouvray. — M. Emy.)

1075. R. REFLEXUS. *Sch.* Rare. Dijon, cours du Parc, sur un banc; 30 juin.

1076. R. PUNCTATULUS. *Ziegl.* Assez commun. Sur les troncs creux des tilleuls et dans l'intérieur du bois pourri de



ces arbres. Printemps, été. Dijon, cours du Parc et Allée-de-la-Retraite; chemin de Ruffey, dans un tronc de noyer; route de Langres. (Beaune, en fauchant l'été. — M. *Arias*.)

COSSONUS. — *Clairv.*

1077. C. CYLINDRICUS. *Dej.* Se trouve assez rarement, mais lorsqu'on le rencontre c'est ordinairement en assez grande quantité. Dans le bois pourri des saules et des peupliers sur pied ou abattus; lorsqu'il fait chaud, il se promène sur ce bois. Avril, mai, juin. Dijon, bord de l'Ouche; intérieur du Parc. Quetigny. Etc. (Beaune. — M. *Arias*.)

1078. C. FERRUGINEUS. *Clairv.* Se trouve comme le précédent et presque toujours en société avec lui. Mêmes époques d'apparition et mêmes localités.

SITOPHILUS. *Sch.* — CALANDRA. *F.*

1079. S. GRANARIUS. *Linn.* Beaucoup trop commun malheureusement. Se trouve partout où l'on conserve du blé; la larve vit dans l'intérieur des grains; l'insecte parfait se trouve au printemps et en été dans l'intérieur des greniers et des bâtiments où l'on dépose du blé battu, et aussi sur les murs extérieurs.

1080. S. ORYZÆ. *Linn.* Se trouve aussi dans les magasins où l'on entrepose du blé; il se trouve également dans le riz, chez les marchands. Je l'ai trouvé assez communément en juin et juillet 1856, à Dijon, sur les murs de la première maison à droite du nouveau chemin établi par M. Menvalle, depuis la route de Plombières au Canal. (Beaune: en fauchant le long de la rivière. — M. *Bourlier*.)

SPHENOPHORUS. *Sch.* — CALANDRA. *F.*

1081. S. ABBREVIATUS. *F.* Pas rare. Au bord des routes et des chemins, quelquefois sous les pierres en hiver. Avril.





mai. Dijon, par terre, au bord des grandes routes de Lyon, Langres, etc., et des chemins d'Ahuy, Fontaine et autres; Combe-aux-Serpents. (Rouvray, pas commun. — M. Emy.) (Beaune. — M. Arias.)

· NANOPHYTES. Sch.

1082. N. HEMISPHERICUS. *Oliv.* Pas très-rare. Fin juin à octobre. Villenote, près Semur, en fauchant et en battant les branches, le long des fossés au nord et à l'ouest du bois de Champeaux; Collonges-les-Premières, sur la lisière du Bois-le-Duc, en fauchant. Villers-les-Pots, au bord d'un fossé dans le bois des Vernes. (Saint-Nicolas-les-Cîteaux; forêt de Cîteaux, 17 mai. — M. Bourlier.)

1083. N. LYTHRI. *F.* Commun. Dans les bois humides, surtout près des ruisseaux et des fossés, en fauchant, principalement sur le *Lythrum salicaria*. Mai, juin, juillet, septembre. Dijon, trouvé quelquefois, en fauchant le soir, sur les herbes au bord de la fontaine de Larrey. Plombières, combe de Neuvo à Darois. Flavignerot, dans la combe. Crimolois. Collonges-les-Premières. Villers-les-Pots. La Rochette, près Oisilly, au bord de la Vingeanne. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bois de la plaine. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. Villenote, près Semur. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

J'ai trouvé en juillet une variété noire de cette espèce à Magny-sur-Tille et à Collonges-les-Premières. M. Bourlier l'a également rencontrée dans le bois de Lépenot, à Serigny.

1084. N. GLOBULUS. *Germ.* Très-rare. Villenote, près Semur, bord du bois de Champeaux. Collonges-les-Premières, sur la lisière du Bois-le-Duc; 12 juillet.

MECINUS. *Germ.*

1085. M. PYRASTER. *Herbst.* — HÆMORRHOIDALIS. *F.* Pas rare. En fauchant au bord des chemins et surtout dans les

bois. Mai à septembre. Environs de Dijon. Dijon, dans la ville sur un mur; avril. La Rochette, près Oisilly, en fauchant dans les prés. (Pontailler; sous des écorces de pommier; septembre. — M. *Dudrumel.*) (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier, André et Pérugallo.*)

1086. M. CIRCULATUS. *Marsh.* — LIMBATUS. *Dej.* Pas rare. En fauchant dans les bois ombragés. Mai, juin, juillet. Dijon, au Parc sur les fleurs d'*Anthriscus sylvestris*; trouvé une fois sous une écorce de platane, en décembre. Plombières, combes de Neuvon à Darois et de Neuvon à Prenoïs. Fixin, bois près du chemin de fer. (Beaune; pas commun. — M. *Arias.*)

GYMNÆTRON. *Sch.*

1087. G. BICOLOR. *Sch.* Pas commun. Environs de Dijon. Plombières, combes de Neuvon, en fauchant sur l'herbe au bord des chemins et sur la lisière des bois. Juin, juillet. (Rouvray. — M. *Emy.*)

1088. G. VILLOSELUS. *Sch.* Variété DORSALIS. *Oliv.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune; juin. — M. *Bourlier.*)

1089. G. VERONICE. *Germ.* Pas rare. Sur la *Veronica beccabunga* dans les lieux humides. Mai, juin, juillet. Plombières, combe de Neuvon à Prenoïs, en fauchant. Villenote, près Semur, dans les ruisseaux et les fossés sur les fleurs de *Veronica beccabunga*. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, sur la même plante en fleur. (Beaune. — M. *Pérugallo.*)

1090. G. BECCABUNGÆ. *F.* (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

1091. G. LABILIS. *Herbst.* Pas commun. En fauchant au bord des chemins, surtout au bord des bois sur les plantains fleuris. Juin, juillet. Flavignerot. Plombières, combe de Neuvon. Magny-sur-Tille, bord du bois de Malforêt. Fixin, bois près du chemin de fer. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)



Echaljé; et près de la Fontaine-aux-Fées sur l'*Erysimum lanceolatum*. Marsannay-la-Côte, dans la combe.

1099. G. LINARIÆ. *Panz.* Pas commun. Sur la *Linaria striata*; dans les lieux secs. Fin juin, commencement de juillet. Dijon, derrière les Argentières; chemin de Talant, près de la promenade Lucan; chemin de Larrey à la montagne. Plombières, combe de Neuvon. (Beaune; en fauchant le long des chemins; 1<sup>er</sup> juin. — M. Bourlier.)

1100. G. GRAMINIS. *Gyll.* Assez commun. En fauchant dans les bois. Juin, juillet, août. Plombières, combe de Neuvon, sur la *Campanula persicifolia*, bois près du Crucifix sur le *Geranium sanguineum*. Etc. (Beaune. — M. Bourlier.)

1101. G. PLANTARUM. *Dej.* Commun. En fauchant, sur les plantes au bord des chemins, surtout dans les bois. Mai à juillet, 3 août. Dijon, dans la ville sur un mur; chemin de Talant, près la promenade Lucan, sur l'*Echium vulgare*. Plombières, combe de Neuvon, en fauchant, et sur la *Stellaria holostea*. Marsannay-la-Côte. Flavignerot. Fixin, bois près du chemin de fer. (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1102. G. CAMPANULÆ. *Linn.* Commun. Dans les bois, en fauchant, et sur différentes plantes, notamment au fond des corolles de la *Campanula rotundifolia*. Fin avril à juillet. Plombières, bois près du Crucifix, sur le *Geranium sanguineum*; combe de Neuvon, sur la *Campanula rotundifolia*, la *Vicia sepium* et sur un *Geranium*. Flavignerot. Marsannay-la-Côte, près du parc de Gouville, sur les chênes. Chambolle. (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1103. G. HERBARUM. *Dej. Cat.* D'après M. Chevolat. Rare. Environs de Dijon.

#### CIONUS. *Clairv.*

1104. G. SCROPHULARIÆ. *Linn.* Très-commun. Sur les *Verbascum* et les *Scrophularia*, principalement les *Scrophularia aquatica*, *nodoso* et *canina*. Fin mai, juin, juillet. Dijon,







Jardin botanique ; fontaine de Larrey ; chemin de Corcelles-les-Monts ; chemin de Talant ; bord du ruisseau qui sort du clos de Pouilly vers le petit chemin de Ruffey. Fixin, bois près du chemin de fer. Blaisy-Bas. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1105. C. VERBASCI. *F.* Commun. Sur les *Scrophularia*, principalement dans les bois ou les lieux humides. Fin mai, juin, juillet. Dijon, Vieux-Suzon, sur un *Carduus nutans* ; près vers le petit chemin de Ruffey, au bord du ruisseau. Plombières, combes de Neuvon ; bois près du Crucifix. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. Colonges-les-Premières. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1106. C. OLIVIERI. *Chevr.* Pas rare. Sur différentes espèces de *Verbascum* ; dans les endroits secs et découverts. Juin, juillet. Dijon, Vieux-Suzon ; chemin de Corcelles-les-Monts ; Talant, près de la Fontaine-aux-Fées et dans un petit vallon qui conduit à la route de Plombières. Fontaine, sur la grande friche à l'ouest du village. Plombières, au bord de la route en allant au Crucifix. Corcelles-les-Monts, Combeaux-Serpents. Gevrey, bois de Château-Renard. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. André et Bourlier ; sur les *Verbascum lychnitis* et *blattaria* ; très-commun ; printemps, été. — M. Arias.)

1107. C. THAPSUS. *F.* Rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune ; sur le *Verbascum thapsus* ; été. — M. Arias.)

1108. C. HORTULANUS. *Marsh.* Très-commun. Sur les *Verbascum* et les *Scrophularia*. Juin, juillet, commencement d'août. Dijon, Jardin botanique ; chemin de Talant ; etc. Plombières, combe de Neuvon et bois à gauche de la grande route. Talant, près de la mare à l'ouest du village. Fixin, bois près du chemin de fer. (Beaune. — M. Bourlier, André et Pérégallo.)

1109. C. CLAIRVILLEI. *Sch.* Deux exemplaires; environs de Dijon.

1110. C. OLENS. *F.* Rare. Sur les *Verbascum*; dans les endroits secs. Juin. Dijon, chemin de Talant. Corcelles-les-Monts, Combe-aux-Serpents. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias et Bourlier.)

1111. C. BLATTARIE. *F.* Commun. Sur plusieurs espèces de *Scrophularia*; dans les lieux secs et dans les bois, quelquefois sur les campanules et en fauchant. Mai, juin. Dijon, Jardin botanique, sur la *Scrophularia nodosa*; chemin de Corcelles, au-dessus de la montée, sur la *Scrophularia canina*. Plombières, combe de Neuvon. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. Bourlier.)

1112. C. FRAXINI. *De Gêr.* Pas très-commun. Dans les bois, en fauchant et sur les rejets de frêne. Mai, juin, juillet. Dijon, sur la barrière au-dessus du débarcadère et sous des feuilles sèches au bas du mur au nord du clos de Pouilly; avril. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Gevrey, dans la combe. (Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. — M. Bourlier.)

1113. C. PULCHELLUS. *Herbst.* Pas rare. Juin. Fixin, bois près du chemin de fer, dans un jeune taillis, sur une espèce de *Scrophularia* et en fauchant. (Rouvray; rare. M. Emy.)

1114. C. SOLANI. *F.* (Rouvray; rare; sur les *Verbascum*. — M. Emy.)

#### OROBITIS. *Germ.*

1115. O. CYANEUS. *Linn.* — GLOBOSUS. *F.* Pas commun. Dans les bois, par terre, et en fauchant; surtout dans les endroits où se trouve de la violette, du 20 avril au 2 août. Dijon, Combe-aux-Serpents. Plombières, combes de Neuvon, en fauchant et sur une tige de violette. Flavignerot. Marsannay-la-Côte, bois près de Gouville. Fixin, bois près du chemin de fer. Carley, bois des Liards, sur des plateaux de





hêtre. (Rouvray; très-rare. — M. Emy.) (Serrigny; bois de Lépenot. — M. Bourlier.)

RHYTIDOSOMUS. Sch. — CEUTORHYNCHUS. Schüpp.

1116. R. GLOBULUS. *Herbst*. Pas commun. Dans les bois humides en fauchant. Mai, juin, juillet. Fixin, bois près du chemin de fer. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. (Serrigny; bois de Lépenot. — M. Bourlier.)

TAPINOTUS. Sch. — CEUTORHYNCHUS. Schüpp.

1117. T. SELLATUS. *F*. Un seul exemplaire de ce bel insecte a été trouvé le 29 juin 1857, par M. Arthur Grasset, à Bagnot, en fauchant près d'un étang en culture, aux abords de la forêt de Cîteaux, à 2 kilomètres environ du village.

POOPHAGUS. Sch. — CEUTORHYNCHUS. Schüpp.

1118. P. SISYMBRII. *F*. J'ai trouvé seulement une douzaine environ d'exemplaires de cette espèce les 16 et 17 avril, sur des tiges de *Nasturtium* (*Sisymbrium*) *amphibium* qui croissaient dans de l'eau stagnante au fond d'une sablière, près du chemin de la rente de Morvau. (Rouvray, au commencement de juillet, dans les herbes au bord du Serein. — M. Emy.) (Beaune. — M. Bourlier.)

1119. P. NASTURII. *Spence*. Trouvé une seule fois, au nombre de quelques exemplaires, le 2 juillet, sur des fleurs de *Nasturtium officinale* croissant dans les parties stagnantes du ruisseau qui est au sud du village de Blaisy-Bas.

RHINONCUS. Sch. — CAMPYLIRHYNCHUS. Meg.

1120. R. INCONSPECTUS. *Herbst*. Pas rare. En fauchant dans les endroits humides. Juin, juillet. Plombières, combe de Neuvon. Gevrey, bords du petit étang de Sateuay.

1121. R. BRUCHOIDES. *Herbst*. Pas commun. En fauchant

dans les lieux humides. Mai, juin, juillet. La Rochette, près Oisilly, dans les prés au bord de la Vingeanne. Collonges-les-Premières. Gevrey, au bord du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Citeaux, forêt de Citeaux. (Beaune. — M. André.)

1122. R. PERIGARPIUS. *F.* Pas rare. Endroits humides. Mai à juillet. Blaisy-Bas, en fauchant dans le bois. La Rochette, près Oisilly, dans les prés le long de la Vingeanne; commun. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sous les aulnes, à l'ombre. (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1123. R. GUTTAIS. *Grav.* Pas commun. Environs de Dijon. Dijon, au vol, au Parc, le 12 avril. (Beaune, mai, juin; en fauchant sur des blés, sur l'herbe le long des chemins, et dans le bois de Battaut. — M. Bourlier.)

1124. R. GRANULIPENNIS. *Chev.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

CEUTORHYNCHUS. *Schüpp.*

1125. C. MACULA-ALBA. *Herbst.* Pas commun. Environs de Dijon. (Beaune, en fauchant au bord des chemins: 1<sup>er</sup> juin. — M. Bourlier.)

1126. C. SUTURALIS. *F.* Rare. En fauchant dans les bois. Juin. Flavignerot, dans la combe.

1127. C. SYRITES. *Germ.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1128. C. ASSIMILIS. *Payk.* Très-commun. Sur les crucifères, principalement sur les fleurs et les tiges des colzas et navettes, dans les champs cultivés; dans les bois, sur les places à charbon où l'on cultive des moutardes, et en fauchant. Avril à juillet. Dijon. Plombières, combe de Neuven. Flavignerot. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant et sous les détritus. Collonges-les-Premières. Villenote, près Semur, bord du







bois de Champeaux ; septembre. (Rouvray, battue des haies vives, chemin au-dessus de l'étang de Bussières. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1129. C. ERYSIMI. F. Rare. En fauchant dans les bois. Juin, juillet. Flavignerot, dans la combe. Plombières, combe de Neuvon à Darois. (Rouvray; rare. — M. Emy.) (Beaune. — M. André.)

1130. C. CHLOROPHANUS. Rouget (1). Commun. Sur l'*Erysimum lanceolatum*, surtout avant la floraison, dans le voisinage des carrières et dans les chemins pierreux. Du 3 mai au 13 juillet. Dijon, vers la limite ouest du territoire de la commune, près de Talant, et autour de ce village surtout au sud et à l'ouest.

1131. C. RUBESCENS. Sch. Rare. Environs de Dijon. (Beaune, en fauchant; été; pas commun. — M. Arias.)

1132. C. CÆRULESCENS. Dej. (Dijon; fossés du cours du Parc, en fauchant; 25 juin. — M. Nodot.) (Rouvray, très-rare. — M. Emy.)

1133. C. CONTRACTUS. Marsh. Commun. En fauchant, sur-

(1) J'ai envoyé, il y a quelque temps, à la Société entomologique, la description de cette espèce que je n'ai vue décrite dans aucun auteur et qui était inconnue aux entomologistes parisiens que j'ai consultés, notamment MM. Aubé, Chevrolat, Reiche, Fairmaire et Jekel, auxquels j'en ai donné plusieurs exemplaires.

Ma description ne devant paraître que dans le 4<sup>e</sup> cahier de l'année 1857 des *Annales de la Société entomologique de France*, cahier qui n'a pas encore été publié, je crois utile de donner ici la diagnose qui accompagne cette description.

*Breviter ovatus; parce albido-squamulosus; viridi cærulescens, rostro, antennis tarsisque nigris; antennarum funiculo longiori. 7-articulato; pronoto profunde punctato, tuberculo subtransverso utrinque instructo, medio baseos leviter impresso; elytris profunde striato-punctatis, punctis striarum squamula albida ocellatis, interstitiis rugulosis.*

(Long. 0,<sup>m</sup>0022-0<sup>m</sup>,0025. — Lat. 0<sup>m</sup>,0012-0<sup>m</sup>,0014.)

Cette espèce se distingue facilement du *C. Erysimi* par la couleur de la tête, du prothorax et de l'abdomen, qui n'est jamais noire; par la longueur du funicule, des antennes, et surtout par la forme de ses squamules.

tout dans les bois. Avril à octobre. Talant, près des tunnels du chemin de fer, sur l'*Erysimum lanceolatum*. Marsannay-la-Côte, près de Gouville. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, près du petit étang de Satenay. Plombières, combes de Neuvon, en fauchant et sur des crucifères dans les places à charbon (*Sinapis nigra*). Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Blaisy-Bas. Villenote, près Semur, au bord du bois de Champeaux. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*. Serrigny, bois de Lépenot. — M. *Bourlier*.)

1134. C. ATRATULUS. *Gyll*. Pas rare. En fauchant dans les bois. Juin, juillet. Plombières, combe de Neuvon. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune et hameau de Gigny, en fauchant le long des chemins. — M. *Bourlier*.)

1135. C. COCHLEARIA. *Gyll*. (Beaune, très-commun sur les cochléaires; printemps et été. — M. *Arias*.)

1136. C. NANUS. *Besser*. Commun. En fauchant dans les bois. Mai, juin, juillet. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte.

1137. C. ERICA. *Gyll*. Très-commun dans les lieux où croît la bruyère (*Calluna vulgaris*), en fauchant sur cette plante. Soirans, au bas de l'étang Noiroit, près du chemin de fer de Besançon; juillet. (Rouvray, très-commun. — M. *Emy*.)

1138. C. ECHIUM. *F*. Pas rare. Sur l'*Echium vulgare* au bord des chemins. Juin. Dijon, sur les chemins autour de la ville. Trouvé un exemplaire en septembre au Jardin botanique, sur la *Nicandra physalodes*, plante exotique; (fossés du cours du Parc. — M. *Nodot*.) (Fontaine de Larrey. — M. *Tarnier*.) Plombières, combe de Neuvon; trouvé sur le viaduc de Neuvon le 23 octobre. Velars-sur-Ouche, sur le chemin qui conduit de La Cude à la combe de Flavignerot. (Rouvray, commun. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1139. C. HORRIDUS. *F*. pas commun. Sur les chardons.





Fin juin, commencement de juillet. Dijon, Vieux-Suzon, sur le *Cirsium lanceolatum*. (Mirande, près de la ferme de Cromois. — M. *Dudrumel*.) Chambolle, dans la combe sur un chardon.

1140. C. VIDUATUS. *Gyll.* Pas rare. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant. Juillet.

1141. C. RAPHANI. *F.* Pas commun. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant. Mai à juillet. Se trouve, je crois, sur le *Symphytum officinale*.

1142. C. BORRAGINIS. *F.* (Rouvray; rare. — M. *Emy*.)

1143. C. CRUCIFER. *Oliv.* — CRUCIGER. *Sturm.* Assez rare; au bord des chemins sur le *Cynoglossum officinale*. Dijon, chemin de Talant; chemin de la Fontaine-aux-Fées. Talant, entre le village et le chemin de fer, surtout dans un petit vallon qui conduit près du moulin Vesson. Trouvé aussi le 22 avril près de Dijon, sous des pierres, vers la ferme de Pouilly. (Dijon, derrière le Parc, du côté de Longvic, en fauchant sur les lithymales; 25 juin. — M. *Nodot*.)

1144. C. LITURA. *F.* Un seul exemplaire trouvé par M. *Dudrumel*, le 10 juin 1855, à Gevrey, en fauchant au bord du petit étang de Satenay. Je ne suis pas sûr du nom de cette espèce, qui pourrait bien être nouvelle.

1145. C. TRIMACULATUS. *F.* Assez commun. Sur les charbons. Juin, juillet. Dijon, Vieux-Suzon, sur le *Cirsium lanceolatum*; Allée-de-la-Retraite, sur le *Carduus nutans*; chemin de Talant, sur cette dernière plante. Talant, sur les chemins autour du clos Echalié, sur le même chardon. (Rouvray; assez rare. — M. *Emy*.)

1146. C. ALBOSIGNATUS. *Dahl.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Rouvray, commun. — M. *Emy*.) (1).

---

(1) M. *Emy* l'indique sous le nom de *Albonotatus*; ne trouvant pas, dans les auteurs et sur les catalogues, d'espèce portant ce nom, je le fais figurer ici dans la supposition d'une erreur de la part de M. *Emy*.

(Beaune; deux exemplaires pris le 26 mai, en fauchant, sur des blés et des luzernes. — M. *Bourlier*.)

1147. C. ASPERIFOLIARUM. *Kirby*. Pas rare. En fauchant dans les bois couverts. Mai, juin, juillet. Dijon; se trouve quelquefois au Jardin botanique, sur plusieurs espèces de *Symphytum*. Plombières, combes de Neuvon. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Serrigny, bois de Lépenot. — M. *Bourlier*.)

1148. C. URTICÆ. *Walton*. Rare. En fauchant dans les bois. Juin. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Gevrey, bois d'aulnes, près du petit étang de Satenay.

1149. C. SIGNATUS. *Dahl*. Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1150. C. CAMPESTRIS. *Ziegl*. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1151. C. CHRYSANTHEMI. *Germ*. Pas rare. En fauchant dans les bois. Fixin, bois près du chemin de fer; etc. Été. (Beaune. — M. *Bourlier*.) (Savigny, près Beaune, Fontaine-Froide. — MM. *Arias*, *Péragallo* et *André*.)

1152. C. RUGULOSUS. *Herbst*. Très-rare. Environs de Dijon. Dijon; trouvé un exemplaire le 4 avril sur le parapet de la route au-dessus du Jardin botanique. (Villenote, près Semur; bord du bois de Champeaux. Octobre. — M. *Lombard*.)

1153. C. OCCULTUS. *Sch*. Pas rare. En fauchant dans les bois humides. Mai à juillet, septembre. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, dans le bois d'aulnes. Collonges-les-Premières. Villers-les-Pots. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux.

1154. C. MELANOSTICTUS. *Marsh*. Pas commun. Gevrey, en fauchant au bord du petit étang de Satenay. Juillet.

1155. C. LYCOPI. *Chevr*. Pas commun. Blaisy-Bas, en fauchant dans le bois; 2 juillet. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay; juin. (Beaune. — M. *Bourlier*.)

1156. C. QUADRIDENS. *Panz*. Pas commun. Mars, avril. Dijon, au vol dans la ville; au Parc, sur du bois coupé







empilé; cours du Parc, au vol; barrière au-dessus de la gare. Plombières, combe de Neuvon à Prenois, sur une crucifère, probablement une navette, près de la fontaine. (Beaune. — M. André.)

1157. C. MARGINATUS. *Payk.* Pas commun. Dans les bois en fauchant. Juin, juillet. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot. (Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux; mai. — M. Bourlier.) (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1158. C. PUNCTIGER. *Meg.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1159. C. PILOSELLUS. *Sch.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1160. C. DENTICULATUS. *Schrank.* — IOTA. *Dej.* Assez rare. En fauchant dans les bois. Juin. Plombières, combe de Neuvon à Darois. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. André et Péragallo.)

1161. C. POLLINARIUS. *Chevr.* — GLAUCINUS. *Dej.* (Rouvray. — M. Emy.)

1162. C. PICITARSIS. *Stéven.* Commun. En fauchant dans les bois. Juin. Talant, sur l'*Erysimum lanceolatum*. Plombières, combe de Neuvon. Etc.

1163. C. SULCICOLLIS. *Gyll.* Commun. En fauchant dans les bois. Avril à septembre. Dijon, barrière au-dessus de la gare. Talant, sur l'*Erysimum lanceolatum*. Plombières, combes de Neuvon. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant et sous les détritrus. Blaisy-Bas. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André.) (Serrigny, bois de Lépenot. — M. Bourlier.)

1164. C. RAPÆ. *Gyll.* Pas commun. En fauchant dans les bois. Environs de Dijon.

1165. C. ROBERTI. *Chevrolat. Inédit.* D'après M. Chevrolat. Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1166. C. NAPI. *Koch*. Pas commun. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1167. C. CHALYBÆUS. *Germ*. Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1168. C. HIRTULUS. *Schüpp*. Pas commun. En fauchant dans les bois. Juin. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. (Beaune, en fauchant le long des chemins. — M. *Bourlier*.)

1169. C. TROGLODYTES. *F*. Commun. Dans les prés et les bois en fauchant. Mai à juillet. Dijon, près du bord de l'Ouche; mai; petit chemin du côté de Chenôve, sur un plantain. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. La Rochette, près Oisilly, près le long de la Vingeanne. (Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. — M. *Bourlier*.) (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier*, *Arias* et *André*.) (Serrigny, bois de Lépenot. Beaune, hameau de Gigny. — M. *Bourlier*.)

1170. C. INTERSTINCTUS. *Sch*. Pas commun. En fauchant dans les bois. Juin. Flavignerot, dans la combe. Soirans-Fouffrans, au bas de l'étang Noiroto, à l'angle près du chemin de fer de Besançon, en fauchant sur la bruyère (*Calluna vulgaris*); juillet.

1171. C. PLANTAGINIS... (Rouvray. — M. *Emy*.)

1172. C. CALANDRA... (Rouvray. — M. *Emy*.)

CEUTORHYNCHIDIUS. *Jacq. Duv.* — CEUTORHYNCHUS. *Auctorum*.

1173. C. DEPRESSICOLLIS. *Gyll*. Rare. Environs de Dijon.

1174. C. APICALIS. *Gyll*. Deux exemplaires. L'un, je crois, dans la combe de Neuvon à Darois, en juin ou juillet; l'autre exemplaire à Magny-sur-Tille, dans le bois de Malforêt, le 3 juillet.

1175. C. TERMINATUS. *Herbst*. Commun. Dans les bois ombragés, en fauchant. Juin, juillet. Plombières, combes de Neuvon. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Saint-





Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. (Serrigny, bois de Lépenot. — M. *Bourlier*.)

1176. C. ASPERULUS. *Sch.* Pas commun. Dijon, sur un mur dans la ville, 4 avril. Plombières, combe de Neuvon à Darois; juin. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Péragallo* et *André*.)

1177. C. FLORALIS. *Payk.* Commun. En fauchant, surtout dans les bois. Mai, juin, juillet. Talant, sur l'*Erysimum lanceolatum*. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Flavignerot. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. La Rochette, près Oisilly, sur les prés au bord de la Vingeanne. (Beaune, en fauchant sur les blés, les luzernes et les plantes dans les fossés qui bordent les chemins. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1178. C. GLAUCUS. *Sch.* Trouvé abondamment, le 2 juillet, à Blaisy-Bas, sur les fleurs de *Nasturtium officinale*, dans les parties stagnantes du ruisseau au midi du village.

1179. C. QUERCIGOLA. *F.* Un seul exempl. Envir. de Dijon.

ACALLES. *Sch.*

1180. A. AUBEI. *Sch.* Rare. Dans les bois, en battant les fagots. Mai, juin. Flavignerot. Corcelles-les-Monts, Mont-Afrique. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1181. A. HYPOCRITA. *Creutz.* Rare. Sur le bois mort et en battant les fagots. Mai. Corcelles-les-Monts, Mont-Afrique, en battant les fagots. (L'Etang-Vergy, sous des écorces de charmes morts; septembre. — M. *J. Saintpère*.) (Rouvray; commun; battue des haies sèches et vives. — M. *Emy*) (Beaune. — M. *André*.)

1182. A. ABSTERSUS. *Sch.* Rare. Dans les bois, en battant les fagots. Mai. Corcelles-les-Monts, Mont-Afrique.

1183. A. NAVIERESII. *Chevr.* Rare. Dans les bois en battant les fagots, etc. Mai. Corcelles-les-Monts, Mont-Afrique. (Plombières, combe de Neuvon, au bas du tronc d'un chêne; 1<sup>er</sup> novembre. — M. *Dudrumet*.) (Rouvray; pas rare, battue des haies sèches. — M. *Emy*.)

1184. A. TURBATUS. *Sch.* — PTINOIDES. *Sch.* Pas commun. Sous les écorces. Janvier, ~~mars~~, avril, octobre, novembre. Dijon, au Parc sous les écorces de charmes et de platanes morts, trouvé aussi sous une pierre. Villenote, près Semur, bois de Champeaux, en fauchant. (Rouvray; très-commun; battue des haies sèches. — M. *Emy.*)

1185. A. BIPUSTULATUS. *Solier.* (Rouvray; pas très-rare; battue des haies sèches. — M. *Emy.*)

MONONYCHUS. *Schüpp.*

1186. M. PSEUDACORI. *F.* Très-commun. Sur l'*Iris pseudacorus*. Du 17 mai au commencement de juillet. Dijon, au Parc en fauchant sur les *Anthriscus sylvestris*, un seul exemplaire. Marsannay-la-Côte, dans la combe, en fauchant, un exemplaire. Gevrey, bord des ruisseaux près des étangs de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias* et *Péragallo.*)

1187. M. SALVÆ. *Hoffm.* Cette espèce, que plusieurs entomologistes considèrent comme une simple variété de la précédente, se trouve, comme celle-ci, sur l'*Iris pseudacorus*, en juin et au commencement de juillet, au bord des étangs de Satenay, mais elle n'est pas commune. (Beaune; pas rare; sur les sauges. — M. *Arias.*)

COELIODES. *Sch.* — CEUTORHYNCHUS. *Schüpp.*

1188. C. QUERCUS. *F.* Commun. Dans les bois, sur les pousses de chêne dans les coupes d'un ou deux ans. Fin avril, mai, juin, juillet, septembre. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Fixin. Gevrey. Chambolle. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. Collonges-les-Prémières. Villenote, près Semur. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)







1189. C. RUBER. *Marsh.* Commun. Dans les bois sur les pousses de chêne. Mai, juin, commencement de juillet. Plombières, combes de Neuvon. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. Chambolle. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*)

1190. C. RUBICUNDUS. *Payk.* (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune; deux exemplaires. — M. *André.*)

1191. C. EPILOBII. *Payk.* Rare. Sur l'*Epilobium spicatum*. Collonges-les-Premières. Fin juin, commencement de juillet.

1192. C. GUTTULA. *F.* (Beaune; rare. — M. *Arias.*)

1193. C. FULIGINOSUS. *Marsh.* Pas rare. Avril, mai, juin. Dijon, sur les murs dans la ville. Plombières, combe de Neuvon, en fauchant. (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*)

1194. C. SUBRUFUS. *Herbst.* Pas commun. Dans les bois. Juin. Environs de Dijon. Collonges-les-Premières. (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*)

1195. C. DIDYMUS. *F.* Très-commun. Sur l'ortie dioïque, *Urtica dioica*, au bord des chemins. Fin mai, juin, juillet. Dijon, chemins de Talant, de Daix, etc. Plombières, combes de Neuvon, en fauchant. Blaisy-Bas. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

1196. C. PUNCTULUM. *Germ.* Rare. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant; fin juillet, commencement d'août.

1197. C. GERANII. *Payk.* Pas commun. En fauchant dans les bois, surtout sur le *Geranium sanguineum*. Juin, commencement de juillet. Plombières, combes de Neuvon; bois près du Crucifix. Chambolle. Etc. (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

1198. C. EXIGUUS. *Oliv.* Rare. Sur les *Geranium* à petites fleurs, notamment les *G. pusillum*, *rotundifolium* et *dissectum*. Juin, juillet. Dijon, au bord des chemins de Talant, Daix, Fontaine, etc., sur les talus, au pied des murs et des haies. (Beaune. — M. *Arias.*)

CRYPTORHYNCHUS. *Illig.*

1199. C. LAPATHI. *Linn.* Commun. Sur les peupliers. Mai. Dijon, le long de Suzon au bas du chemin couvert entre la porte Neuve et la porte Saint-Nicolas; à droite du chemin d'Ahuy; bord de l'Ouche entre le Parc et Longvic; sur des peupliers coupés au bord du Canal; barrière au-dessus de la gare; au Parc sur du bois coupé; près du moulin Vesson, sous une pierre, 4 novembre. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant; avril. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant; juillet. (Rouvray; rare. — M. Emy.) (Beaune. — M. Bourlier.)

BARIDIUS. *Sch.* — *BARIS.* *Germ.*

1200. B. PICINUS. *Germ.* Pas rare. Sur l'*Erysimum lanceolatum*. Mai, juin. Dijon, barrière au-dessus de la gare et parapet du Jardin botanique, avril. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées et près du clos Echalié. Plombières, montagne près de la combe de Neuvon, sous une pierre; avril. (Fixin. — M. Tarnier.) (Rouvray. — M. Emy.)

1201. B. CUPRIROSTRIS. *F.* Un seul exemplaire trouvé sous une pierre, au printemps, au bas du mur du Parc, du côté de Longvic.

1202. B. CHLORIS. *F.* Commun. Sur les crucifères. Dijon, sur le colza. (Beaune. — MM. Arias et André.)

1203. B. CHERULESCENS. *Scop.* Commun. Sur le colza. Avril, mai. Dijon, Vieux-Suzon, etc.; quelquefois dans la ville sur les murs, dès le 30 mars. (Beaune, dans la ville. — M. André.)

La larve vit dans l'intérieur des racines du colza; M. Durdumel en a obtenu d'éclosion, provenant de racines récoltées en novembre.

1204. B. CHLORIZANS. *Müll.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Beaune. — M. Arias.)





1203. B. LEPIDII. Müll. (Rouvray ; rare. — M. Emy.) (Beaune. — M. Arias.)

1206. B. PUNCTATUS. Dej. Pas commun. Sur le *Reseda lutea*, au bord des chemins. Juin, juillet. Dijon, chemin de Fontaine. Fontaine-les-Dijon, chemin d'Ahuy. Magny-sur-Tille.

1207. B. ABROTANI. Müll. Comme le *B. Punctatus*, dont il n'est probablement qu'une variété noire ; sur la même plante, mais plus rare. Magny-sur-Tille. Talant. Etc.

1208. B. T ALBUM. Linn. Commun. En fauchant dans les endroits humides sur les plantes au bord de l'eau. Mai, juin. Fixin, bois près du chemin de fer et près de la voie romaine. Gevrey, bord des ruisseaux vers les étangs de Satenay, et près du petit étang sous les détritns. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray ; rare. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

#### BAGOUS. Germ.

1209. B. FRIT. Herbst. Un seul exemplaire. Dijon, contre-fossé au midi du Canal, près le pont du chemin de fer de Lyon, sous une pierre ; 27 avril.

1210. B. LUTULOSUS. Gyll. Un seul exemplaire. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux, en fauchant sur les plantes au bord de l'eau stagnante d'un fossé ; 17 mai.

1211. B. LUTULENTUS. Gyll. (Rouvray ; pré des Ponts ; 6 juin 1840. — M. Emy.)

#### TRACHODES. Schüpp.

1212. T. HISPIDUS. Linn. Un seul exemplaire, trouvé le 28 avril à Flavignerot, en battant de vieux fagots dans le bois à l'est du pré. (Rouvray, battue des haies sèches ; été ; assez rare. — M. Emy.) (Serrigny, bois de Lépenot, en battant les fagots ; 6 juillet ; deux exemplaires. — MM. Bourlier et André.)

STYPHLUS. Sch.

1213. S. SETIGER. Beck. Je possède un seul exemplaire de cet insecte que je crois avoir trouvé à Chambolle, dans un jardin, au pied d'un arbre vert, sous les détritrus formés par la chute des feuilles de cet arbre, en septembre ou octobre.

ORCHESTES. III.

1214. O. QUERCUS. Linn. Commun. Dans les bois, en fauchant, surtout sur les pousses de chêne. Mai à octobre. Dijon, trouvé une fois au Parc sous une écorce de platane, en février, et une autre fois au vol à la Combe-aux-Serpents, le 6 avril. Fixin, bois près du chemin de fer. Chambolle. Plombières, combes de Neuven, et en octobre sur le viaduc. Villenote, bois de Champeaux. Collonges-les-Premières. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.) (Serrigny, bois de Lépenot. — M. Bourlier.)

1215. O. RUFUS. Oliv. Pas commun. En fauchant sur les haies et dans les bois; l'hiver sous les écorces. Février, mars; mai à août. Dijon, au Parc sous les écorces de platane, et en fauchant sur l'*Anthriscus sylvestris*. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Crimolois. Villenote, près Semur, sur les haies autour des prés, et au bord du bois de Champeaux.

1216. O. MELANOCEPHALUS. Oliv. (Rouvray. — M. Emy.)

1217. O. ALNI. Linn. Assez rare. En fauchant dans les bois et sous les écorces. Janvier, mars, mai, juin. Dijon, au Parc sous des écorces de charmes morts sur pied, et en fauchant sur l'*Anthriscus sylvestris*. Fixin, bois près du chemin de fer. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. Bourlier.)

1218. O. LIGIS. F. Pas commun. Dans les bois en fauchant. Mai à août. Plombières, combe de Neuven à Prenois.







Collonges-les-Premières. Fixin, bois près du chemin de fer. Villenote, près Semur, sur les haies autour des prés. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1219. O. FAGI. *Linn*. Pas très-commun. Sur les feuilles de hêtre à l'ombre. Fin avril, mai. Curley, bois de Mantuan.

1220. O. PRATENSIS. *Germ*. Rare. En fauchant dans les bois. Juillet, octobre. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. Villenote, près Semur, bord du bois de Champeaux.

1221. O. LONICERÆ. *F*. Pas commun. Dans les bois, sur le *Lonicera xylostæum*. Avril, juin à septembre. Plombières, combes de Neuvon. Marsannay-la-Côte. Chambolle.

1222. O. POPULI. *F*. Commun. Sur les saules. Juillet. Dijon, à gauche de la route de Gray, vis-à-vis l'extrémité du mur de Montmusard ; chemin de Mirande par les Petites-Roches, sur des osiers au bord des vignes ; (clos près de l'Asile des aliénés. — M. *Lombard*.) (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. Serrigny, bois de Lépenot en battant les fagots. — M. *Bourlier*.)

1223. O. SIGNIFER. *Creutz*. — SALICIS. *F*. Très-commun. Dans les bois en fauchant et sur les pousses de chêne. Mai, juin, juillet. Crimolois. Marsannay-la-Côte, près de Gouville. Plombières, combe de Neuvon. Saint-Nicolas-les-Citeaux. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1224. O. RUSCI. *Herbst*. Pas commun. Dans les bois, en fauchant. Mai, juin, juillet. Plombières, combe de Neuvon. Fixin, bois près du chemin de fer. Saint-Nicolas-les-Citeaux, forêt de Citeaux. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1225. O. ERYTHROPUS. *Müll*. Assez rare. Dans les bois, en fauchant. Mai, juillet, octobre. Fixin, bois près du chemin de fer. Villenote, près Semur, en fauchant et en battant les branches au bord du bois de Champeaux. Collonges-les-Premières.

1226. O. AVELLANÆ... (Rouvray. — M. *Emy*.)

TACHYERGES. Sch. — ORCHESTES. III.

1227. T. SALICIS. *Linn.* — BIFASCIATUS. *F.* Pas rare. En fauchant dans les bois de la plaine, surtout sur le saule Marceau. Mai, juin, juillet, septembre. Crimolois. La Rochette, près Oisilly, dans les prés. Fixin, bois près du chemin de fer. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. Villenote, au bord d'un fossé près du bois de Champeaux. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

1228. T. RUFITARSIS. *Sch.* Un seul exemplaire trouvé aux environs de Beaune par M. *André.*

1229. T. DECORATUS. *Schüpp.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1230. T. STIGMA. *Germ.* Pas rare. Dans les bois, en fauchant, et surtout sur le saule Marceau. Juin, juillet. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. Collonges-les-Premières. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

ANOPLUS. *Schüpp.*

1231. A. PLANTARIS. *Næzen.* Pas rare. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sur les jeunes pousses d'aulne dans une coupe exploitée l'hiver précédent, et sur des piles de bois d'aulne récemment coupé. Mai à juillet. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc, en fauchant; juillet. (Rouvray. — M. *Emy.*)

PHYTOBIUS. *Schmidt.*

1232. P. NOTULA. *Schüpp.* Pas commun. Dans les lieux humides. Juin, juillet, septembre. Dijon, sur le parapet au-dessus du Jardin botanique, sur un mur dans la ville. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Villers-les-Pots. Collonges-les-Premières, dans le bois au bord des fossés humides. (Rouvray; fin juillet, sur le *Polygonum.* — M. *Emy.*)





1233. *P. QUADRINODOSUS*. *Gyll.* Dans les bois humides, en fauchant au bord des fossés où l'eau séjourne. Mai, juin. Villers-les-Pots. (Saint-Nicolas-les-Citeaux, forêt de Citeaux. — *M. Bourlier.*)

1234. *P. COMARI*. *Herbst.* Au bord des ruisseaux, dans les bois. Juin, juillet. Gevrey, à l'ombre sous les aulnes près du petit étang de Satenay. Collonges-les-Premières. Soirans-Fouffrans, au bord du ruisseau qui sert d'écoulement à l'eau de l'étang Noiroit, de l'autre côté du chemin de fer de Besançon.

Dans cette dernière localité, j'ai recueilli, le 12 juillet, de petites coques d'un brun clair, assez molles, et fixées à la face inférieure des feuilles de *Lythrum salicaria*. Il en est sorti neuf jours après, le 21 du même mois, des *Phytobius comari*.

1235. *P. QUADRITUBERCULATUS*. *F.* Un seul exemplaire provenant très-certainement d'une des localités où j'ai trouvé le *P. Comari*, avec lequel je l'avais confondu. Deux autres exemplaires ont été trouvés aux environs de Beaune par *M. Bourlier*. (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune; pas commun. — *M. Arias.*)

1236. *P. QUADRICORNIS*. *Gyll.* Rare. Dans les lieux humides. Mai à juillet. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Citeaux, forêt de Citeaux. (Beaune. — *M. André.*)

#### ACALYPTUS. *Sch.*

1237. *A. SERICEUS*. *Dej.* — *CANESCENS*. *Dej.* (Rouvray. — *M. Emy.*)

1238. *A. RUFIPENNIS*. *Sch.* (Beaune; pas commun. — *M. Arias.*)

#### SIBYNES. *Sch.* — *SIBYNIA*. *Germ.*

1239. *S. CANUS*. *Herbst.* Rare. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant; 21 juin.

1240. *S. VISCARIÆ. Linn.* Pas rare. Dans les bois, en fauchant. Juin, juillet. Dijon, chemin de Daix, le soir, sur les fleurs de *Lychnis vespertina* et *Cucubalus inflatus*; 15 juin. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Flavignerot. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André. Hameau de Gigny, en fauchant le long des chemins. — M. Bourlier.)

1241. *S. FUGAX. Germ.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1242. *S. POTENTILLÆ. Koch.* (Rouvray. — M. Emy.)

1243. *S. PHALERATUS. Sch.* Rare. Environs de Dijon. Je l'avais confondu avec le *S. Primitus*, dont je le considérais comme le type, et ce dernier comme une variété moins vivement colorée. Les indications relatives au *S. Primitus* s'appliquent dès lors aux deux espèces collectivement.

1244. *S. PRIMITUS. Herbst.* Pas commun. Sur différentes plantes. Avril à juillet. Dijon, dans les jardins dans la ville; au Parc, en fauchant sur les *Anthriscus sylvestris*. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Flavignerot. Chambolle, dans la combe sur une fleur de pissenlit. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. Bourlier.)

SMICRONYX. Sch. — MICRONYX. Sch.

1245. *S. VARIEGATUS. Dej.* Pas rare. Dans les bois, en fauchant et en battant les fagots; juin; et l'hiver sous les écorces. Dijon, au Parc, en fauchant sur les *Anthriscus sylvestris*, sur le bois coupé et sous des écorces de platane; sur la barrière au-dessus de la gare. Plombières, bois près de Neuvon. Marsannay-la-Côte, près de Gouville. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Collonges-les-Premières. (Rouvray; pas commun. — M. Emy.) (Beaune. — M. Arias.)







MICCOTROGUS. *Sch.* — TYCHIUS. *Germ.*

1246. M. CUPRIFER. *Panz.* — MECINUS ULMI. *Dej.* Pas commun. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant. Mai. (Rouvray. — M. *Emy.*)

1247. M. PICIROSTRIS. *F.* Commun. Dans les bois, en fauchant. Juin, juillet. Plombières, combes de Neuvon. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Serriigny, bois de Lépenot. Beaune, bois de Battaut. — M. *Bourlier.*) (Beaune. — MM. *Arias et André.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

1248. M. POSTIGINUS. *Sch.* Rare. Dans les bois, en fauchant. Juin, juillet, 2 août. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Collonges-les-Premières. Fixin, bois près du chemin de fer. (Beaune. — M. *Bourlier.*)

TYCHIUS. *Germ.*

1249. T. QUINQUE PUNCTATUS. *Linn.* Assez commun. Sur différentes plantes. Mai, juin, commencement de juillet. Dijon, fontaine de Larrey, en fauchant le long du ruisseau; chemin entre celui d'Ahuy et celui de Fontaine, sur la *Vicia sepium*; commun; 4 juillet. Chemin de Daix, sur un pied de chenevière. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées, sur l'*Erysimum lanceolatum*. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. Fixin, bois près du chemin de fer. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. Etc. (Beaune. — MM. *Arias et André.* En fauchant sur les blés, les luzernes et les plantes qui couvrent les fossés, le long des chemins. — M. *Bourlier.*)

1250. T. VENUSTUS. *F.* Rare. Environs de Dijon, en fauchant. (Rouvray; très-commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*)

1251. T. TOMENTOSUS. *Herbst*. Pas rare. Dans les bois, en fauchant. Juin, juillet. Dijon, au bas du mur du Parc, du côté de Longvic, sous une pierre. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. Saint-Nicolas-les-Citeaux, forêt de Citeaux. (Rouvray; commun sur les osiers sauvages au bord du Serein, sous Montherthaud. — M. Emy.) (Beaune. — M. André.)

1252. T. JUNCEUS. *Reich*. Commun. Le long des fossés au bord des chemins, et dans les bois, en fauchant. Juin, juillet. Plombières, combes de Neuvon. Fixin, bois près du chemin de fer. Blaisy-Bas. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. (Beaune; Gigny; Serrigny, bois de Lépenot. — M. Bourlier.)

1253. T. MELILOTI. *Kirby*. Pas rare. Au bord des chemins et dans les bois en fauchant. Mai, juin, juillet. Plombières, combes de Neuvon. Saint-Nicolas-les-Citeaux, forêt de Citeaux. (Beaune; sous les meules de foin, octobre; en fauchant, été. — M. Bourlier.)

1254. T. SPARSUTUS. *Oliv*. Rare. Plombières, combe de Neuvon à Darois; juin. (Rouvray; commun. — M. Emy.) (Beaune, en fauchant; juin, juillet. — M. Bourlier.)

1255. T. TIBIALIS. *Sch*. Rare. Environs de Dijon.

#### CORYSSOMERUS. *Sch*.

1256. C. CAPUCINUS. *Beck*. Rare. En fauchant dans les bois. Fixin, bois près du chemin de fer. (Rouvray. — M. Emy.)

#### AMALUS. *Sch*.

1257. A. SCORTILLUM. *Herbst*. Pas rare. En fauchant dans les endroits humides, surtout les bois ombragés. Mai, juin, juillet. Dijon, au Parc, en fauchant sur l'*Anthriscus sylvestris*. Plombières, combes de Neuvon. La Rochette, près Oisilly, sur les prés. Villers-les-Pots. Gevrey, bord du petit





étang de Satenay, en fauchant et sous les détritns. Saint-Nicolas-les-Citeaux, forêt de Citeaux. (Beaune, bord des chemins et bois de Battant. — MM. *Bourlier et André.*)

BALANINUS. *Germ.*

1258. B. GLANDIUM. *Marsh.* Commun. Dans les bois sur les chênes dans les jeunes taillis. Du 24 avril au 11 juin. Velars-sur-Ouche, coteau au-dessus de la forge. Plombières, combe de Neuvo, près de la ferme du Fays. Marsannay-la-Côte, près de Gouville. Gevrey, bois du Chaignot, etc. Fixin, bois près du chemin de fer. Blaisy-Bas. (Saint-Nicolas-les-Citeaux, forêt de Citeaux. — M. *Bourlier.*) (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*)

1259. B. NUGUM. *Linn.* Pas rare. Dans les bois en fauchant et dans les jardins sur les noisetiers. Mai, juin, commencement de juillet. Dijon, au Parc sur des feuilles d'arbres; cours du Parc sur un banc; au vol le soir sur le chemin de la Charrette. Fixin, bois près du chemin de fer. Flavignerot. Gevrey, bois du Chaignot. Chambolle, sur des noisetiers dans un jardin. (Villenote, près Semur; trouvé par M. *Lombard* sur les noisetiers de son jardin.) (Rouvray; commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias et Bourlier.*)

La larve de cet insecte vit dans les noisettes et n'est autre que le *ver* qui se trouve assez souvent dans ces fruits. D'après M. *Vallot*, cette larve se trouverait aussi quelquefois dans les noix (1).

1260. B. TURBATUS. *Gyll.* Commun. Dans les bois sur le chêne. Mai. Velars-sur-Ouche, coteau au-dessus de la forge. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bois du Chaignot. (Beaune. — M. *André.*)

1261. B. CERASORUM. *Herbst.* Très-rare. Environs de Dijon.

---

(1) Observations entomologiques. — Extrait du *Magasin encyclopédique* (août 1812). Tirage à part, p. 19.

1262. B. RUBIDUS. *Dej.* (Mortberthand ; rare ; commencement de septembre, en fauchant dans les chaumes du bois de bouleaux. — M. *Emy.*) (Villenote, près Semur. — M. *Lombard.*)

1263. B. VILLOSUS. *Herbst.* Assez commun. En fauchant dans les bois. Fin avril, mai, commencement de juin. Dijon, sur la barrière au-dessus de la gare ; cours du Parc, dans un tilleul ; chemin d'Ahuy, sur une pierre. Plombières, combe de Neuvon. Velars-sur-Ouche, coteau au-dessus de la forge, sur des feuilles de chêne. Fixin, bois près du chemin de fer. Villenote, bois de Champeaux. (Rouvray ; pas commun. — M. *Emy.*) (Beaune ; pas commun. — M. *Arias.*)

1264. B. CRUX. *F.* Pas commun. Sur différentes plantes dans les endroits humides. Mai. Dijon, au Parc en fauchant sur l'*Anthriscus sylvestris* ; (sur les saules et les herbes environnantes ; — M. *Nodot.*) (Rouvray ; assez rare ; sur les osiers, au bord du Serein. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

1265. B. BRASSICÆ. *F.* Pas rare. Dans les lieux humides, sur différentes plantes. Mai, juin, commencement de juillet. Dijon, barrière au-dessus du débarcadère ; sur des osiers dans une vigne hors la porte Saint-Bernard ; (sur les saules et les herbes environnantes, en fauchant ; — M. *Nodot.*) Gevrey, sous les détritux au bord du petit étang de Satenay. La Rochette, près Oisilly, en fauchant dans les prés au bord de la Vingeanne. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Serrigny, bois de Lépenot. — M. *Bourlier.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

1266. B. PYRRHOCERAS. *Marsh.* Commun. Sur les feuilles de chêne dans les jeunes taillis, surtout au commencement de la feuillaison de cet arbre. Mai, juin, commencement de juillet. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bois de la plaine, près de la voie romaine. Saint-Nicolas-







les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Chambolle. (Rouvray ; pas très-commun. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

ANTHONOMUS. Germ.

1267. A. ULMI. De Géer. Pas rare. Dans les bois en fauchant, surtout sur l'épine blanche, *Crataegus oxyacantha*. 30 avril, mai. Dijon, au Parc sur un banc au soleil, 10 avril. Flavignerot. Marsannay-la-Côte, près de Gouville et dans la combe. (Beauné. — M. Bourlier.) (Savigny près Beaune, Fontaine-Froide. — MM. Arias et André.)

1268. A. PYRI. Chevr. Pas commun. Environs de Dijon.

1269. A. ELONGATULUS. Sch. Rare. Dijon, au Parc, en fauchant sur les *Anthriscus sylvestris* dans les allées un peu découvertes ; 11 et 20 mai.

1270. A. POMORUM. Linn. Commun. Sous les écorces de pommier au printemps, dans les vergers ; un peu plus tard cet insecte attaque les fleurs de ces arbres et y dépose ses œufs ; les fleurs attaquées se flétrissent et deviennent stériles ; on peut alors, en les recueillant, obtenir bon nombre de ces insectes (1). Chambolle. (Rouvray ; rare. — M. Emy.)

1271. A. INCURVUS. Panz. Pas commun. Dans les bois, en fauchant, principalement sur le *Crataegus oxyacantha*. 30 avril, mai. Dijon, au Parc en fauchant sur l'*Anthriscus sylvestris*. Marsannay-la-Côte. (Rouvray. — M. Emy.)

1272. A. RUBI. Herbst. Très-commun. Sur différentes plantes et arbustes, notamment sur les ronces et les églantiers. Mai à août. Dijon, au bord des chemins sur les haies ; chemin de Daix, sur les fleurs d'églantier ; chemin entre celui de Chenôve et celui de Corcelles, sur un plan-

---

(1) Cette observation a été faite au Jardin botanique de Dijon par M. le docteur Vallot. Elle a été faite aussi par M. Lombard (*Revue horticole de la Côte-d'Or*, octobre 1884, p. 116.)

tain; bord de l'Ouche, sur l'*Achillea millefolium* et la *Spiræa ulmaria*; et dans tous les bois des environs, en fauchant. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune et les environs; bois de Battaut, hameau de Gigny; en fauchant. — M. Bourlier.)

1273. A. DRUPARUM. *Linn.* Pas commun. Dans les bois en fauchant. Mai. Chambolle. Etc. (Rouvray; en battant l'aubépine en fleur. — M. Emy.) (Beaune. — M. Arias.)

1274. A. VARIEGATUS. *Dej.* (Rouvray; commun. — M. Emy.)

BRADYBATUS. *Germ.*

1275. B. CREUTZERI. *Meg.* Très-rare. Fixin, bois près de la voie romaine, en fauchant; 9 mai.

LIGNYODES. *Sch.*

1276. L. ENUCLEATOR. *Panz.* Rare. Dijon, sous les pierres près des bâtiments du clos de Pouilly, 22 avril; sur un mur près de Larrey, 4 mai. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. Arias.)

ELLESCUS. *Meg.*

1277. E. SCANICUS. *Linn.* Rare. Dans les bois humides, en fauchant. Mai. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux.

1278. E. BIPUNCTATUS. *Linn.* (Rouvray; rare. — M. Emy.)

HYDRONOMUS. *Sch.*

1279. H. ALISMATIS. *Sch.* Rare. Sur les plantes aquatiques, au bord des ruisseaux. Mai à juillet. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Plombières, combe de Neuvo à Prenois, en fauchant au bord du chemin au-dessous de la fontaine; 6 juillet. (Beaune. — M. Péragallo.)





GRYPIDIUS. Sch.

1280. G. EQUISETI. *F.* Pas commun. Sur les *Equisetum*, au bord de l'eau. Mai, juin. (Gevrey, bord du petit étang de Satenay. — M. Tarnier.) (Fénay; étang de Sans-Fond. — M. Dudrumel.) Baume-la-Roche, montée du souterrain de Blaisy, sous une pierre. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune. — M. Bourlier.)

ERIRHINUS. Sch.

1281. E. BIMACULATUS. *F.* (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune; pas rare; en fauchant. — M. Arias.)

1282. E. SCIRPI. *F.* Pas rare. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant et sous les détritrus. Mai, juin, septembre. (Rouvray. — M. Emy.)

1283. E. AGRIDULUS. *Linn.* Commun. Au bord de l'eau dans les endroits humides, sur les plantes, sous les pierres, la mousse et les détritrus. Fin avril, mai, juin, juillet, octobre. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; bord de l'Ouche, près du Parc, Plombières, combe de Neuvoa à Prenois. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et Pérageallo.)

1284. E. PILLUMUS. *Sch.* (Beaune; deux exemplaires. — MM. Bourlier et André.)

1285. E. INQUISITOR. *Herbst.* — NEREIS. *Payk.* Pas commun. Au bord de l'eau. Avril, mai. Dijon, contre-fossé au midi du Canal, près du pont du chemin de fer, sous les pierres. Gevrey, bord d'un fossé au-dessus du grand étang de Satenay.

1286. E. SCIRRHOUS. *Sch.* Pas commun. Dijon, contre-fossé au midi du Canal, près du pont du chemin de fer, sous les pierres et en fauchant. 12 avril, 5 mai. (Beaune. — M. Bourlier.)

DORYTOMUS. *Germ.*

1287. D. VORAX. *F.* Commun. Sur les peupliers, sous l'écorce de ces arbres, sous les pierres, en fauchant et au vol le soir, toujours dans le voisinage des peupliers. Mars à août. Dijon, bord du Canal; fontaine de Larrey; bord de Suzon près du chemin d'Ahuy; au Parc, sous une écorce de platane, janvier; (trouvé par M. *Dudrumel* abondamment dans des lichens recueillis sur des troncs de peupliers le long du Canal, en automne); près de la ferme d'Épierre; etc. (Fauverney, près de la Bayotte, en fauchant sur le chêne. — M. *Nodot*.) Gevrey, entre la voie romaine et le petit étang de Satenay, dans un saule creux. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

1288. D. TREMULÆ. *Payk.* Rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *Bourlier*.)

1289. D. VARIEGATUS. *Sch.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1290. D. COSTIROSTRIS. *Sch.* Pas commun. Dans les endroits humides. Dijon, Jardin botanique, au bas des peupliers, 7 avril; au bas du mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles mortes, 15 avril. Plombières, sur le viaduc de Neuvon, 28 octobre; combe de Neuvon à Prenoix, sous des feuilles mortes, 4 juin; sur le mur de la gare, 8 avril. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux, en fauchant, 19 juin. (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

1291. D. AFFINIS. *Payk.* Pas commun. Dans les endroits humides, en fauchant. Mai, juin. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Fixin, bois près du chemin de fer. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1292. D. VALIDIROSTRIS. *Sch.* Rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1293. D. TÆNIATUS. *F.* Rare. Environs de Dijon.







1294. D. PECTORALIS. *F.* Rare. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sur les saules Marceau; 20 mai.

1295. D. VILLOSULUS. *Meg.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

1296. D. TORTRIX. *Linn.* Pas rare. Dans le voisinage des peupliers, dans les lieux humides. Mai, juin. Dijon, bord du Canal et fontaine de Larrey, le soir au vol. Fixin, bois près de la voie romaine, en fauchant. (Rouvray. — M. *Emy.*)

1297. D. FILIROSTRIS. *Sch.* Rare. Plombières, sur le viaduc de Neuvon; 1<sup>er</sup> novembre.

MAGDALINUS. *Germ.* — THAMNOPHILUS. *Sch.*

1298. M. DUPLICATUS. *Germ.* Un seul exemplaire; Dijon, dans une cour du Palais-de-Justice, sur un mur; 17 mai.

1299. M. CERASI. *Linn.* — RHINA. *Gyll.* (Femelle.) Commun. Sur différents arbres. Mai, juin. Dijon, cours du Parc, sur de petits arbres nouvellement plantés et entourés d'épines; au Parc, sur du bois coupé. Collonges-les-Premières. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant. Saint-Nicolas-les-Citeaux, forêt de Citeaux. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *André.*)

1300. M. STYGUS. *Gyll.* Commun. Dans les bois, en fauchant. Mai, juin. Dijon, au Parc sur les tiges de petits érables nouvellement plantés. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Beaune. — M. *Bourlier.*)

1301. M. BARBICORNIS. *Latr.* Pas commun. Environs de Dijon.

1302. M. PRUNI. *Linn.* Pas rare. En fauchant dans les bois. Juin. Dijon, chemin de Daix, sur les prunelliers dans une haie vive. Flavignerot. Plombières, combe de Neuvon. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *Péracallo.*)

1303. M. FLAVICORNIS. *Sch.* Rare. Environs de Dijon.

1304. M. NITIDIPENNIS. *Erichs.* Cet insecte paraît fort rare;

deux exemplaires seulement ont été trouvés dans le département, l'un par moi aux environs de Dijon, et l'autre par M. André à Beaune.

RHINOCYLLUS. *Germ.*

1305. R. LATIROSTRIS. *Latr.* (Beaune. — M. Arias.)

1306. R. OLIVIERI. *Meg.* Commun. Sur le *Carduus nutans*, au bord des chemins. Du 21 mai au 16 juillet. Dijon, Allée-de-la-Retraite; Vieux-Suzon; etc. Talant. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Chambolle. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. Bourlier.)

LARINUS. *Schäpp.*

1307. L. STURNUS. *Schaller.* Très-commun. Sur le *Carduus nutans*, au bord des chemins. Mai, juin, juillet. Dijon. Allée-de-la-Retraite; Vieux-Suzon; etc. Talant. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et Arias.)

1308. L. JACEÆ. *F.* Commun. Aussi sur le *Carduus nutans*. Mêmes époques d'apparition et mêmes localités que le précédent, c'est-à-dire à peu près partout où croît le *Carduus nutans*. Trouvé une fois en janvier au Parc sous une écorce de platane. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias et Bourlier.)

1309. L. TURBINATUS. *Dej.* Rare. Dijon, Vieux-Suzon, sur le *Carduus nutans*; juin.

1310. L. CARLINÆ. *Oliv.* Pas rare. Toujours sur le même chardon, au bord des chemins; quelquefois sur d'autres plantes, mais accidentellement. Mai, juin. (Beaune. — MM. Arias et Bourlier.)

LIXUS. *F.*

1311. L. PARAPLECTICUS. *Linn.* Pas commun. Sur les plantes aquatiques au bord des eaux stagnantes. Mai, août.





Dijon, bord du Canal. (Beaune; un seul exemplaire. — M. *Bourlier*.)

1312. L. *ASCANII*. *Linn.* Pas commun. Sur les plantes et arbustes le long des chemins et des fossés. Juin, juillet. Dijon, chemin de Daix, sur une haie; (fossés du cours du Parc, sur les chardons et les buissons. — M. *Nodot*.) Talant, sous les pierres près des tunnels du chemin de fer; janvier. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *Arias*.)

1313. L. *ACUTUS*. *Dej.* (Rouvray. — M. *Emy*.)

1314. L. *MYAGRI*. *Oliv.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1315. L. *ANGUSTATUS*. *F.* Assez commun. Sur les plantes et les buissons au bord des chemins. Fin avril, mai, juillet, août et commencement de septembre. Dijon, chemin de Daix, etc.; barrière au-dessus du débarcadère; contre-fossé au midi du Canal près du pont de la Colombière, très-abondant fin août et commencement de septembre sur des saules Marceau. Marsannay-la-Côte, chemin de la combe. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *Arias*.)

1316. L. *CRIBRICOLLIS*. *Dej.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1317. L. *SPARTH*. *Oliv.* (Rouvray; rare. — M. *Emy*.)

1318. L. *BICOLOR*. *Oliv.* Pas commun. Sur différentes plantes. Fin mai, juin. Dijon, au Parc; (fossés du cours du Parc, sur les chardons et les buissons. — M. *Nodot*.) Marsannay-la-Côte, chemin de la combe sur une pierre, 31 mars. Saint-Nicolas-les-Citeaux, forêt de Citeaux, sur une ronce. (Beaune. — M. *Bourlier*.)

1319. L. *FILIFORMIS*. *F.* Commun. Au bord des chemins sur le *Carduus nutans*. Mai, juin. Dijon, Allée-de-la-Retraite; Vieux-Suzon; chemin de Talant, etc.; barrière au-dessus du débarcadère, fin avril. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

1320. *L. RUFITARSIS. Sch.* Un exemplaire de cette espèce a été trouvé aux environs de Villenote par M. *Lombard*. M. *Arias* le signale aussi comme ayant été pris aux environs de Beaune.

1321. *L. BARDANÆ. F.* Rare. Environs de Dijon. (Beaune; un exemplaire. — M. *Bourlier*.)

1322. *L. RUFULUS. Sch.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1323. *L. SOBRINUS. Dej.* (Rouvray. — M. *Emy*.)

1324. *L. ANGUSTUS. Herbst.* (Rouvray; rare. — M. *Emy*.)

OTIORHYNCHUS. *Germ.*

1325. *O. NIGER. F.* (Beaune; pas commun. — M. *Arias*.)

1326. *O. SUBSULCATUS. Dej.* (Beaune; un seul exemplaire. — M. *Arias*.)

1327. *O. TENEBRICOSUS. Herbst.* Commun. Sur différentes plantes et arbrisseaux, les haies, surtout au bord des chemins dans les bois, sous les pierres, errant par terre, quelquefois sous les écorces d'arbres abattus. Avril à août. Dijon, chemins autour de la ville, surtout près des haies ou des vignes; chemins de Fontaine, Daix, Marsannay-la-Côte, etc.; combe Saint-Joseph. Plombières, bois de Champmoron; combes de Neuvon. (Rouvray; pas rare sur l'aubépine en fleur. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1328. *O. LUGDUNENSIS. Sch.* Pas rare. Dans les bois de montagne, sur les arbrisseaux, par terre et sous les pierres. Mai à juillet. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. Fixin, près de la ferme de la Fortelle. Chambolle.

1329. *O. SUBSTRIATUS. Sch.* (Beaune; très-commun. — M. *Arias*.)

1330. *O. SCABROSUS. Marsh.* Pas commun. Sous les pierres et sur les arbrisseaux, par terre, surtout sur les chemins. Mai à octobre. Dijon, au Parc en fauchant; chemin de Daix et autres. Talant, près du chemin de fer.







1331. *O. CRIBRICOLLIS*. *Dej.* Rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*)

1332. *O. PUPILLATUS*. *Sch.* Rare. Environs de Dijon.

1333. *O. LUTOSUS*. *Chevrier. Inédit.* (D'après M. *Aubé.*) Pas commun. Sous les pierres. 31 mars, avril. Dijon, au bas du mur au nord du clos de Pouilly; au bord des chemins du côté de Fontaine.

1334. *O. PICIPES*. *F.* Commun. En fauchant sur différentes plantes et sur les buissons. Mai. Dijon, au Parc en fauchant sur l'*Anthriscus sylvestris*; trouvé une fois en janvier sous une écorce. (Fixin. — M. *Tarnier.*) (Rouvray; commun sur l'aubépine en fleur. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

1335. *O. RAUGUS*. *F.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

1336. *O. LIGNEUS*. *Oliv.* Pas commun. Environs de Dijon. (Dijon, derrière le Parc sur le sable le long de l'Ouche; juillet. — M. *Nodot.*) (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *André.*)

1337. *O. UNCINATUS*. *Germ.* Un seul exemplaire, trouvé le 29 juin à Plombières dans la combe de Neuvon à Prenois.

1338. *O. LIGUSTICI*. *Linn.* Très-commun. Dans les vignes, où il cause souvent des dégâts considérables, en détruisant, pendant la nuit, les bourgeons des jeunes plants; pendant le jour on ne le rencontre qu'en nombre peu considérable et qui ne pourrait en aucune manière laisser supposer que ces dégâts sont causés par cet insecte (1). Mai, juin, quelque-

---

(1) M. le docteur *Vallot*, dans un mémoire intitulé : *Mémoire pour servir à l'histoire des insectes ennemis de la vigne et à l'indication des moyens propres à prévenir leurs ravages* (brochure in-4° de 62 pages, sans date, extraite d'un recueil académique), signale comme nuisibles à la vigne, non-seulement l'*O. Ligustici*, mais encore les *O. Sulcatus* et *Tenebricosus*. Cet observateur indique comme le seul moyen de détruire ces espèces nuisibles (désignées par les vigneronns sous le nom de *Perdi* ou *Perdri*) et d'empêcher leurs ravages, celui qui consiste à rechercher ces insectes au pied des ceps dont les bourgeons sont attaqués,

fois en avril. Dijon et les pays vignobles des environs, par terre sur les chemins, sous les pierres et sur les petits murs qui servent de clôture aux vignes; il se trouve rarement ailleurs que dans les lieux où l'on cultive la vigne. (Rouvray; rare. — M. Emy.) (Beaune et les environs. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1339. O. SULCATUS. F. Commun. Sur les chemins, surtout dans le voisinage des vignes, par terre, sous les pierres et sur les feuilles des buissons; dans les jardins. Dijon, chemins autour de la ville; chemins de Talant, de Daix, etc.; fontaine de Larrey. Talant, au sud du village. (Rouvray; pas commun. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias et André.)

---

en écartant la terre à la profondeur d'un ou deux centimètres, et à les écraser à mesure qu'on les rencontre.

Ce procédé me semble devoir être peu efficace en raison de la difficulté de voir des insectes qui se tiennent immobiles dès qu'ils sont inquiétés, et qui (*O. Ligustici* surtout) ont le plus souvent le corps recouvert de terre, circonstance au moyen de laquelle ils échappent plus facilement encore aux regards.

Ne m'étant jamais occupé d'entomologie appliquée à l'agriculture, je suis loin d'avoir la prétention d'indiquer un remède plus efficace; cependant je crois devoir présenter ici une considération sur la cause première du mal.

La raison indique tout d'abord qu'en matière de dégâts causés aux plantes par les insectes, il est bien préférable, au lieu de laisser ces dégâts se produire et de chercher à les arrêter ensuite, de les prévenir en empêchant la trop grande multiplication des insectes nuisibles.

Le moyen le plus naturel d'empêcher la trop grande multiplication des espèces d'insectes nuisibles est incontestablement de ne pas détruire les animaux insectivores qui sont leurs ennemis. Il s'agit donc de découvrir, parmi ces animaux, ceux qui sont les ennemis des *Otiorhynchus*, ce qui ne sera pas difficile.

Il est bien évident d'abord que les *Otiorhynchus*, insectes essentiellement nocturnes et ne se rencontrant que très-exceptionnellement pendant le jour, ne pourront être arrêtés dans leur trop grande multiplication par les oiseaux insectivores diurnes, les lézards et les autres ennemis des insectes qui errent pendant le jour; cette multiplication ne sera pas arrêtée davantage par les chauve-souris et quelques oiseaux insectivores nocturnes (les engoulevents par exemple) qui volent le soir ou la nuit, et cela par la raison sans réplique que les *Otiorhynchus* étant aptères, et par conséquent privés de la faculté de voler, ces in-





1340. *O. OVATUS*. *Linn.* Rare. Environs de Dijon. (Beaune; deux exemplaires. — M. André.)

PERITELUS. *Germ.*

1341. *P. GRISEUS*. *Oliv.* (Beaune; deux exemplaires. — M. André.)

1342. *P. RUSTIGUS*. *Sch.* Pas commun. Sous les pierres. Avril. Dijon, derrière le mur du Parc du côté de Longvic; je l'ai trouvé aussi dans d'autres localités que j'ai omis de noter et que j'ai oubliées.

---

sectes ne pourront être détruits par ces derniers animaux, qui ne prennent leur proie qu'au vol.

Le véritable ennemi des insectes aptères nocturnes, le seul peut-être parmi les animaux vertébrés, est le crapaud, que j'ai plusieurs fois observé le soir, attendant sa proie comme un chasseur à l'affût, et la saisissant au moyen de l'organisation particulière de sa langue, avec laquelle il produit alors un petit bruit caractéristique. J'ai pu aussi, à la suite de l'ouverture de plusieurs de ces reptiles, me rendre compte de la quantité d'insectes détruits par eux; ainsi, une heure seulement après celle où leur chasse a commencé, l'estomac de ces animaux contenait déjà vingt ou trente insectes. Il est facile, d'après ce résultat, de se faire une idée de ce qu'il peut être après la nuit entière, et même de se rendre approximativement compte de la consommation d'insectes faite par un seul crapaud pendant toute la belle saison. A la vérité, tous les insectes détruits par les crapauds ne sont pas des insectes nuisibles, mais ceux-ci néanmoins y entrent dans une notable proportion.

Si l'on réfléchit maintenant qu'en tout temps comme en tous lieux le crapaud a été la victime d'un préjugé ridicule, il est facile de comprendre de quelle influence a été sa destruction sur la multiplication de certains insectes nuisibles. Epargnez cet animal, laissez-le se reproduire à son aise dans les vignes, les dégâts causés par les insectes (les espèces aptères surtout) ne tarderont pas à diminuer considérablement, s'ils ne cessent pas tout à fait.

La taupe, autre victime du préjugé et de la routine, rend également de grands services aux vignes en dévorant dans la terre beaucoup de larves d'insectes nuisibles; sa destruction est aussi, par conséquent, une cause puissante de la trop grande multiplication de ces insectes.

L'homme ne saura-t-il donc jamais discerner, parmi les animaux, ceux qui sont les protecteurs de ses récoltes?

1343. *P. VALIDISCAPUS*. *Rouget. Inédit* (1). Environs de Dijon ; deux exemplaires.

OMIAS. *Sch.*

1344. *O. BRUNNIPES*. *Oliv.* Très-commun. Dans les bois, dans l'eau des ornières après la pluie, sous les détritns, en battant les fagots, sous les ételles humides, etc. Avril, mai. Dijon, chemin de Marsannay-la-Côte, près d'une pépinière. Flavignerot. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*)

1345. *O. PELLUCIDUS*. *Sch.* (Beaune ; en battant les fagots, dans les bois. — M. *André.*)

1346. *O. EBENINUS*. *Chevr.* Moins commun que le précédent. Même habitat. Avril à juillet. Mêmes localités, moins celle du chemin de Marsannay ; trouvé aussi au Parc dans un tilleul. (Saint-Nicolas - les - Cîteaux, forêt de

---

(1) Cette espèce présentant dans la structure de ses antennes un mode de conformation qui s'éloigne de celui de toutes les autres espèces du genre, je fais en sa faveur une exception à la règle que je me suis imposée de ne pas créer d'espèces nouvelles dans un ouvrage de la nature de celui-ci.

En attendant que je la décrive plus complètement, la diagnose suivante la fera reconnaître sans difficulté :

*Nigro-fuscus, cinereo-squamulosus, parce setosus, antennis pedibus que fusco-ferrugineis ; rostro brevi, sulcato, antennis scapo valido, summa basi tenui, dein subito incrassato (basi reliquo triplo angustiori), funiculo tenui (scapo triplo angustiori), articulo 2° funiculi 1° vix longiori, hoc paulo crassiori, 3-7 subtrunatis, clava ovata (latitudine dimidio longiori) ; pronoto latitudine paulo breviori, depresso, medio longitudinaliter obsolete impresso, lateribus rotundato ; elytris oblongo-ovalibus, subdepressis, punctato-striatis, postice oblique declivibus (hoc est apice subtus recurvis).*

Mes deux exemplaires sont recouverts d'un enduit terreux, comme cela arrive fréquemment chez le *P. Rusticus*. Le scape des antennes, trois fois plus large que la base de cet article et que le funicule, donne à cette espèce un aspect particulier qui pourrait peut-être donner lieu à la création d'un genre nouveau.







Citeaux. — M. *Bourlier*.) (Serrigny, bois de Lépenot. — MM. *Bourlier* et *André*.)

TRACHYPHLOEUS. *Germ.*

1347. T. DIGITALIS. *Gyll.* Rare. Dans les bois, sous les feuilles mortes, les tas d'ételles, les amas d'enveloppes de faine et autres détritns. Mai, juin. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, bois de Château-Renard. Chambolle.

PHYLLOBIUS. *Sch.*

1348. P. CALCARATUS. *F.* Pas commun. Dans les bois sur les feuilles d'arbres et en fauchant. Mai, juin, commencement de juillet. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Blaisy-Bas. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sur des piles de bois d'aulne et sur les jeunes pousses de cet arbre. (Beaune. — M. *Arias*.)

1349. P. PYRI. *Linn.* (Rouvray. — M. *Emy*.)

1350. P. ARGENTATUS. *Linn.* Commun. Dans les bois, en fauchant et sur les feuilles de chêne. Mai. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. Etc. (Beaune. — M. *André*.)

1351. P. OBLONGUS. *Linn.* Commun. Dans les bois en fauchant; dans les jardins sur les noisetiers et les arbres fruitiers; au bord des chemins sur les haies et les buissons. Mai, juin. Dijon, dans les jardins; au bord des chemins du côté de Fontaine. Flavignerot. Chambolle. Etc. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

1352. P. SINUATUS. *F.* Pas commun. Villenote, près Semur; en battant les branches d'ormes qui se trouvent dans les haies autour des prés; août, septembre.

1353. P. VESPERTINUS. *F.* Commun. Dans les bois en fauchant; sur les haies au bord des chemins. Fin avril, mai, juin. Dijon, chemins hors la porte Saint-Bernard et sur des

osiers au bord d'une vigne. Plombières, combe de Neuvon à Darois, sur un noisetier. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. Blaisy-Bas. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

1354. P. BETULÆ. *F.* Très-commun. Dans les bois dans les jeunes taillis, sur le chêne, dont il dévore quelquefois complètement les feuilles. Mai, juin. Dijon, sur des osiers au bord d'une vigne hors la porte Saint-Bernard. Marsannay-la-Côte. Gevrey. Chambolle. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.) (Larocheport; sous une pierre; mai. — M. *Bourlier*.)

1355. P. POMONÆ. *Oliv.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1356. P. UNIFORMIS. *Marsh.* Commun. Dans les bois et sur les haies. Mai, juin. Dijon, chemin de Daix. Plombières, combe de Neuvon. Marsannay-la-Côte. Gevrey, bois de la plaine. Etc. (Rouvray; assez rare; sur le coudrier. — M. Emy.) (Beaune. — M. *André*. Bois de Battaut. M. *Bourlier*.)

LIMBIUS. *Sch.* — PHYTONOMUS. *Sch.*

1357. L. DISSIMILIS. *Herbst.* Pas rare. En fauchant dans les bois. Avril, mai, juin. Plombières, combe de Neuvon. Marsannay-la-Côte. Etc. (Beaune. — M. *Bourlier*.)

PHYTONOMUS. *Sch.*

1358. P. PUNCTATUS. *F.* Le long des chemins, surtout dans les bois, en fauchant. Mai, juin, septembre. Plombières, Flavignerot. (Fixin. — M. *Tarnier*.) Collonges-les-Premières. Villenote, près Senur. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. *Arias* et *André*.)

1359. P. FASCICULATUS. *Herbst.* Un seul exemplaire trouvé par feu M. J. *Saintpère*.





Cet insecte se trouvait dans une petite bouteille d'insectes non piqués, recueillis par lui à Dijon dans son bûcher, où se trouvait du bois de tremble rapporté de l'Étang-Vergy. Cette bouteille et les insectes qu'elle contenait (parmi lesquels était un assez grand nombre de *Ptinus ornatus* et d'*Obrium cantharinum*) m'a été donnée par M. *Dudrumel*, actuellement possesseur de la collection de coléoptères de M. *Saint-père*.

1360. P. RUMICIS. *Linn.* Pas rare. Dans les lieux humides, principalement dans les prés sur différentes espèces de *Rumex*. Mai, juin, juillet. Dijon, près au bord de l'Ouche. Flavignerot, dans l'ancien étang. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Citeaux, forêt de Citeaux. (Rouvray; commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*) (Serrigny, bois de Lépenot. — M. *Bourlier.*)

1361. P. POLLUX. *F.* Assez commun. Dans les endroits humides. Fin avril, mai, juin. Dijon, contre-fossé au midi du Canal, sous les pierres et sur les plantes; au bas du mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles sèches, 15 avril. Plombières, combe de Neuvon.

La variété ALTERNANS. *Steph.* se trouve avec le type dans la première des localités qui viennent d'être indiquées.

1362. P. SUSPICIOSUS. *Herbst.* Un exemplaire. Environs de Dijon. (Beaune; pas commun. — M. *Arias.*)

1363. P. VICLE. *Gyll.* Pas rare. Dans les bois, en fauchant. Juin, septembre. Plombières, combe de Neuvon. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Etc. (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*)

1364. P. TIGRINUS. *Dej.* Rare. Sur différentes plantes. Dijon, chemin entre celui de Fontaine et celui d'Ahuy, sur une héraclée; 28 juillet. (Rouvray; rare. — M. *Emy.*) (Beaune; en fauchant sur la luzerne; 26 mai. — M. *Bourlier.*)

1365. P. PLANTAGINIS. *De Géer.* Commun. En fauchant

dans les bois. Juin. Dijon, sur le parapet du Jardin botanique, 4 avril. Plombières, combe de Neuvon. Fixin, bois près du chemin de fer. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

1366. P. MURINUS. *F.* Commun. Dans les bois, en fauchant. Avril à septembre. Plombières, combe de Neuvon. Fixin, bois près du chemin de fer. Saint-Nicolas-les-Citeaux. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

1367. P. VARIABILIS. *F.* Très-commun. En fauchant; sur les pierres au soleil; dans les rues des villes et des villages sur les murs. Printemps, été, automne. Dijon, dans la ville sur les murs dans les rues et les cours; et aux environs de Dijon dans les chemins peu fréquentés, sous les pierres, sur les pierres au soleil, par terre et en fauchant; trouvé aussi sur une barrière près d'un jardin au bas de l'asile des Aliénés. Plombières, combe de Neuvon et sur le viaduc. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.* Le premier l'indique comme trouvé en fauchant sur la luzerne à la fin de mai.)

1368. P. POLYGONI. *F.* Commun. Sous les pierres et en fauchant dans les endroits humides et voisins de l'eau. Mars à juillet. Dijon, contre-fossé au midi du Canal près du pont de la Colombière; au bas du mur au nord du clos de Pouilly. Flavignerot, dans la combe. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier.*)

1369. P. MELES. *F.* Commun. Dans les bois, en fauchant. Juin à septembre. Dijon, sur la barrière au-dessus de la gare; 21 avril. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. Gevrey. Etc. (Saint-Nicolas-les-Citeaux, forêt de Citeaux. — M. *Bourlier.*) (Beaune. — M. *Arias.*)

1370. P. PARCUS. *Sch.* Un exemplaire trouvé le 25 juin sur la *Vicia cracca* dans un chemin qui conduit du chemin de Talant à la route de Paris par le Val-Suzon.







1371. P. CONSTANS. *Ziegl.* (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune; pas commun. — M. *Arias.*)

1372. P. NIGRIROSTRIS. *F.* Commun. Sur différentes plantes et arbrisseaux et en fauchant dans les bois. Mars à juin. Dijon, dans les jardins et sur les murs des maisons; au Parc, sous les écorces de platane, en fauchant et sur les feuilles d'*Arum*. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Flavignerot. Etc. (Rouvray; pas commun. — M. *Emy.*) (Beaune; sous les meules de foin; octobre. — M. *Bourlier.*) Trouvé aussi par MM. *Arias* et *André.*)

1373. P. GLOBOSUS. *Dej.* (D'après M. *Chevrolat.*) Un seul exemplaire trouvé par M. *Bourlier* en mai, sous une pierre, sur une montagne près de Larocheport.

PLINTHUS. *Germ.*

1374. P. CALIGINOSUS. *F.* Pas commun. Dans les endroits un peu humides et ombragés, sous les pierres et les débris. Du 24 mars au 29 mai. Dijon, au Parc, sous les débris au pied des arbres, sous les écorces des souches près de terre, sous un tronc d'arbre abattu; j'ai également trouvé plusieurs exemplaires de cette espèce, vivants et bien conservés, dans l'estomac de crapauds recueillis le soir en mai dans l'allée circulaire de cette promenade; au bas du mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles sèches et sous les pierres. Flavignerot, dans la combe. Fixin, près de la ferme de la Fortelle. Chambolle. Mâlain, près du viaduc, au bord du ruisseau. (Rouvray. — M. *Emy.*)

MOLYTES. *Sch.*

1375. M. CORONATUS. *Latr.* Commun. Au Parc, en fauchant sur les *Anthriscus sylvestris*, à l'ombre. Mai. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

1376. M. GLABRATUS. *F.* Rare. Par terre dans les bois et

les pâturages. Juin. (Dijon ; montagne Saint-Joseph ; juillet. — M. *Nodot*.) Plombières, Combe-aux-Serpents ; embranchement se dirigeant du côté de la ferme de la Cras ; chemin de Plombières à Velars, sous des noyers près de l'Ouche. (Fixin ; mai. — M. *Tarnier*.) Gevrey, au-dessus du plateau du bois de Château-Renard. Chambolle, dans la combe, avant la bifurcation.

ANISORHYNCHUS. *Sch.* — MOLYTES. *Sch.*

1377. A. *BAJULUS*. *Oliv.* Pas rare. Sous les pierres, par terre et sur les feuilles des branches basses des buissons, le long des chemins. Avril, mai, juin. Dijon, chemins de Daix, de Fontaine, de Corcelles-les-Monts, etc. (Beaune. — MM. *Arias* et *André*.)

LEIOSOMUS. *Kirby.* — MOLYTES. *Sch.*

1378. L. *OVATULUS*. *Clairv.* Pas très-commun. Dans les endroits humides et voisins de l'eau, sous les pierres et en fauchant. Du 22 mars au 10 octobre. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés ; bord de l'Ouche près du moulin Vesson. Plombières, combe de Neuvois à Darois. Mâlain, au bord du ruisseau près du viaduc. Blaisy-Bas. (Rouvray ; rare. — M. *Emy*. Indiqué, sans doute par erreur, sous le nom spécifique de *Cribrum*.) (Beaune ; bord de la Bouzaise, au pied des saules et des peupliers, sous les pierres ; 16 mars. — M. *Bourlier*.)

HYLOBIUS. *Sch.*

1379. H. *ABIETIS*. *Linn.* Rare. Dijon, dans les rues de la ville et dans les cours. Du 21 mai au 19 juin. (Beaune ; pas commun. — M. *Arias*.)





TANYSPHYRUS. *Germ.*

1380. T. LEMNÆ. *Payk.* (Beaune; sous les pierres au bord d'une mare, près de la gare; 14 avril. — M. *Péragallo*. Trouvé aussi par M. *André*.)

LEPYRUS. *Germ.*

1381. L. COLON. *Linn.* Commun. Dans les bois humides sur le saule Marceau. Fin avril, mai, juin. Fixin, bois près du chemin de fer. Saint-Nicolas-les-Citeaux. Etc. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

1382. L. BINOTATUS. *F.* Commun. Au bord des ruisseaux sur les saules, et dans les bois humides sur le saule Marceau. Fin avril, mai, juin. Dijon, chemins hors la porte Saint-Bernard, sous des pierres; cours de Suzon près de la route d'Auxonne. Plombières, près du viaduc de Neuvon, par terre sur le chemin; 20 avril. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Etc. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

MINYOPS. *Sch.*

1383. M. VARIOLOSUS. *F.* Pas rare. Par terre au bord des chemins. Avril, mai. Dijon, cours du Parc, par terre près des fossés; chemins des environs de la ville. Plombières, combe de Neuvon, dans la partie cultivée. (Beaune. — M. *André*.)

BARYNOTUS. *Germ.*

1384. B. OBSCURUS. *F.* Pas commun. Sous les pierres et par terre dans les lieux un peu humides. (Dijon; près de l'Ouche; mai. — M. *Nodot*.) Baume-la-Roche, montée du souterrain de Blaisy; sous les pierres; 13 avril. (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *Péragallo*.)

1385. B. MØRENS. *F.* — ELEVATUS. *Marsh.* (Rouvray ; rare ; en mai 1834, sur le pont Brula. — M. *Emy.*) (Savigny près Beaune ; rare. — M. *Pérangolo.*)

1386. B. SQUALIDUS. *Sch.* (Savigny près Beaune ; très-rare. — M. *Pérangolo.*)

LIOPHLOEUS. *Germ.*

1387. L. NUBILUS. *F.* Pas rare. Par terre et sur les plantes dans les endroits un peu humides. Mai, juin. Dijon, au Parc en fauchant ; trouvé aussi le 24 mars sous une écorce de charme abattu ; près du bord de l'Ouche. Marsannay-la-Côte, combe Pernelle. (Fixin. — M. *Tarnier.*) Etc. (Châtillon-sur-Seine. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Arias.*)

ALOPHUS. *Sch.*

1388. A. TRIGUTTATUS. *F.* Pas rare. Sur les chemins dans les lieux un peu humides. Mai. Environs de Dijon. Perrigny. Etc. (Rouvray ; rare. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier.*)

GRONOPS. *Sch.*

1389. G. LUNATUS. *F.* Rare. Dijon, dans la ville sur un mur ; octobre ; barrière au-dessus du débarcadère près de l'Asile des aliénés ; quelques exemplaires, du 17 mai au 30 juin. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune ; sur un mur dans la ville ; 20 mai. — M. *André.*)

PACHYGERUS. *Gyll.*

1390. P. VARIUS. *Herbst.* Rare. Environs de Dijon.

1391. P. SCABROSUS. *Dej.* (Rouvray ; rare. — M. *Emy.*)







CLEONUS. Sch. — CLEONIS. Meg.

1392. C. MARMORATUS. *F.* Commun. Sur l'*Achillæa millefolium*. Juillet, août. Dijon, chemin de Marsannay-la-Côte; bord du Canal du côté de Plombières. (Beaune, sur les chemins le long des fossés; mai. — M. *Bourlier*. Trouvé aussi par MM. *Arias* et *André*.)

1393. C. OPHTHALMICUS. *Rossi*. Commun. Par terre sur les chemins, au grand soleil, quelquefois sous les pierres. Fin avril, mai. Dijon, chemin au midi du clos de Montmuzard, chemin de Corcelles-les-Monts, chemin entre Saint-Joseph et Gouville, etc. (1). (Fixin. — M. *Tarnier*.) (Rouvray; rare. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

1394. C. OBLIQUUS. *F.* Pas commun. Par terre sur les chemins. Fin mars, avril, mai. Dijon, chemin de Corcelles, chemin de Saint-Apollinaire, etc. (Fixin, dans la combe. — M. *Tarnier*.) (Beaune; rare. — M. *Arias*.)

1395. C. TRISULCATUS. *Herbst*. Rare. Dijon, petit chemin de Ruffey, en fauchant au bord des prés; 22 juin. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1396. C. GRAMMICUS. *Panz*. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune, rare; sur les chemins le long des fossés; mai. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

1397. C. COSTATUS. *F.* (Beaune. — M. *Arias*.)

1398. C. CINEREUS. *Schrank*. Pas rare. Sur les chemins. Fin mars, avril, mai. Dijon, chemin des Perrières; chemin de Corcelles-les-Monts; Combe-aux-Serpents; etc. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1399. C. ALTERNANS. *Oliv*. Pas rare. Sur les chemins.

---

(1) M. *Vallot*, dans son mémoire cité à la note relative au n° 1388, indique cette espèce parmi celles qui sont nuisibles à la vigne. Cette assertion me semble peu conforme aux habitudes de cet insecte, qu'on trouve beaucoup plus communément dans les champs découverts et au bord des chemins que dans le voisinage des vignes.

Mai, juin. Dijon, chemin de Marsannay-la-Côte, chemin de Corcelles, etc. (Rouvray ; pas commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourtier et André.*)

1400. C. PALMATUS. *Oliv.* Pas commun. Sous les pierres, par terre et sur les plantes. Janvier, mai, septembre. Dijon, au bord des chemins ; chemin au-dessus du coteau nord de la combe Saint-Joseph. Chambolle. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias et André.*)

1401. C. SULCIROSTRIS. *Linn.* Commun. Sous les pierres, par terre sur les chemins, sur les chardons, etc. Mai, juin. Dijon, chemins autour de la ville. Gevrey. (Beaune. — MM. *Arias, Bourtier et André.*)

1402. C. PLIGATUS. *Oliv.* Rare. Environs de Dijon. (Dijon, chemin de Fontaine vers le cimetière des juifs, sous les pierres ; août. — M. *Nodot.*)

1403. C. ALBIDUS. *F.* (Rouvray ; fort rare. — M. *Emy.*)

#### METALLITES. *Sch.*

1404. M. AMBIGUUS. *Sch.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

#### POLYDRUSUS. *Germ.* — POLYDROSUS. *Sch.*

1405. P. UNDATUS. *F.* Commun. Dans les bois de la plaine, en fauchant, principalement dans les endroits couverts sur les noisetiers. Du 18 avril au 19 juin. Dijon, barrière au-dessus du débarcadère. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant et sur la barrière. Saint-Nicolas-les-Citeaux. (Rouvray ; pas commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourtier et André.*) (Serrigny, bois de Lépenot ; 6 juillet. — M. *Bourtier.*)

1406. P. PLANIFRONS. *Dej.* Pas rare. Dans les bois en fauchant. Du 30 avril au 15 juin. Dijon, chemin de Daix, sur des feuilles de prunellier ; Combe-aux-Serpents. Talant,





sur l'*Erysimum lanceolatum*. Marsannay-la-Côte. Flavignerot. Chambolle. (Rouvray. — M. Emy.)

1407. P. IMPRESSIFRONS. *Dej.* Assez commun. Dans les bois en fauchant. Du 30 avril au 4 juin. Dijon, sur des osiers au bord d'une vigne hors la porte Saint-Bernard; chemin de Mirande par les Petites-Roches, aussi sur des osiers. Marsannay-la-Côte. Flavignerot. Gevrey. Chambolle. (Beaune. — MM. Arias et André.)

1408. P. FLAVIPES. *De Géer.* Rare. Environs de Dijon. (Villenote, près Semur. — M. Lombard.)

1409. P. PTERYGOMALIS. *Sch.* Très-commun. Dans les bois sur les feuilles, principalement celles de chêne. Du 24 avril au 7 juin. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. Chambolle. Etc. (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1410. P. CERVINUS. *Linn.* Commun. Dans les bois sur les feuilles. Mai. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Fixin. Chambolle. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1411. P. CHRYSOMELA. *Oliv.* (Environs de Dijon. — M. Tarnier.) (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune; rare. — M. Arias.)

1412. P. SPARSUS. *Dahl.* Trouvé un exemplaire le 20 mai, en fauchant à Gevrey, au bord du petit étang de Satenay. Pas rare à Villenote, sur les haies qui entourent les prés; août, septembre. (Rouvray; juin, juillet; sur les osiers sauvages (1) au bord du Serein, en bas de Montberthaud. — M. Emy.)

1413. P. SERICEUS. *Schaller.* Très-commun. Dans les bois, sur les feuilles, surtout celles de chêne; du 30 avril au

---

(1) Je ne sais quelle est cette plante, sur laquelle j'ai demandé des éclaircissements à M. Emy. Il m'a répondu que c'était une petite espèce d'osier appelée *Pressin* dans le pays

8 juillet, sur les haies au bord des chemins. Dijon, au Parc; chemin de Daix; etc. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot. Marsaunay-la-Côte. Gevrey. Chambolle. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1414. P. MİCANS. *F.* Commun. Dans les bois, sur les feuilles de chêne. Du 30 avril au 5 juin. Flavignerot. Marsaunay-la-Côte. Velars-sur-Ouche. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey. Chambolle. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune; pas commun. — MM. Arias et André.)

SITONES. *Sch.* — SITONA. *Germ.*

1415. S. GRISEUS. *F.* Variété GRESSORIUS. *Germ.* (Rouvray; rare. — M. Emy.)

1416. S. CINERASCENS. *Sch.* Pas commun. Mai. Dijon, sur la barrière au-dessus de la gare. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, en fauchant dans la forêt de Cîteaux.

1417. S. REGENSTEINENSIS. *Herbst.* Pas rare. Villenote, près Semur; en fauchant, à l'ouest du bois de Champeaux; septembre. (Rouvray. — M. Emy.)

1418. S. TIBIALIS. *Herbst.* Pas commun. Environs de Dijon. La Rochette, près Oisilly, en fauchant sur les prés au bord de la Vingeanne; mai. (Villenote, près Semur. — M. Lombard.) (Beaune, en fauchant sur les champs de blé. Serrigny, bois de Lépenot; 6 juillet. — M. Bourlier.)

1419. S. SULCIFRONS. *Thunberg.* Commun. Sous les pierres et en fauchant dans les champs de luzerne, de fèves, au bord des chemins et dans les bois. Avril à juillet; septembre, octobre. Environs de Dijon, chemins autour de la ville, bois des environs; barrière au-dessus de la gare. Collonges-les-Premières. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Villenote, près Semur, bord du bois de Champeaux, en fauchant. (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)







1420. *S. CRINITUS*. *Oliv.* Commun. Sur les chemins, par terre, sur et sous les pierres, etc.; dans les bois, en fauchant. Avril, mai, juin, août, novembre. Dijon, chemins autour de la ville, barrière au-dessus du débarcadère. Plombières, sur le viaduc de Neuvon, et dans les combes en fauchant. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, entre les deux étangs de Satenay, dans la mousse, au pied d'un peuplier. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1421. *S. OCTOPUNCTATUS*. *Germ.* Commun. En fauchant, au bord des chemins et dans les bois. Été, automne. Dijon, bois des environs. Collonges-les-Premières, entre le village et le Bois-le-Duc. Villenote, bord du bois de Champeaux. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1422. *S. DISCOIDEUS*. *Meg.* (Environs de Dijon. — M. *Tarnier*.) (Beaune, sous les meules de foin. — M. *Bourlier*. Trouvé aussi par M. *André*.)

1423. *S. PROMPTUS*. *Sch.* Commun. Sur les chemins sous les pierres et par terre, et en fauchant dans les bois. Printemps, automne. Dijon, chemins autour de la ville, barrière au-dessus du débarcadère. Villenote, bord du bois. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.) (Serrigny, bois de Lépenot; 6 juillet. — M. *Bourlier*.)

1424. *S. LINEATUS*. *Linn.* Très-commun. Sous les écorces, sous les pierres, sur les chemins, sur les murs, en fauchant, surtout sur les champs de fèves et au bord des fossés, etc. Printemps, automne, hiver. Dijon, au Parc sous les écorces de platane; sur les chemins autour de la ville; barrières du chemin de fer; sur les murs des maisons; au bas du mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles sèches. Collonges-les-Premières, sur les fèves. Plombières, combes de Neuvon, entre les siliques d'*Astragalus glycyphyllos*; octobre. Saint-Nicolas-les-Citeaux. Villenote, bord du bois. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

1425. *S. HISPIDULUS. F.* Commun. Sous les pierres, au bord des chemins et dans les bois en fauchant. Printemps, été, automne. Dijon, chemins autour de la ville; au bas du mur du Parc, du côté de Longvic. Plombières, combe de Neuvon. Etc. (Beaune. — M. Bourlier.)

1426. *S. PUNCTICOLLIS. Kirby.* (Beaune. — M. Arias.)

TANYMECUS. *Germ.*

1427. *T. PALLIATUS. F.* Pas rare. Dans les prés et les endroits humides, en fauchant et sous les pierres. Avril à juillet. Dijon, près du bord de l'Ouche; au Parc, sur les *Anthriscus sylvestris*. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Baume-la-Roche, au-dessus de la montée du tunnel de Blaisy. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, bord de la forêt de Cîteaux. — M. Bourlier.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.) (Serrigny, bois de Lépenot. — M. Bourlier.)

EUSOMUS. *Germ.*

1428. *E. OVULUM. Ill.* Pas rare. En fauchant sur les orties au bord des prés et des chemins. Mai, juin. Dijon, près du bord de l'Ouche; fontaine de Larrey; chemin de Marsannay-la-Côte; au Parc; etc. Gevrey, dans la combe. Plombières, combe de Neuvon. (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

SCIAPHILUS. *Sch.*

1429. *S. MURICATUS. F.* Pas rare. En fauchant dans les endroits ombragés. Du 30 avril au 5 octobre. Dijon, au Parc sur les *Anthriscus sylvestris*. Ahuy, près de Suzon. Plombières, combe de Neuvon. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Villenote, sur les haies et au bord du bois de Champeaux. (Rouvray; pas commun. — M. Emy.)





(Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.) (Serrigny, bois de Lépenot. — M. *Bourlier*.)

STROPHOSOMUS. *Bilberg*. — CNEORHINUS. *Sch*.

1430. S. CORYLI. *F*. Commun. Dans les bois couverts, principalement sur le noisetier. Mai, juin, juillet. (Dijon, au Parc, sur les ombellifères. — M. *Tarnier*.) Fixin, bois près du chemin de fer. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Villenote, 24 septembre. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *André*.) (Serrigny, bois de Lépenot. — M. *Bourlier*.)

Variété AFFINIS. *Dej*. (Rouvray; commun. — M. *Emy*.)

1431. S. OXYOPS. *Sch*. (Beaune. — M. *André*.)

1432. S. FABER. *Herbst*. Pas commun. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant, 8 juin. (Rouvray; rare. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1433. S. LIMBATUS. *F*. (Dijon; mai; en fauchant. — M. *Nodot*.)

1434. S. HISPIDUS. *Sch*. Rare. Sous les pierres. Dijon, coteau au nord de la combe Saint-Joseph; 14 octobre.

1435. S. HIRTUS. *Sch*. Un seul exemplaire. Fixin, bois près du chemin de fer, sous des ételles humides, dans une coupe en exploitation; 21 mai.

CNEORHINUS. *Sch*.

1436. C. GEMINATUS. *F*. (Rouvray. — M. *Emy*.)

THYLACITES. *Germ*.

1437. T. GUINARDI. *Jacq. Duv*. Très-rare. Chambolle, sous les feuilles tombées au pied des conifères, dans un jardin; octobre.

RHAMPHUS. *Clairv.*

1438. R. FLAVICORNIS. *Clairv.* Pas rare. Dans les bois en fauchant, principalement sur l'épine blanche, *Cratægus oxyacantha*. Mai, juin, juillet, 2 août. Dijon, fontaine de Larrey, sur une haie vive. Plombières, combe de Neuvon. Marsannay-la-Côte, près de Gouville. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Chambolle. Saint-Nicolas-les-Citeaux. Etc. (Rouvray; sur l'osier sauvage; très-commun. — M. *Emy.*)

1439. R. ÆNEUS. *Dej.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Serrigny, bois de Lépenot; un exemplaire pris en fauchant le 3 juillet. — M. *Bourlier.*)

APION. *Herbst.*

1440. A. POMONÆ. *F.* Commun. Dans les jardins et dans les bois, sur les feuilles d'arbres; quelquefois sous les écorces en hiver. Avril, mai, juin, septembre. Dijon, Jardin botanique et dans les jardins de la ville; au Parc; au bas du mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles sèches. Fixin. Plombières. Chambolle. Villenote. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune; sous les écorces d'arbres morts; 29 mars. — M. *Bourlier.* Trouvé aussi en fauchant par MM. *Arias, Bourlier et André.*)

1441. A. CRACCÆ. *Linn.* Commun. En fauchant dans les bois, sur différentes plantes, notamment les *Vicia*; sur les haies; etc. Avril à octobre. Dijon, au bas du mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles sèches; 15 avril. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Citeaux. La Rochette, près Oisilly. Villenote. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*)

1442. A. SUBULATUM. *Kirby.* Très-commun. En fauchant







dans les bois couverts. Avril à juillet. Plombières, combes de Neuvon, en fauchant et sur la *Vicia sepium*. Fixin, bois entre le chemin de fer et la voie romaine. Etc. (Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Serrigny, bois de Lépenot. — M. Bourlier.) (Beaune. — M. André.) (Rouvray. — M. Emy.)

1443. A. OCHROPUS. *Germ.* Pas commun. En fauchant dans les bois couverts. Fin avril à août. Fixin, dans la combe et dans le bois près du chemin de fer. Blaisy-Bas. Plombières, combes de Neuvon, en fauchant et sur la *Vicia sepium*. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune. — M. André.)

1444. A. CONFLUENS. *Kirby*. Pas commun. Villenote, près Semur, en battant les haies qui entourent les prés; septembre.

1445. A. STOLIDUM. *Germ.* (Rouvray. — M. Emy.)

1446. A. IMMUNE. *Kirby*. — BETULÆ. *Chevr.* Pas rare. Villenote, en battant les haies autour des prés, et en fauchant sur la lisière du bois de Champeaux; septembre, octobre.

1447. A. VICINUM. *Kirby*. Rare. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant; 22 juillet. Plombières, combe de Neuvon à Darois; 2 août. (Beaune, en fauchant le long d'un ruisseau; 30 juin. — M. Bourlier.)

1448. A. ATOMARIUM. *Kirby*. Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Beaune; un exemplaire. — M. André.)

1449. A. PENETRANS. *Germ.* (Un seul exemplaire. Villenote, près Semur. — M. Lombard.)

1450. A. BASICORNE. *Ill.* Rare. Villenote, près Semur, à l'est du bois de Champeaux; commencement d'octobre.

1451. A. TENUE. *Kirby*. Pas rare. En fauchant dans les bois couverts. Juin, juillet, août. Plombières, combes de Neuvon. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant et sous les détritrus. (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1452. A. *ÆNEUM*. *F.* Pas rare. Dijon, sur l'*Althæa rosea*, dans les jardins autour de la ville, mai; Jardin botanique, octobre; sur la barrière au-dessus du débarcadère, juin, octobre; près du bord de l'Ouche, mai. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant, mai. (Plombières, Neuvon, chez M. Feuchot, très-commun. — M. *Dudrumel.*) (Rouvray; rives du Serein, sur la mauve musquée; juillet. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier.*)

1453. A. *RADIOLUS*. *Kirby*. Très-commun. Sur différentes espèces des genres *Malva* et *Althæa* cultivées dans les jardins, notamment l'*Althæa rosea*. Mai à juillet, octobre. Dijon, jardins dans la ville; Jardin botanique; barrière au-dessus du débarcadère, mars, avril. Villenote, sur les haies et au bord du bois; septembre. (Rouvray. — M. *Emy.*) Beaune. — MM. *Arias* et *André.*)

1454. A. *ONOPORDI*. *Kirby*. Pas rare. Sur le *Carduus nutans* et d'autres espèces de chardons, surtout sur l'*Onopordon acantium*. Du 7 avril au 6 octobre. Dijon, Jardin botanique, commun sur différentes espèces de plantes des genres *Onopordon*, *Cynara*, *Carduus*, *Cirsium*, *Lappa* et *Alfredia*; Vieux-Suzon, sur le *Carduus nutans* et le *Cirsium lanceolatum*; chemins de Talant et de Fontaine, sur l'*Onopordon acantium*. Talant. Villenote, près Semur, bord de la route de Pouillenay, sur le *Cirsium arvense*. (Rouvray. — M. *Emy.*)

1455. A. *GIBBIROSTRE*. *Gyll*. Pas commun. Dans les bois, en fauchant. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux; 19 juin. Gevrey, bord du petit étang de Satenay; 23 juillet.

1456. A. *SETIFERUM*. *Sch*. Un seul exemplaire, trouvé en fauchant dans la combe de Neuvon à Darois, le 27 juillet. (Rouvray; bois de Montberthaud, assez commun en fauchant sur les bruyères; toute la belle saison. — M. *Emy.*) (Beaune, bois de Battaut, en fauchant; juin; trois exemplaires. — M. *Bourlier.*)





1457. A. LEVIGATUM. *Kirby*. — BRUNNIPES. *Sch*. Pas rare. Villenote, près Semur, en battant les branches sur la lisière du bois de Champeaux ; septembre, octobre.

1458. A. ACICULARE. *Germ*. Un seul exemplaire. Darois, dans la combe qui conduit à Neuvon, en fauchant ; 26 juin. (Beaune, en fauchant au bord d'un fossé, le long d'un chemin ; 1<sup>er</sup> juin ; un exemplaire. — M. *Bourlier*.)

1459. A. BREVIROSTRE. *Herbst*. Pas rare. En fauchant dans les bois, dans les endroits ombragés. Juin. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Flavignerot. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1460. A. PALLIPES. *Kirby*. Rare. Environs de Dijon. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant ; 2 août. (Beaune. — M. *Bourlier*.)

1461. A. FUSCIROSTRE. *F*. Rare. Villenote, près Semur, bord du bois de Champeaux, à l'ouest, en fauchant ; septembre. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1462. A. DIFFICILE. *Herbst*. Pas rare. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux, près de la Chocelle ; en fauchant, sur une espèce de genêt ou d'*Ononis* ; mai à juillet. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.) (Vauchignon, en fauchant ; mai. — M. *Bourlier*.)

1463. A. GENISTÆ. *Kirby*. Un seul exemplaire. Environs de Dijon. Un autre trouvé par M. *Lombard*, probablement aux environs de Villenote.

1464. A. RUFIROSTRE. *F*. Rare. Je n'ai trouvé cette espèce que sur la barrière au-dessus de la gare de Dijon les 16 mai et 9 juin. (Beaune. — M. *André*.)

1465. A. FULVIROSTRE. *Sch*. Deux exemplaires seulement, tous deux mâles, trouvés à Curley, dans le bois des Liards, en fauchant dans un jenne taillis, le 19 mai. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1466. A. FLAVOFEMORATUM. *Herbst*. Très-rare. Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cette espèce à Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans la forêt de Cîteaux, en fauchant, le

19 juin. Un autre exemplaire a été trouvé à Villenote par M. Lombard.

1467. A. MALVÆ. *F.* Pas rare. Sur les mauves, dans les jardins. Mai. Dijon, barrière au-dessus du débarcadère, 23 avril; jardins dans la ville. (Beaune. — M. Bourlier.)

1468. A. VERNALE. *F.* Pas rare. Dans les prés, en fauchant. Mai à juillet. Dijon, prés au bord de l'Ouche; fontaine de Larrey; hors la porte Saint-Bernard, sous les pierres, du 12 au 31 mars. (Rouvray; pas commun. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1469. A. VICIÆ. *Payk.* Très-commun. Dans les haies et les bois couverts, en fauchant, surtout sur la *Vicia cracca*. Mai, juin. Dijon, chemin entre celui de Talant et la route de Paris par le Val-Suzon. La Rochette, près Oisilly. Plombières, combes de Neuvon. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. Emy.)

1470. A. DIFFORME. *Germ.* Rare. Villenote, en fauchant au bord du bois de Champeaux; septembre. (Beaune; un seul exemplaire. — M. André.)

1471. A. VARIPES. *Germ.* Commun. Dans les bois, en fauchant. Juin, septembre, octobre. Plombières, combes de Neuvon. Villenote, bord du bois de Champeaux. (Serrigny, bois de Lépenot, en battant des fagots; 3 juillet. — M. André.)

1472. A. APRICANS. *Herbst.* Très-commun. En fauchant, principalement dans les bois; l'hiver, sous les pierres. Mai, juin, septembre, octobre. Dijon, dans la ville, sur les murs, 4 avril; au bas du mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles sèches, 15 avril. Corcelles-les-Monts, Combe-aux-Serpents, sur un saule Marceau. Marsannay-la-Côte. Plombières, combes de Neuvon. La Rochette, près Oisilly, en fauchant sur les prés au bord de la Vingeanne. Villenote. (Pontailler-sur-Saône. — M. Dudrumel.) (Beaune, sous les pierres, mars; sous les meules de foin, octobre; en fau-







chant, l'été. — MM. *Arias, Bourlier et André.*) (Vauchignon. — M. *Bourlier.*)

1473. A. FLAVIPES. *F.* Pas rare. En fauchant dans les bois. Fin mai à septembre. Plombières, combe de Neuvon. Villenote, bois de Champeaux. (Beaune, en fauchant sur le blé lorsqu'il est encore court, sur la luzerne, et au bord des fossés le long des chemins. — MM. *Bourlier et André.*) (Serrigny, bois de Lépenot. — M. *Bourlier.*)

1474. A. ÆSTIVUM. *Germ.* Très-commun. En fauchant, le long des chemins, dans les prairies naturelles et artificielles et dans les bois; l'hiver sous les pierres et les écorces. Janvier, avril à octobre. Dijon, au Parc sous les écorces et sur une souche; près du bord de l'Ouche; dans les champs de luzerne; sous les pierres au bord des chemins du côté de Fontaine; au bas du mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles sèches. La Rochette, près Oisilly, près au bord de la Vingeanne. Plombières, combe de Neuvon. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Etc. (Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. — M. *Bourlier.*) (Pontailler. — M. *Dudrumel.*) (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

1475. A. ASSIMILE. *Gyll.* Pas commun. En fauchant, surtout dans les bois humides. Mai à juillet. Quelquefois à Dijon, dans la ville sur les murs. Villenote, bord du bois de Champeaux en fauchant; septembre. Collonges-les-Prémières, Bois-le-Duc. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune. — M. *André.*)

1476. A. NIGRITARSE. *Kirby.* Commun. En fauchant, surtout dans les bois humides et les prés; l'hiver sous les pierres. Mai à septembre. Dijon, près du bord de l'Ouche. Plombières, combe de Neuvon. La Rochette, près Oisilly, dans les prés au bord de la Vingeanne. Villenote, près Semur. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*)

1477. A. MINIATUM. *Sahlb.* Pas rare. En fauchant dans les

prés humides et au bord des ruisseaux, principalement sur les *Rumex*. Mai à août. Dijon, près du bord de l'Ouche; Jardin botanique. Ahuy, bord de Suzon, sous une pierre; janvier. Plombières, combe de Neuvon. La Rochette, près Oisilly, dans les prés. Baume-la-Roche, montée du tunnel de Blaisy. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune; sous les meules de foin; octobre. — MM. Bourlier et Arias.)

1478. A. FRUMENTARIUM. Linn. Pas rare. En fauchant dans les lieux humides. Gevrey, bord du petit étang de Satenay; juin. Villenote, au bord du bois de Champeaux et sur les haies autour des prés; septembre. (Pontailleur-sur-Saône; octobre. — M. Dudrumel.) (Rouvray. — M. Emy.)

1479. A. GYLLENHALI. Kirby. Pas commun. Dans les bois couverts. Mai à juillet, septembre. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Blaisy-Bas. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Trouvé aussi près de Dijon, sur un chemin qui se trouve entre celui de Talant et la route de Paris par le Val-Suzon, sur la *Vicia cracca*; un exemplaire.

1480. A. SENIGULUS. Kirby. Très-commun. En fauchant, surtout dans les bois. Mai à octobre. Dijon, un exemplaire sur le parapet du Jardin botanique le long de la route de Plombières. Plombières, combes de Neuvon. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. La Rochette, près Oisilly, dans les prés au bord de la Vingeanne. Villenote, sur les haies et au bord du bois. (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1481. A. CIVIGUM. Germ. Peu commun. Villenote, bois de Champeaux, en fauchant; octobre. (Beaune. — M. Arias.)

1482. A. SALICIS. Chevr. (Rouvray. — M. Emy.)

1483. A. SUPERCILIOSUM. Gyll. Rare. Environs de Dijon.

1484. A. EBENINUM. Kirby. Rare. Dans les bois, en fauchant. Mai, juin, juillet. Flavignerot. Blaisy-Bas. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. (Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. — M. Bourlier.)





1485. A. ANGUSTATUM. *Kirby*. Pas rare. Dans les bois, en fauchant. Mai à septembre. Plombières, combes de Neuvon. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Collonges-les-Premières. Villenote. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1486. A. AFER. *Sch*. Pas rare. Environs de Dijon.

1487. A. MORIO. *Germ*. Pas rare. Dans les bois, en fauchant. Mai à septembre. Plombières, combes de Neuvon. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. (Beaune, sous une pierre au pied d'un arbre, près de la Bouzaise; mars. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1488. A. PLATALEA. *Germ*. Pas commun. Dans les bois en fauchant. Juin, août, septembre. Plombières, combe de Neuvon. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant et sous les détritrus.

1489. A. ERVI. *Kirby*. Commun. Dans les bois, en fauchant. Mai à septembre. Dijon, chemin entre celui de Talant et la route de Paris par le Val-Suzon, sur la *Vicia cracca*. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. Plombières, combes de Neuvon. Fixin, bois près du chemin de fer. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant et sous les détritrus. Villenote, bord du bois de Champeaux.

La variété LYTHRI se trouve plus rarement.

1490. A. MELILOTI. *Kirby*. Commun. En fauchant, surtout dans les bois. Mai à juillet. Dijon, au bas du mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles sèches; sur la barrière au-dessus du débarcadère, avril; Vieux-Suzon, sur un *Cirsium*. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. Fixin, bois près du chemin de fer. Blaisy-Bas. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

1491. A. VIRENS. *Herbst*. Pas rare. Dans les prés humides. La Rochette, près Oisilly, près au bord de la Vingeanne,

mai. Villenote, près Semur, près entre la route et le bois de Champeaux.

1492. A. PUNCTIGERUM. *Germ.* Très-commun. Dans les bois couverts en fauchant. Mai à septembre. Plombières, combes de Neuvon. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-Cîteaux, forêt de Cîteaux.

1493. A. SPENCEI. *Kirby.* Pas rare. Dans les bois couverts. Août, septembre. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Villenote, bois de Champeaux et sur les haies autour des prés.

1494. A. ÆTHIOPS. *Herbst.* Commun, surtout dans les bois humides en fauchant. Juin, juillet, septembre. Dijon, parapet du Jardin botanique, avril. Plombières, montagne entre les combes de Champmoron et de Neuvon, sur la navette; avril. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Blaisy-Bas. Collonges-les-Premières, en fauchant dans le Bois-le-Duc, et hors du bois sur des fèves. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. André et Bourlier.)

1495. A. LIVESCERUM. *Sch.* Rare. Environs de Dijon. Collonges-les-Premières, sur des fèves, juillet. (Beaune; juin. — M. Bourlier.)

1496. A. ASTRAGALI. *Payk.* Pas commun. Sur l'*Astragalus glycyphyllos*. Du 28 mai au 6 juillet. Dijon, chemin de Talant et chemin entre celui-ci et la route de Paris par le Val-Suzon. Plombières, combe de Neuvon, petit vallon dans la direction de la ferme du Fays, au bord du chemin, et dans la combe de Neuvon à Prenois, près de la fontaine.

1497. A. ELEGANTULUM. *Germ.* Pas très-commun. En fauchant, surtout dans les bois, mai, juin, juillet, 12 août. Dijon, dans la ville sur les murs et sur le parapet du Jardin botanique, avril; Jardin botanique sur un banc; fontaine de Larrey, sur un osier au bord d'une vigne. Talant, près du clos Echalié, sur le *Cynoglossum officinale*. Plombières,







combes de Neuvon. Flavignerot. Blaisy-Bas. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André.) (Vauchignon. — M. Bourlier.)

1498. A. VORAX. *Sahlb.* Pas commun. Dans les bois, en fauchant. Fin avril à juin, septembre. Dijon, au Parc, sur une branche morte tombée par terre, 7 avril. Plombières, combes de Neuvon, en fauchant et sur la *Vicia cracca*. Marsannay-la-Côte. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Villenote. (Beaune. — M. André.)

1499. A. PAVIDUM. *Germ.* Commun. Dans les bois couverts, en fauchant. Mai, juin, juillet, septembre. Dijon, sur la barrière au-dessus de la gare. Magny-sur-Tille, sur un *Cirsium*. Plombières, combes de Neuvon. Gevrey, bois près du petit étang de Satenay. Blaisy-Bas. (Beaune. — MM. Bourlier et André.) (Vauchignon. — M. Bourlier.)

1500. A. PIST. *F.* Commun. En fauchant, surtout dans les bois. Juin, septembre. Dijon, au vol le soir, par un temps très-chaud, sur un chemin du côté de Fontaine. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune, en fauchant sur la luzerne. — MM. Bourlier et Arias.)

1501. A. SORBI. *Herbst.* Rare. Je n'ai trouvé que deux exemplaires de cette espèce, tous deux à Dijon, en avril, l'un contre un mur dans la ville, et l'autre sur la barrière au-dessus du débarcadère. (Rouvray, bois de Montberthaud; juillet; rare. — M. Emy.) (Villenote, près Semur. — M. Lombard.)

1502. A. DISPAR. *Germ.* Pas commun. Villenote, près Semur, en battant les haies qui entourent les prés. Septembre.

1503. A. ATRATULUM. *Kirby.* Pas commun. Villenote, près Semur. Septembre.

1504. A. HUMILE. *Germ.* Pas commun. En fauchant, surtout dans les bois. Juillet, commencement d'août. Dijon, bord du Canal du côté de Plombières, sous une pierre au

pied d'un peuplier, 17 mars. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées, par terre. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1505. A. SEDI. *Germ.* Pas commun. Sur le *Sedum reflexum*. Juin, commencement de juillet. Fontaine-les-Dijon, dans le chemin qui conduit à celui d'Ahuy, sur les *Sedum*, au-dessus d'un petit mur. Plombières, combe de Neuvon, sur les *Sedum* qui croissent sur les petits rochers à gauche du grand chemin, un peu après le premier angle de ce chemin, et dans la coupe récente au-dessus de ces rochers.

1506. A. SIMUM. *Germ.* Pas commun. Combes de Neuvon, en fauchant; juin, commencement de juillet. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1507. A. MINIMUM. *Herbst.* Assez commun. Dans les bois humides, en fauchant. Mai à juillet. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Villenote, près Semur, bois de Champeaux. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *Bourlier*.)

1508. A. VIOLACEUM. *Kirby.* Commun. Dans les endroits humides, surtout les bois, en fauchant. Mai, juillet. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. La Rochette, près Oisilly, près au bord de la Vingeanne. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1509. A. MARCHICUM. *Herbst.* Un seul exemplaire trouvé à Collonges-les-Premières, en fauchant sur un champ de vesces.

1510. A. AFFINE. *Kirby.* Commun. Villenote, au bord du bois de Champeaux, en fauchant et en battant les haies autour des prés; septembre, commencement d'octobre.

1511. A. GLOBULIPENNE. *Dej.* (Rouvray. — M. *Emy*.)





NEMONYX. Redt. — RHINOMACER. F.

1512. N. LEPTUROIDES. F. Un seul exemplaire a été trouvé par M. Dudrumel, le 26 juin 1852, sur une fleur de *Raphanum*, au bord d'un champ, contre le chemin qui est entre les deux bureaux d'octroi de la porte Saint-Bernard.

RHYNCHITES. Herbst.

1513. R. AURATUS. Scop. Commun, surtout certaines années, sur le prunellier (*Prunus spinosa*), au bord des chemins. Du 10 juin au 16 juillet; trouvé une fois le 16 mai. Dijon, chemins autour de la ville, surtout celui de Daix et ceux qui sont entre celui de Fontaine et celui d'Ahuy; Combe-aux-Serpents. Plombières, petit chemin à droite de la route, avant d'arriver au village. Chambolle. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

J'ai observé souvent cette espèce pendant l'accouplement, et j'ai pu me convaincre que les mâles sont les exemplaires dont le prothorax est armé de chaque côté, à sa partie antérieure, d'une épine aigüe, caractérisés en outre par le rostre arqué, noir seulement à son extrémité, et par l'insertion des antennes plus près de la base que de l'extrémité du rostre; les femelles, au contraire, ont le prothorax mutique, le rostre droit, noir dans sa moitié antérieure, et les antennes insérées au milieu du rostre. J'étais déjà arrivé précédemment au même résultat par des dissections.

Cette observation, en ce qui concerne le prothorax épineux caractérisant le sexe masculin, s'applique par analogie aux autres espèces de ce genre chez lesquelles on rencontre des exemplaires à prothorax épineux et d'autres à prothorax mutique, telles que les *R. Bacchus*, *Populi* et *Betuleti*.

J'insiste sur ces différences sexuelles, à cause de l'erreur dans laquelle est tombé Gyllenhal dans le *Genera et species*

*Curculionidum* de Schonherr, tome I, p. 219; erreur rectifiée, il est vrai, au tome V, p. 325, 326 et 333 note, en ce qui concerne le prothorax, mais maintenue à la page 326, obs., relativement à l'insertion des antennes, et augmentée à cette même page d'une autre erreur sur la forme du rostre chez le *R. Auratus*.

1514. *R. RECTIROSTRIS*. *Sch.* Je n'ai jamais trouvé moi-même cette espèce, qui ne doit cependant pas être rare dans nos environs; elle a été trouvée au nombre de plusieurs exemplaires, il y a une vingtaine d'années, par M. Gros, décédé professeur au lycée de Bourg, sur des arbres fruitiers, dans un clos appartenant alors à M. Noel et situé sur le territoire de Dijon, au nord du chemin de Corcelles-les-Monts, vis-à-vis l'endroit où s'embranché le chemin qui conduit à la fontaine Sainte-Anne. Je sais également, par M. Tarnier, que plusieurs exemplaires de cette espèce ont été trouvés à Chenôve, sur des poiriers, dans un clos, à l'époque des vendanges, par M. Ph. Cousturier. (Beaune. — MM. Arias et André Un seul exemplaire chacun; sans indications.)

Cette espèce est très-voisine de la précédente, et il est très-facile de les confondre au premier aspect. La phrase comparative du *Genera et species Curculionidum* de Schonherr, t. I, p. 220, peut aussi contribuer à faire naître la confusion; les mots : *Magnitudo, statura et summa affinitas R. Aurati sed rostrum fere rectum*, signifient évidemment que le *R. Rectirostris* diffère du *R. Auratus* par son rostre presque droit, et par conséquent, implicitement du moins, que le rostre du *R. Auratus* est arqué. Trompé par cette phrase (que vient encore corroborer le nom spécifique de l'insecte et l'indication, donnée comme commune aux deux sexes, du point d'insertion des antennes sur le rostre et de la couleur de celui-ci), j'ai longtemps été dans l'erreur au sujet de ces deux espèces, ayant considéré comme les deux sexes de l'*Auratus* les mâles des deux espèces, et comme les deux sexes du *Rectirostris* les femelles de ces deux mêmes







espèces. C'est seulement après avoir observé l'accouplement chez le *R. Auratus*, comme je l'ai dit plus haut, que j'ai reconnu mon erreur.

Le *R. Rectirostris* est toujours plus robuste et a les pattes plus grosses que le *R. Auratus*; sa pubescence est moins fine, un peu moins longue, un peu couchée et blanche; sa couleur n'est pas cuivreuse comme chez ce dernier, mais bronzée; il a sur les élytres des rangées de points oblongs formant presque des fossettes, beaucoup plus gros, plus espacés et plus profonds que dans l'*Auratus*; enfin le mâle se distinguera toujours très-facilement de celui de cette dernière espèce par son prothorax mutique.

1515. *R. BAGCHUS*. *Linn.* Pas rare. Sur les prunelliers au bord des chemins; quelquefois l'hiver sous les écorces d'érable et de platane. Juin, juillet. Dijon, chemin de Daix, chemins entre celui d'Ahuy et celui de Fontaine; cours du Parc et intérieur de cette promenade. Plombières, sur le viaduc de Neuvon, octobre, 1<sup>er</sup> novembre. (Fixin; mai. — *M. Tarnier*.) (Beaune, sur la vigne et sous les écorces de poirier. — *M. Arias*.)

1516. *R. CUPREUS*. *Linn.* Très-rare. Dans les bois, en fauchant. Plombières, combe de Neuvon à Darois, 3 août. Fixin, bois près du chemin de fer, 21 mai.

1517. *R. ÆQUATUS*. *Linn.* Assez commun. Sur les plantes et les arbustes, notamment sur l'épine blanche et les fleurs de différents arbres fruitiers. Mai à juillet. Dijon, chemins du côté de Fontaine, sur le prunellier; au Parc, sur l'*Anthriscus sylvestris* et l'épine blanche. Fontaine-les-Dijon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Curley, bois des Liards. Chambolle, jardin de M. Piffond, sur les coignassiers en fleur. (Fixin; dans les vergers. — *M. Tarnier*.) (Rouvray; très-commun; battue des haies vives, au printemps. — *M. Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

1518. *R. OBSCURUS*. *Meg.* Commun. Dans les bois, sur les

jeunes pousses de chêne, surtout lorsque les bourgeons commencent à se développer. Du 30 avril au 3 juin. Velars-sur-Ouche. Plombières, sous une pierre, 11 avril. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bois du Chaignot. Chambolle. (Rouvray.— M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias et André.)

1519. R. PLANIROSTRIS. *F.* Un seul exemplaire pris aux environs de Dijon par M. Tarnier. Cette espèce a également été trouvée par M. J. Saintpère, probablement aux environs de l'Etang-Vergy.

1520. R. MEGACEPHALUS. *Germ.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Rouvray; rare — M. Emy.) (1).

1521. R. CONICUS. *Ill.* Commun. Dans les jardins, sur les

(1) Cette espèce et les cinq suivantes offrent des analogies dans la taille et la couleur qui rendent leur détermination difficile. Elles présentent cependant, dans les stries des élytres ou les rangées striales de points, des caractères différentiels constants et d'une application facile, mais dont, jusqu'à présent, les auteurs n'ont fait aucune mention. Je crois donc devoir présenter ici un tableau synoptique à l'aide duquel ces espèces pourront être reconnues d'une manière certaine.

- |                                                                                                                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A. Elytres sans striole juxta-scutellaire; intervalles distinctement et sérialemt ponctués. . . . .                                                    | <i>Conicus.</i>      |
| AA. Elytres ayant une striole juxta-scutellaire, soit entre la 1 <sup>re</sup> et la 2 <sup>e</sup> strie, soit entre la 1 <sup>re</sup> et la suture. |                      |
| B. Intervalles des élytres distinctement et sérialemt ponctués. . . . .                                                                                | <i>Megacephalus.</i> |
| BB. Intervalles des stries des élytres non distinctement ponctués.                                                                                     |                      |
| C. 9 <sup>e</sup> strie des élytres nulle dans sa moitié postérieure; pronotum déprimé, sillonné longitudinalement. . . . .                            | <i>Pauxillus.</i>    |
| CC. 9 <sup>e</sup> strie des élytres entière; pronotum subconvexe.                                                                                     |                      |
| D. Elytres ayant une striole à la base, entre les 9 <sup>e</sup> et 10 <sup>e</sup> stries. . . . .                                                    | <i>Minutus.</i>      |
| DD. Elytres sans striole entre les 9 <sup>e</sup> et 10 <sup>e</sup> stries.                                                                           |                      |
| E. Pubescence assez longue. Rostre plus long ou aussi long que la tête et le pronotum réunis. . . . .                                                  | <i>Fragariæ.</i>     |
| EE. Pubescence très-courte. Rostre plus court que la tête et le pronotum réunis. . . . .                                                               | <i>Nanus.</i>        |





haies vives, dans les bois. Du 24 avril au 26 juin. Dijon, au Parc, sous les écorces de platane, février, mars; chemin de Daix; Combe-aux-Serpents, sur l'alisier; et dans différents jardins. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte, dans la combe, sur les noisetiers. Fixin, bois près du chemin de fer. Chambolle. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1522. R. PAUXILLUS. *Germ.* Commun. Sur les haies vives, les arbres fruitiers et dans les bois, en fauchant. Fin avril, mai, juin. Dijon, chemin de Daix, sur les prunelliers dans les haies; chemins du côté de Fontaine; pépinières au nord de la ville, sur des coignassiers, pruniers et pommiers. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Fixin, bois près du chemin de fer. Etc. (Rouvray; pas commun. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1523. R. MINUTUS. *Herbst.* Commun. Dans les bois, en fauchant. Du 24 avril au 27 juillet. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Flavignerot. Corcelles-les-Monts, Mont-Afrique. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. (Beaune. — MM. André et Bourlier.)

1524. R. FRAGARIE. *Sturm.* Rare. Environs de Dijon.

1525. R. NANUS. *Payk.* Pas rare. Dans les bois de la plaine, en fauchant. Mai, juin, commencement de juillet. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. Fixin, bois près de la voie romaine. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. Emy.)

1526. R. POPULI. *Linn.* Commun. Sur les jeunes pousses de peuplier et de tremble, surtout dans les bois. Mai, juin, commencement de juillet. Dijon, bord du Canal, sur les pousses au pied des peupliers. Maguy-sur-Tille, bois de Malforêt. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Fixin, bois près du chemin de fer. Chambolle. Saint-Nicolas-les-Cîteaux,

forêt de Cîteaux. Etc. (Rouvray ; très-commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias* et *André.*)

1527. R. BETULETI. *F.* Commun. Sur différents arbres, surtout dans les bois et sur la vigne. Mai, juin. Dijon, chemin de la rente de Morvau, sur un cep de vigne. Chambolle, sur des noisetiers. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, très-commun sur le saule Marceau. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

1528. R. SERICEUS. *Herbst.* Pas rare. Dans les bois sur le chêne, dans les jeunes taillis. Du 26 mai au 16 juin. Plombières, combe de Neuvon. Marsannay-la-Côte. Gevrey, bois du Chaignot et de Château-Renard. Chambolle. Etc. (Rouvray ; pas commun. — M. *Emy.*) (Beaune ; rare. — M. *Arias.*)

1529. R. PARELLINUS. *Sch.* Très-rare. Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cette espèce, je crois aux environs de Chambolle, et M. *Tarnier* deux, qu'il m'a donnés et qu'il a trouvés aux environs de Fixin.

La patrie indiquée par Schonherr, dans son *Genera et species Curculionidum*, t. I, p. 224 (*Sibiria, Persia, Caucasus*), rend la découverte de cette espèce dans nos environs extrêmement intéressante.

1530. R. PUBESCENS. *F.* Pas rare. Dans les bois, sur les chênes dans les jeunes taillis. Du 20 mai au 20 juin. Velars-sur-Ouche, bois près du Crucifix. Plombières, coteaux de Neuvon. Marsannay-la-Côte, près de Gouville. (Fixin. — M. *Tarnier.*) Gevrey, bois du Chaignot et de Château-Renard. Chambolle. (Rouvray ; pas commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

1531. R. CAVIFRONS. *Sch.* Pas rare. Comme le précédent. Du 18 mai au 24 juin. Trouvé dans les mêmes localités que l'espèce précédente, excepté Fixin, Rouvray et Beaune, mais de plus à Velars, coteau au-dessus de la forge.

1532. R. COMATUS. *Dej.* Rare. Dans les bois des environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*)







1533. R. BETULÆ. *Linn.* Commun. Dans les bois, surtout sur les noisetiers. Fin avril, mai, juin. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Chambolle. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1534. R. ANGUSTULUS... (Rouvray. — M. Emy.)

ATTELABUS. *Linn.*

1535. A. CURCULIONIDES. *Linn.* Commun. Dans les bois sur les jeunes pousses de chêne. Mai, juin. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey. Chambolle. Etc. (Rouvray; pas rare. — M. Emy.) (Beaune. — M. Arias.)

J'ai trouvé, mais rarement, une variété de cette espèce dont les cuisses antérieures présentent une tache rouge bien marquée, et un seul exemplaire d'une autre variété dont toutes les cuisses sont rouges.

APODERUS. *Oliv.*

1536. A. CORYLI. *Linn.* — AVELLANÆ. *Linn.* Commun. Dans les bois sur le noisetier. Fin avril, mai. Marsannay-la-Côte. Fixin. Chambolle. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias et André.)

1537. A. INTERMEDIUS. *Ill.* Un exemplaire trouvé à Beaune par M. Bourlier, au mois de mai, sur une rose dans un clos au bord de la Bouzaise.

CHORAGUS. *Kirby.* — ALTICOPUS. *Villa. Sch.*

1538. C. SREPPARDI. *Kirby.* — GALEAZZI. *Villa. Sch.* (Rouvray; battue des haies sèches; fin de l'été; pas commun. — M. Emy.)

ANTHRIBUS. *Geoffr.*

1539. A. ALBINUS. *Linn.* Rare. Dijon, au Parc sur du bois de charme mort coupé et empilé; du 7 mai au 15 juin.

(Morvant, sur les vieux hêtres. — M. *Nodot.*) (Rouvray ; pas rare ; en battant les haies sèches. — M. *Emy.*)

PLATYRHINUS. *Clairv.*

1540. P. LATIROSTRIS. *F.* Rare. Sur les vieux troncs et les souches de hêtres coupés. Mai, juin, juillet. Dijon, dans la ville sur un morceau de hêtre carié qui se trouvait dans du bois à brûler ; au Parc sur du charme mort coupé. Flavignerot. (Plombières, combe de Neuvon à Darois, sur une vieille souche de chêne. — M. *Dudrumel.*) L'Etang-Vergy, sous une écorce de noyer abattu ; 20 octobre. (Savigny, près Beaune, Fontaine-Froide. — MM. *Arias* et *Péragallos.*) (Morvant ; sur les vieux hêtres. — M. *Nodot.*) (Rouvray ; sur les vieux hêtres ; pas rare. — M. *Emy.*)

TROPIDERES. *Sch.*

1541. T. ALBIROSTRIS. *Herbst.* Pas commun. Sur le bois mort. Du 9 mai au 24 juin. Dijon, dans la ville sur une maison, 9 août ; sur la barrière au-dessus du débarcadère. Flavignerot, en fauchant. Fixin, bois près du chemin de fer, sur du bois coupé, en fauchant, et sur la barrière du chemin de fer. Curley, bois des Liards, sur un hêtre abattu. (Rouvray ; rare ; battue des haies sèches. — M. *Emy.*)

1542. T. UNDULATUS. *Panz.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

1543. T. SEPICOLA. *Herbst.* — EPHIPPIMUM. *Dej.* Un exemplaire trouvé aux environs de Dijon par M. *Tarnier.* (Beaune ; sous une écorce ; février. — M. *André.*) (Savigny, près Beaune, Fontaine-Froide ; rare. — M. *Arias.*) (Rouvray ; en battant les haies sèches ; pas commun. — M. *Emy.*)

1544. T. CINCTUS. *Payk.* (Rouvray ; battue des haies sèches ; assez rare. — M. *Emy.*)

1545. T. NIVEIROSTRIS. *F.* Rare. Sur le bois mort. Mai, juin. Dijon, au Parc, sur du bois coupé ; (même endroit, sous l'écorce d'un arbre sur pied ; février. — M. *Nodot.*) Fixin,





bois près du chemin de fer, sur la barrière et en fauchant. (Rouvray ; en battant les haies sèches ; commun. — M. Emy.)

BRACHYTARSUS. Sch.

1546. B. SCABROSUS. F. Pas commun. Sous les écorces d'arbres sur pied et vivants. Fin février, mars, avril. Dijon, sous des écorces de noyer autour de la ville ; route de Langres, sous des écorces de frêne ; au-dessus de la fontaine de Larrey, sous les écorces des sycomores autour de la table de pierre ; cours du Parc, sur une feuille de tilleul ; barrière au-dessus du débarcadère, 9 mai. (Fixin ; au vol ; 4 mai. — M. Tarnier.) (Rouvray ; assez rare ; trouvé cependant en assez grande quantité le 29 avril 1840, sur les osiers sauvages au bord du Serein. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias et André.)

M. Vallot (*Annales des Sciences naturelles*, 1828, t. XIII, p. 68), a donné quelques détails très-intéressants sur le genre de vie de cet insecte, qu'il désigne sous le nom d'*Anthribus marmoratus*. Ayant observé au mois d'avril (1), sur des tiges de *Spiræa salicifolia*, des tubercules de la grosseur d'un pois, d'une couleur marron clair, d'une dureté presque ligneuse, luisants et offrant un sillon léger sur leur convexité, il recueillit ces tubercules, dont quelques-uns étaient percés d'un petit trou par où était sorti un ichneumonide parasite de la larve du *B. Scabrosus* ; les autres contenaient des larves qui se changèrent quelque temps après en nymphes, et au mois de juillet il obtint des insectes parfaits. Ces tubercules n'étaient autres que des *Coccus* dont la peau, par la présence de la larve, avait pris un grand développement, et qui avaient changé complètement de nature en devenant méconnaissables.

---

(1) Dans le jardin de sa maison, à Dijon même.

1547. B. VARIUS. *F.* Pas rare. Dans les bois de la plaine en fauchant et sur les troncs d'arbres coupés. Du 24 avril au 30 juin. Fixin, bois près du chemin de fer. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray; rare; sous les mousses, commencement du printemps. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1548. B. TESSELLATUS. *Sch.* Un seul exemplaire trouvé à Dijon, à l'Allée-de-la-Retraite, le soir au vol, par M. Drumel.

URODON. *Sch.*

1549. U. RUFIPES. *F.* Commun. Sur le *Reseda lutea*. Du 14 juin au 16 juillet. Dijon, au bord des chemins, surtout du côté de Talant et de Fontaine; route de Lyon. Chamholle. Etc. (Rouvray. — M. Emy.)

1550. U. PYGMEUS. *Hoffm.* Rare. Trouvé seulement dans la combe de Neuvo à Darois, en fauchant, les 26 juin et 13 juillet.

1551. U. CONFORMIS. *Suffrian.* Rare. Environs de Dijon. Je l'avais confondu avec le *Rufipes* jusqu'à une époque très-récente; aussi n'ai-je aucune indication à donner, si ce n'est qu'il a été trouvé dans une des localités déjà citées pour l'*U. Rufipes*.

1552. U. SUTURALIS. *F.* Pas rare. Comme le *Rufipes*, sur la même plante, aux mêmes époques et dans les mêmes localités; trouvé de plus vers le Canal du côté de Larrey, sur le *Reseda luteola*.

SPERMOPHAGUS. *Sch.*

1553. S. CARDUI. *Stéven.* Commun. En fauchant, sur différentes plantes. Mai, juin. Quelquefois l'hiver sous les écorces. Dijon, au Parc sur les *Anthriscus sylvestris*, en fauchant et sous les écorces de platane. Etc. (Rouvray. — M. Emy.)

Voyez l'observation à la suite du *Bruchus cisti*, n° 1576.







BRUCHUS. *Lin.*

1554. B. VARIEGATUS. *Dej.* Pas commun. Environs de Dijon. (Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. — M. *Bourlier.*)

1555. B. DISPAR. *Chevr.* Pas commun. Dans les bois en fauchant. Mai, juin. Plombières, combes de Neuvon. Marsannay-la-Côte. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

1556. B. DISPERGATUS. *Sch.* Un seul exemplaire. Plombières, combe de Neuvon, en fauchant; 26 juin.

1557. B. MARGINELLUS. *F.* Pas commun. Sur l'*Astragalus glycyphyllos*. Du 26 juin au 6 juillet. Dijon, chemin de Talant. Fontaine, chemin qui conduit au chemin d'Ahuy, au-dessus de la ferme de Saint-Martin. Plombières, combes de Neuvon.

1558. B. INSPERGATUS. *Sch.* (Rouvray; assez rare. — M. *Emy.*)

1559. B. BRACCATUS. *Stéven.* Rare. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant; 25 juin.

1560. B. VARIUS. *Oliv.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

1561. B. IMBRICORNIS. *Panz.* Quelques exemplaires de cette espèce ont été trouvés par M. *Lombard* à Saulieu ou à Villenote.

1562. B. BASALIS. *Sch.* Un seul exemplaire. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant; 22 juillet. (Villenote, près Semur. — M. *Lombard.*)

1563. B. CANUS. *Germ.* Commun. Dans des graines de sainfoin (*Onobrychis sativa*) et dans les bois, en fauchant en juin et juillet. Dijon. Plombières, combes de Neuvon. Blaisy-Bas. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

1564. B. PISI. *Lin.* Commun. Dans les pois secs, fin mars, avril; en fauchant sur différentes plantes, surtout

les pois en fleur, mai, juin; l'hiver, sous les écorces de platane et de sycomore. Dijon, chez les grainetiers, dans les pois et au vol près des sacs de pois; au Parc. Plombières, sur le viaduc de Neuvon, fin octobre. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1565. B. RUFIMANUS. *Sch.* Très-commun. Dans les fèves, au premier printemps, et sur les fleurs de fèves dans les champs, juillet; quelquefois l'hiver sous les écorces. Dijon, dans les lieux où l'on conserve des fèves; sur les murs dans la ville, en avril; dans les champs de fèves; au Parc, sous les écorces et en fauchant. Talant, sur les fleurs d'*Erysimum lanceolatum*; mai. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant; mai. Collonges-les-Premières. Saint-Nicolas-les-Cîteaux; juin. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1566. B. FLAVIMANUS. *Meg.* Rare. Blaisy-Bas, en fauchant dans le bois; 2 juillet.

1567. B. NUBILUS. *Dej.* Commun. Dans les graines de vesce (*Vicia sativa*), mars, avril; sur les fleurs de cette plante et dans les bois en fauchant; juin. Dijon, dans les lieux où sont déposées des vesces; sur les murs de la ville, fin mars et avril; dans les champs de vesces. Plombières, combes de Neuvon, et sur le viaduc le 1<sup>er</sup> novembre. Fixin, bois près du chemin de fer. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1568. B. GRANARIUS. *Linn.* Très-commun. Dans les bois et au bord des chemins, en fauchant et sur la *Vicia sepium*. Du 20 avril au 2 août. Dijon, au bord des chemins, surtout au pied des murs et des haies; chemin de Daix, chemins au nord de la ville. Plombières, combe de Neuvon, en fauchant et sur la *Vicia sepium*. Marsannay-la-Côte. Magny-sur-Tille. Collonges-les-Premières. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1569. B. SIGNATICORNIS. *Dej.* Commun. Dans les lentilles.





Avril. Dijon, chez les marchands de cette graine. (Beaune. — M. Bourlier.)

1570. *B. PALLIDICORNIS*. *Dej.* Commun. Se trouve avec le précédent, dont il n'est bien certainement qu'une variété (1). (Beaune. — M. Bourlier.)

1571. *B. LUTEICORNIS*. *Ill.* Pas commun. Environs de Dijon. (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1572. *B. GRISEOMACULATUS*. *Chevr.* Pas commun. Dans les bois humides, en fauchant. Mai, juin. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Serrigny, bois de Lépenot. — M. Bourlier.)

1573. *B. NIGRIPES*. *Dej.* Un seul exemplaire. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant; 26 juin. (Beaune. — M. Bourlier.)

1574. *B. LOTI*. *Payk.* Un seul exemplaire trouvé dans la combe de Neuvon à Darois, en fauchant, le 3 août. (Rouvray. — M. Emy.) (Villenote, près Semur. — M. Lombard.)

1575. *B. PUBESCENS*. *Ziegl.* Commun. Sur les roses sauvages et cultivées. Juin. Dijon, dans les jardins dans la ville

---

(1) Le *B. pisi* et les espèces du même groupe que j'ai observées, c'est-à-dire celles qui ont le prothorax subtrapézoïforme, denté de chaque côté, et les cuisses de derrière dentées, présentent toutes un caractère, propre au sexe mâle, qui n'a pas encore été signalé à ma connaissance et qui consiste en une ou deux petites dents plus ou moins spiniformes en dessous et à l'extrémité des tibias intermédiaires. La forme de ces dents est variable selon les espèces et peut servir alors de caractère spécifique; il n'y en a qu'une chez les *B. pisi*, *rufimanus* et une troisième espèce dont j'ignore le nom; il en existe deux chez les *B. flavimanus*, *nubilus*, *nigripes*, *granarius*, *griseomaculatus*, *signaticornis*, *pallidicornis* et *luteicornis*; chez le *B. granarius*, la dent ou épine apicale est très-petite; chez les *B. signaticornis* et *pallidicornis*, la dent anté-apicale est obtuse et plutôt en forme de lobe, conformation qui est spéciale à ces deux espèces et devient un argument puissant à invoquer en faveur de leur réunion en une seule. Le *B. pallidicornis* ne serait alors, à mon avis, qu'une simple variété du mâle du *B. signaticornis*.

et au bord des chemins du côté de Talant et de Fontaine ; pris au vol en avril. Plombières, combe de Neuvon , entre les gousses d'*Astragalus glycyphyllos* ; fin septembre (Beaune ; en fauchant sur la luzerne, fin mai. — M. *Bourlier*.)

1576. *B. CISTI*. *F.* Commun. Sur les roses sauvages au bord des chemins. Juin. Dijon, chemins autour de la ville ; Jardin botanique, sur des ombellifères. Plombières, combe de Neuvon, en fauchant. Magny-sur-Tille. Villenote, en fauchant autour du bois de Champeaux. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

Suivant M. *Aubé*, cette espèce ne serait pas le véritable *B. cisti* de *Fabricius*, bien que *Schönherr* ait cru devoir la rapporter à ce dernier. Le véritable *cisti* serait le *Spermophagus cardui*, et l'espèce ci-dessus correspondrait au *B. cinereus*. *Rossi*.



## CERAMBYCES.



### ÆGOSOMA. *Serv.*

1577. *A. SCABRICORNE*. *Scop.* Pas rare. Sur les tilleuls creux ; cet insecte se tient caché pendant le jour dans l'intérieur du tronc, à l'abri de la lumière ; on le trouve le soir hors de sa retraite lorsque le jour disparaît, le matin par les temps humides et couverts, plus rarement la journée si ce n'est par les temps couverts et orageux. Du 20 juillet à la fin d'août ; quelquefois, certaines années, dès le 10 juillet ; on rencontre également au commencement de septembre. jusqu'au 10 environ, quelques femelles ordinairement au milieu du jour. Dijon, remparts autour de la ville ; Cours-







Fleury; cours du Parc; Allée-de-la-Retraite et route de Beaune (1). Trouvé aussi sur le tronc de vieux noyers. (Beaune; tilleuls et peupliers. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

PRIONUS. *Geoffr.*

1578. P. CORIARIUS. *Linn.* J'ai trouvé seulement deux femelles de cet insecte, à Curley, dans le bois des Liards, en août, l'une sous un tas d'ételles de hêtre et l'autre en remuant la partie supérieure du terreau au bas du tronc creux d'un vieux hêtre. (Rouvray; fort rare, mâle et femelle. — M. *Emy*.) (Beaune; été; un seul exemplaire. — M. *Arias*.)

CERAMBYX. *Linn.* — HAMMATICHERUS. *Serv.*

1579. C. HEROS. *Scop.* Cette espèce, qui est commune dans la plus grande partie de la France, est très-rare aux environs de Dijon. Sur les vieux arbres et au vol le soir près de ces arbres. Commencement de juillet. Dijon, sur les tilleuls des promenades; cours du Parc; rempart entre la rue Chancelier-L'hospital et la porte Saint-Pierre; etc. (Fixin, au vol le soir près des vieux chênes au-dessus du château. — M. *Tarnier*.) (Chambolle; trouvé par M. *Piffond*, dans son jardin, le soir au vol, le 8 juillet.) (Rouvray; fort rare. — M. *Emy*.)

1580. C. CERDO. *Linn.* Pas rare. Dans les bois, sur les arbres abattus, le bois empilé, les feuilles et les fleurs des arbres et arbrisseaux. Du 30 avril au 9 juillet. Dijon, au

---

(1) Cet insecte devient chaque année plus rare, par suite de la destruction d'une grande partie des tilleuls de nos promenades; dans les deux dernières localités indiquées, les arbres ayant tous été arrachés, il serait inutile aujourd'hui d'y chercher l'*Egosoma scabricorne*, qui pourrait bien aussi disparaître complètement des autres localités citées si l'on continue à y abattre tous les ans des tilleuls que l'on remplace par d'autres arbres d'essences diverses dont le mélange produit un effet des plus disgracieux.

Parc ; cours du Parc , un exemplaire au vol ; etc. Marsan-  
nay-la-Côte. (Fixin. — M. *Tarnier.*) Chambolle. Etc. (Rou-  
vray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias et Bourlier.*)

PURPURICENUS. *Ziegl.*

1581. P. KÖHLERI. *F.* Commun. Sur les vignes et les  
échalas qui servent à les maintenir, ainsi que sur les arbres  
ou les haies qui sont auprès. Du 6 juin au 13 août. Dijon,  
fontaine de Larrey, sur les saules ; bord de l'Ouche du  
côté du Canal ; chemin de Daix ; etc. Plombières. (Fixin. —  
M. *Tarnier.*) Gevrey. Chambolle. (Ponmard. — M. *Pé-  
rallo.*) (Beaune. — MM. *Arias et Bourlier.*)

La variété SERVILLEI. *Ziegl.* se trouve plus rarement.

ROSALIA. *Serv.*

1582. R. ALPINA. *Linn.* Très-rare. Ce magnifique insecte  
se trouve principalement sur les vieux noyers. Deux exem-  
plaires seulement , à ma connaissance, ont été trouvés dans  
nos environs, l'un par M. *P. Gremeau*, alors stationnaire au  
poste télégraphique de Concéur, vers le milieu de juillet, à  
Segrois ; et l'autre par M. *J. Saintpère*, à l'Etang-Vergy, à  
l'époque de la maturité des groseilles à Maquereau.

AROMIA. *Serv.*

1583. A. MOSCHATA. *Linn.* Commun. Sur les saules au  
bord des ruisseaux et des cours d'eau ; l'odeur agréable exha-  
lée par cet insecte le fait souvent découvrir : il se tient soit  
sur le tronc des saules, soit à la naissance des branches, soit  
à leur extrémité et sur les feuilles ; on le prend aussi quelque-  
fois au vol. Du 22 juin au 13 août. Dijon, fontaine de  
Larrey ; bords de l'Ouche ; (au cimetière ; 9 septembre. —  
M. *Ph. d'Aumont.*) (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. —  
M. *Arias.*)





PHYMATODES. *Muls.* — *CALLIDIUM. F.*

1584. *P. BREVICOLLIS. Sch.* — *THORAGICUS. Dej.* Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cette espèce dans les environs de Dijon ; mais je n'ai aucun souvenir du lieu ni des circonstances de cette capture. Je l'ai reçue également de *M. Ph. d'Aumont*, qui m'a dit l'avoir trouvée à Semur, où elle n'est pas très-rare sur les cuves dont on se sert pour mettre la vendange.

1585. *P. VARIABILIS. Linn.* Commun. Dans les coupes en exploitation, les chantiers de bois à brûler, au vol, etc. Juin, juillet. Dijon, dans les chantiers et les bûchers ; sur les murs et au vol dans la ville, surtout à l'époque où se font les provisions de bois à brûler ; souvent même dans l'intérieur des maisons. Environs de Dijon, dans les bois, les villages, etc. (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune. — Sur les ombellifères et autres plantes. *M. Arias.* — Sur les tilleuls. *M. Bourlier.* — *M. André.*)

1586. *P. HUMERALIS. Dej.* Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cette espèce ; je l'ai pris à Dijon, le 21 avril, sur le pont du Canal qui est en amont du bassin et près duquel se trouvent des piles de bois à brûler, principalement de tremble.

*CALLIDIUM. F.*

1587. *C. VIOLACEUM. Linn.* Rare. Il a été trouvé quelquefois à Dijon même, le long des maisons ; il provient sans aucun doute des provisions de bois à brûler. Juin. (Commencement du cours du Parc, par terre ; 30 mai. — *M. Tarnier.*)

1588. *C. SANGUINEUM. Linn.* Commun. Dans les chantiers de bois à brûler et de bois de charpente, dans les bûchers et l'intérieur des maisons. Fin mars, avril, mai. Dijon et les environs ; il n'est pas rare dans l'intérieur

des habitations, où il s'est transformé dans le bois de chêne destiné au chauffage. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

Je l'ai trouvé, mais une seule fois, dès le 24 février, ce qui peut aisément s'expliquer par cette circonstance que la température artificielle de l'appartement où je l'ai rencontré aura hâté l'époque de sa sortie.

1589. C. RUFIPES. *F.* Cette espèce est rare dans nos environs. J'en ai pris deux exemplaires et M. *Péragnollo* un, le 29 mai à Fixin dans le bois qui se trouve en-deçà du chemin de fer de Paris à Lyon, sur des feuilles de chêne. (Juillet. — M. *Nodot.*) (Rouvray; pas commun; en battant l'aubépine en fleur et quelquefois les chênes. — M. *Emy.*) (Serrigny; bois de Lépenot; un seul exemplaire. — M. *Bourlier.*)

1590. C. ALNI. *Linn.* Assez commun. Sur les fagots et le bois coupé dans les coupes en exploitation, sur les échaldas dans les vignes, les haies mortes, les barrières. Mai; quelquefois dès la fin d'avril. Dijon, barrières au-dessus de la gare; chemin des Perrières, de Corcelles-Monts, de Marsannay-la-Côte, etc.; chantiers du bassin du Canal; Parc; fontaine de Larrey. Marsannay-la-Côte, dans la combe. Fixin, bois près du chemin de fer; (bois de la montagne. — M. *Tarnier.*) (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — Pas commun; M. *Bourlier.* — Dans un grenier; M. *André.*)

RHOPALOPUS. *Muls.* — CALLIDIUM. *F.*

1591. R. FEMORATUS. *Linn.* Pas commun. Sur les échaldas dans les vignes, sur les haies, le bois coupé; surtout lorsque le temps est très-chaud et orageux. Fin mai, juin. Dijon, dans les vignes et au bord des chemins, surtout du côté de Chenôve; bassin du Canal; cours du Parc, par terre; route de Plombières. Fixin, bois près du chemin de







fer. Chambolle. Etc. (Rouvray; fort rare. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias* et *André*.)

1592. R. CLAVIPES. *F.* Cette espèce se trouve quelquefois à Dijon dans la ville, soit dans les rues, soit dans les chantiers ou les bûchers; j'en ai pris un exemplaire dans une cour du Palais de justice, le 1<sup>er</sup> juillet. (Rouvray; fort rare. — M. *Emy*.) (Beaune. — Une seule fois; juin; M. *Arias*. — M. *André*.)

#### HYLOTRUPES. *Serv.*

1593. H. BAJULUS. *Linn.* Pas commun. Dans les bûchers et les maisons. Juillet, août. Dijon, dans la ville. Chambolle. Etc. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *André*.)

#### HESPEROPHANES. *Muls.*

1594. H. NEBULOSUS. *Oliv.* (Beaune. — Pas bien commun; M. *Bourlier*. — M. *André*.) (Savigny près Beaune, Fontaine-Froide. — MM. *Arias* et *Maldant*.) Je n'ai d'autre indication d'époque que celle *été*, donnée par M. *Arias*.

#### CLYTUS. *F.*

1595. C. ARCUATUS. *Linn.* Commun. Dans les coupes en exploitation, sur le bois coupé; dans les chantiers, les bûchers, etc.; presque toujours exposé aux rayons du soleil. Du 13 mai à la fin de juin. Dijon, dans les chantiers de bois à brûler, dans ceux des charpentiers et dans les bûchers. Environs de Dijon, dans les bois, sur les piles de bois à brûler ou les futaies abattues, équarries ou non. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*. — Juin et juillet, sur les ombellifères. M. *Arias*.)

1596. C. LICIATUS. *Linn.* — HAFNIENSIS. *Linn.* Pas rare. Sur les peupliers morts, sur pied ou abattus; recherche aussi le soleil. Fin mai, juin, commencement de juillet. Dijon,

bords du Canal, bords de l'Ouche, bord de Suzon, bassin du Canal sur du bois à brûler. Gevrey, bord du chemin de Saulon, sur une pile de bois de tremble. (Rouvray; rare. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

1597. C. MUCRONATUS. *F.* — TROPICUS. *Panz.* Très-rare. Trouvé par M. *Tarnier* dans les environs de Dijon, notamment un exemplaire à la fin de juin sur des bois de chêne équarris, près de la gare du chemin de fer à Gevrey.

1598. C. ARVICOLA. *Oliv.* Rare. Trouvé également par M. *Tarnier* aux environs de Dijon; et par M. *Nodot*, à Dijon, dans un chantier, le 30 juillet.

1599. C. ARIETIS. *Linn.* Commun. Sur le bois coupé et les fleurs. Du 17 mai à la fin de juin. Dijon, dans les chantiers; au Parc; sur les haies vives au bord des chemins, les ombellifères, etc. Environs de Dijon, dans les bois. (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

La variété BOURDILLONI. *Muls.* a été trouvée une seule fois par M. *J. Saintpère*, à Dijon dans son jardin qui aboutit sur le rempart du Château.

1600. C. ANTILOPE. *Schrank.* (Rouvray; pas très-commun. — M. *Emy.*) (Beaune; une seule fois. — M. *André.*)

1601. C. GAZELLA. *F.* Commun. Sur les haies, les fleurs, surtout les roses sauvages, les ombellifères et l'*Achillea millefolium*. Juin, juillet. Dijon, chemins autour de la ville. Environs de Dijon; Gevrey. Etc. (Fixin. — M. *Tarnier.*) (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

1602. C. TRIFASCIATUS. *F.* Deux exemplaires seulement de cette espèce ont été trouvés à ma connaissance dans les environs de Dijon : l'un à l'Étang-Vergy, par M. *J. Saintpère*, en juin ou juillet; et l'autre aux environs de Reulle, par M. *P. Gremeau*, en juillet ou août.

1603. C. VERBASCI. *F.* Pas commun. Sur les troncs des





tilleuls, au soleil. Du 20 juin à la fin de juillet. Dijon, Allée-de-la-Retraite; cours du Parc; intérieur du Parc, sur du bois coupé et empilé.

1604. C. QUADRI-PUNCTATUS. *F.* Pas rare. Sur le bois à brûler et dans les maisons. Juillet, août. Dijon, dans la ville. (Fixin. — M. Tarnier.) Chambolle. (Rouvray; commun sur les pommiers. — M. Emy.) (Beaune. — Mai, juin; M. Arias. — Sur les sycomores; M. Bourlier. — M. André.)

1605. C. MASSILIENSIS. *F.* Commun. Sur différentes fleurs, surtout les ombellifères et l'*Achillea millefolium*. Fin juin, juillet, 1<sup>re</sup> quinzaine d'août. Dijon, au bord des chemins sur les haies, les ombellifères, principalement les héraclées, la carotte sauvage, l'*Achillea millefolium*; bords du Canal; fontaine de Larrey; etc. Gevrey. Chambolle. Etc. (Rouvray; pas commun. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1606. C. PLEBEJUS. *F.* Pas rare. Sur différentes fleurs, principalement les roses sauvages, les ronces, les héraclées; sur les haies vives. Juin, commencement de juillet. Dijon, au bord des chemins sur les haies, fontaine de Larrey, Combe-aux-Serpents, chemin de Daix, etc. Plombières. Gevrey. Chambolle. Etc. (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1607. C. MYSTICUS. *Linn.* Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cet insecte le 21 juin, sur un hêtre carié abattu sur la lisière de la forêt de Mantuan, territoire de Conœur. (Rouvray; commun sur l'aubépine en fleur. — M. Emy.)

A été trouvé également à Semur.

GRACILIA. *Serv.*

1608. G. PYGMÆA. *F.* Se trouve quelquefois en quantité considérable sur les vieux mannequins ou paniers d'osier,

dans les maisons. Du 14 juin au 16 juillet. Dijon, dans les maisons, surtout les greniers ; au vol ; etc. (1). (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. André.)

OBRIMUM. Meg.

1609. O. CANTHARINUM. Linn. — FERRUGINEUM. Panz. Très-rare. Sur le bois blanc dans les chantiers. Fin juin, juillet, commencement d'août. Dijon, chantiers du bassin du Canal ; fontaine de Larrey, au vol le soir. (Fixin. — M. Tarnier.) (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune ; dans la ville ; trois exemplaires. — M. Péragallo.)

M. J. Saintpère a trouvé cette espèce en grande quantité à Dijon, dans son bûcher, qui contenait alors du bois de tremble rapporté de l'Étang-Vergy.

STENOPTERUS. III.

1610. S. RUFUS. Linn. Commun. Sur différentes fleurs, principalement les ombellifères et l'*Achillea millefolium* ; sur les haies. Juin, juillet, commencement d'août. Dijon, le long des chemins ; cours extérieur de Suzon ; bords du

---

(1) On lit dans l'*Histoire naturelle des Coléoptères de France* de M. Mulsant (Longicornes, page 105) : « M. Nodot, conservateur du « Muséum d'histoire naturelle de Dijon, m'a dit avoir observé le même « phénomène (celui de la rencontre en quantité énorme de la *Gracilia* « *pygmaea*), avec des circonstances particulières ; pendant plusieurs « jours de suite, vers les dix heures du matin, ces insectes noircissaient « de leur multitude l'angle d'une maison voisine de la promenade, et « vers midi ils disparaissaient simultanément. »

Cette observation, qui remonte déjà à un assez grand nombre d'années, a été faite sur la maison de M. Goisset, rempart du Château, aujourd'hui occupée par les ateliers de reliure de M. Maître ; elle s'explique facilement par cette circonstance, dont M. Nodot n'a pas rendu compte, que cette maison, dont l'intérieur n'était pas alors achevé, servait d'entrepôt à de grandes quantités de cercles pour les tonneaux, cercles qui sont liés avec de l'osier, et probablement aussi à des provisions d'osier destinées à cet emploi. Quant à l'apparition et à la disparition des insectes à heure fixe, elles étaient sans aucun doute subordonnées à la manière dont la lumière du soleil frappait cette maison aux heures indiquées.







Canal; Parc; etc. (Fixin. Gevrey. — M. Tarnier.) (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

MOLORCHUS. F.

1611. M. UMBELLATORUM. Linn. Assez commun. Cette espèce se rencontre rarement la journée, excepté lorsqu'il fait un temps très chaud et que le ciel est couvert par de grosses nuées d'orage; mais il n'est pas rare le soir, aussitôt après le coucher du soleil (de sept heures et demie à huit heures et demie), dans les lieux où l'on cultive la vigne; il vole au-dessus des vignes ou des haies, se pose quelquefois sur les échalas, les asperges montées qui se trouvent dans les vignes, et les fleurs qui sont dans les haies, surtout les fleurs de cornouiller sanguin, des ombellifères et des *Galium*; il m'est arrivé d'en prendre jusqu'à cent exemplaires pendant une soirée; la femelle est beaucoup plus rare que le mâle. Du 26 mai au 13 juillet. Dijon, chemins de Daix, Talant, Chenôve, etc.; fontaine de Larrey; Parc; Combe-aux-Serpents; etc. Fontaine, chemin qui conduit au chemin d'Ahuy au-dessus de la ferme de Saint-Martin. Plombières, Champmoron. Chambolle. Villenotte près Semur. (Rouvray; pas commun. — M. Emy.) (Beaune. — Rare; sur le troène; M. Arias. — Hameau de Gigny; sur les haies; M. Bourlier.)

NECYDALIS. Linn. — MOLORCHUS. F.

1612. N. MAJOR. Linn. — ABBREVIATUS. F. Très-rare. Je n'ai trouvé que deux exemplaires de ce bel insecte : l'un le 16 juin, dans un grenier où se trouvait du très-vieux bois de hêtre provenant de la forêt de Mantuan; l'autre le 6 juillet, dans la combe de Chambolle, traîné, quoique encore vivant, et déjà entamé par plusieurs grosses fourmis. Je sais également que cette espèce a été trouvée dans les bois des environs de Plombières.

ACANTHODERES. *Serv.*

1613. A. VARIUS. *F.* Très-rare. Cet insecte a été trouvé une fois, je ne me rappelle plus par qui, sur un peuplier le long du ruisseau de la fontaine dont la source est auprès de l'Asile des aliénés; un second exemplaire a été pris en ma présence, le 15 juin, par M. *Dudrumel*, au Parc, sur une pile de bois coupé. (Beaune. — Une seule fois; M. *Arias*. — Au printemps, sur l'acacia; rare; M. *Bourlier*.)

LEIOPUS. *Serv.*

1614. L. NEBULOSUS. *Linn.* Commun. Sur le bois mort, sur pied ou abattu; dans les chantiers; sur le bois coupé et les fagots dans les coupes en exploitation. Du 14 mai au 5 juillet. Dijon, au Parc sur du bois coupé empilé, sur des charmes et des cerisiers morts sur pied, et sur des arbres abattus; chantiers près du bassin du Canal sur le bois à brûler; rempart de Tivoli sur un tilleul. Fixin, bois de la plaine. Chambolle. Etc. (Rouvray; sur les troncs des chênes et en battant les haies sèches. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *Arias*. — Sur le noyer; M. *Bourlier*.)

Je possède quelques exemplaires de cette espèce qui m'ont été donnés par feu M. *J. Saintpère*, lequel en avait pris une certaine quantité sur un noyer, à l'Etang-Vergy; le duvet cendré qui les recouvre est beaucoup plus blanc et laisse à peine apercevoir quelques taches dénudées. Cette variété serait-elle due à l'influence du bois de noyer dont s'était sans doute nourrie la larve?

La larve de cette espèce vit principalement dans le charme; je l'ai trouvée, déjà transformée en nymphe, en écorçant des charmes morts, et il m'est arrivé plusieurs fois de trouver aussi sous ces écorces des insectes parfaits qui étaient morts avant d'avoir pu les percer pour sortir au dehors.





EXOCENTRUS. *Meg.*

1615. E. BALTEATUS. *F.* Rare. Sur le bois coupé ou au vol le soir. Du 15 juin au 23 juillet. Dijon, au Parc sur des piles de bois; fontaine de Larrey, le soir au vol. (Rouvray; commun; battue des haies sèches. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier.*)

1616. E. ADSPERSUS. *Muls.* Commun. Au vol le soir, dans les vignes, et dans les bois sur le bois coupé; on le rencontre rarement dans la journée, et seulement lorsqu'il fait un temps couvert et orageux. Du 25 mai au 23 juillet. Dijon, fontaine de Larrey; chemins de Daix, de Chenôve, de Corcelles, etc.; il vole après le coucher du soleil lorsque le temps est très-chaud et calme, se reposant quelquefois sur les échelas, dans lesquels vit probablement sa larve; barrière au-dessus de la gare; au Parc sur du bois coupé; cours du Parc. Talant. Plombières. Gevrey. (Fixin. — M. *Tarnier.*) Chambolle. Etc.

POGONOCHERUS. *Meg.*

1617. P. OVALIS. *Gyll.* Très-rare. J'ai pris seulement trois exemplaires de cet insecte à Fixin sur la barrière du chemin de fer, dans le bois, le 11 mai.

1618. P. HISPIDUS. *F.* Rare. Sur les arbres morts; l'hiver sous les écorces, l'automne sur les murs. Dijon, au Parc sur du bois mort coupé et empilé, 28 mai; sous les écorces des sycomores qui sont autour de la table de pierre au-dessus de la fontaine de Larrey, 28 février et 4 mars. Plombières, sur le viaduc de Neuvon, du 23 au 31 octobre; sur un peuplier mort près de la fontaine qui existe dans l'embranchement de la combe se dirigeant vers Prenois, 3 mai. Pasques, sur un noyer, 22 mai. (Rouvray; pas commun; sur le noisetier et en battant les haies sèches. — M. *Emy.*)

1619. P. PILOSUS. *F.* Pas rare. Sur le bois coupé, sur les

murs; en fauchant et en battant les fagots dans les bois. Du 24 mars au 8 novembre. Dijon, au Parc; sur la barrière au-dessus de la gare; dans la ville sur les murs des maisons. Flavignerot. Fixin. Chambolle. Villenotte. (Rouvray; battue des haies sèches. — M. *Emy.*) (Beaune; pas commun. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

J'ai obtenu assez communément cet insecte en rapportant du Parc du bois mort de lierre; l'insecte a commencé à sortir le 17 juillet.

MONOHAMMUS. *Meg.*

1620. M. SUTOR. *Linn.* M. *Bourlier* m'assure que M. *Maldant* a trouvé cette espèce dans les environs de Savigny-sous-Beaune.

LAMIA. F. — PACHYSTOLA. *Dej.*

1621. L. TEXTOR. *Linn.* Pas commune. Sur le tronc des saules, des osiers et des aulnes. Mai, juin, octobre. Dijon, sur des souches d'osier près de Mirande; (sur des saules aux Petites-Roches; — M. *Nodot*); barrière au-dessus de la gare. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Tart-le-Haut, plantation de peupliers. Citeaux. (Rouvray, — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

MORIMUS. *Serv.*

1622. M. LUGUBRIS. *F.* Pas commun. Dans les bois où domine le hêtre et où se trouvent des arbres anciens, principalement sous les troncs de hêtres coupés, quelquefois sur les troncs ou par terre, mais alors dans les endroits ombragés; cet insecte paraît craindre le grand jour; on le trouve errant sur les arbres abattus ou les vieilles souches, dès le grand matin beaucoup plutôt que lorsque le soleil est déjà chaud; se trouve aussi quelquefois dans les maisons ou les rues, où il a été très-certainement alors intro-







duit avec du bois. Du 21 avril au 13 août; trouvé aussi le 18 octobre. Dijon, dans les chantiers, les bûchers, les rues et les maisons, mais rarement. (Messigny, fontaine de Jouvence. — M. *Vodot.*) Chambolle. Concœur, Reulle et Curley, forêt de Mantuan. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune; rare. — M. *Arias.*)

MESOSA. *Meg.*

1623. M. CURCULIONOIDES. *Linn.* Pas commune. Sur le bois coupé, surtout le bois mort; quelquefois sur les murs des maisons. Fin avril à juillet; trouvée une fois dès le mois de février sur un mur exposé au midi, et une autre fois en novembre. Dijon, dans la ville sur les murs des maisons dans lesquelles il y a du vieux bois de chauffage ou qui sont voisines des chantiers; chantiers au bord du bassin du Canal; au Parc sur les arbres morts sur pied et surtout sur ceux qui sont abattus, principalement les tilleuls, platanes et cerisiers; Arquebuse. Plombières, par terre au bord du Canal. Fixin, bois de la plaine sur la barrière du chemin de fer. (Beaune; rare. — MM. *Arias* et *André.*) (Savigny-sous-Beaune. — M. *Bourlier.*)

1624. M. NUBILA. *Oliv.* — NEBULOSA. *F.* Pas commune, un peu plus cependant que la précédente. Sur le bois coupé, les barrières, les bois façonnés dans les coupes en exploitation; dans les chantiers; sur les murs des maisons; etc. 30 avril, mai, juin. Dijon, dans la ville sur les murs des maisons où il y a du bois à brûler; dans les chantiers de bois à brûler ou de bois de charpente; chantiers du bassin du Canal; au Parc sur du bois coupé, sur des arbres morts sur pied et sur des fagots de bois mort; barrière au-dessus de la gare; rempart de Tivoli. Fixin, bois de la plaine, sur la barrière du chemin de fer. Gevrey, sur du bois de charpente près de la gare. Gilly. Chambolle. Concœur, forêt de Mantuan. Saint-Nicolas-les-Citeaux, forêt

de Cîteaux. (Pontailier-sur-Saône. — M. *Dudrumel*.) (Rouvray; assez rare. — M. *Emy*.) (Beaune; plus rare que la *M. Curculionoides*. — M. *Arias*.)

On trouve quelquefois cet insecte, en automne et en hiver, en cassant des branches mortes tombées au pied des gros arbres; il est contenu alors dans une loge creusée dans le bois et qui semble hermétiquement fermée.

PARMENA. *Meg.*

1625. P. FASCIATA. *Villers*. Pas commune. Sur le bois mort, et sous les écorces des arbres garnis de lierre; l'insecte passe probablement ses premiers états dans les tiges de cette plante. Avril, mai; automne, hiver. Dijon, au Parc, sous des écorces de sycomores recouvertes de lierre; trouvée aussi par M. J. *Saintpère* sur le lierre qui tapisse la maison qu'il habitait, entre la rue des Godraus et le rempart du Château. Flavignerot, en battant de vieux fagots. (Beaune; sur le lierre. — MM. *Bourlier* et *André*.) (Savigny-sous-Beaune. — M. *Bourlier*.)

DORCADION. *Da!man*.

1626. D. FULIGINATOR. *Linn*. Cet insecte a été trouvé, je crois, en certain nombre, dans la partie septentrionale du département de la Côte-d'Or, près de la limite du département de la Haute-Marne; mais je n'ai aucune indication précise à cet égard. Un exemplaire, que j'ai vu vivant, et dont la provenance est pour moi certaine, a été pris à Gemeaux, par terre sur un chemin dans les vignes, le 5 mai.

1627. D. LINEOLA. *Ill*. Assez rare. Sous les pierres et sur la terre dans les endroits secs, principalement sur les friches des montagnes dans le voisinage des lieux cultivés ou de ceux où se trouvent des pierres nouvellement re-





muées. 30 mars, avril, mai. Dijon, montagne de Larrey; chemin de Corcelles-les-Monts, au-dessus de la montée; montagne au nord de la combe Saint-Joseph; Combe-aux-Serpents; (chemin des Perrières, derrière la place Darcy; ancien lit de Suzon. — M. *Nodot*.) Chenôve, sur la montagne. Marsannay-la-Côte, sur un chemin au milieu des vignes. (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

ANÆSTHETIS. *Dej.*

1628. A. TESTACEA. *F.* Très-rare. Je n'ai jamais trouvé cette espèce, qui a cependant été prise quelquefois aux environs de Dijon, notamment dans le voisinage des noyers qui bordent la droite de la route, entre l'Arquebuse et le faubourg Raines, par M. *Dudrunel*, et à la fontaine de Larrey, au vol au soleil couchant, le 23 juin, par M. *L. Humbert*. (Rouvray; pas commun; battue des haies sèches. — M. *Emy*.) (Beaune. — En fauchant au bord d'un fossé, 1<sup>er</sup> juillet. M. *Péragallo*. — Rare; MM. *Arias* et *André*.) (Serrigny; bois de Lépenot; un seul exemplaire. — M. *Bourlier*.)

COMPSIDIA. *Muls.* — SAPERDA. *F.*

1629. C. POPULNEA. *Linn.* Assez commune. Sur le tremble et le peuplier, surtout sur la lisière des bois. Fin mai, juin. Dijon, bords du Canal, en aval du bassin, sur des rejets de peuplier au pied de cet arbre. Marsannay-la-Côte, à l'entrée de la combe. Fixin, bois de la plaine; (bois de la montagne. — M. *Tarnier*.) Chambolle, Concécur, forêt de Mantuan. (Rouvray; commune. — M. *Emy*.) (Beaune. — Pas commune. M. *Arias*. — Bois de Battaut, sur l'aulne; pas bien rare. M. *Bourlier*. — M. *André*.)

ANÆREA. *Muls.* — SAPERDA. *F.*

1630. A. CARCHARIAS. *Linn.* Commune. Sur les peupliers, surtout sur ceux qui ne sont pas très-gros; le soir sur les

troncs et au vol à l'entour; la journée en secouant ces arbres. Du 11 juillet au 24 septembre. Dijon, cours de Suzon, le long du chemin d'Ahuy et autour de la ville depuis la porte Saint-Nicolas à la porte Neuve; chemin de Mirande, entre l'octroi et le creux d'Enfer; fontaine de Larrey; bords du Canal et de l'Ouche. (Rouvray; pas commun. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

SAPERDA. F.

1631. S. SCALARIS. Linn. Rare. Sur les arbres morts sur pied ou abattus, principalement les cerisiers; sur le bois coupé dans les bois; dans les chantiers. Mai, première quinzaine de juin; trouvée une fois dès le 23 avril. Dijon, au Parc; chantiers du port du Canal; trouvée une fois au vol sur le chemin couvert entre la porte Neuve et la porte Saint-Pierre. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Curley, bois des Liards. Chambolle, jardin de M. Piffond. (Beaune. — MM. Arias et André.)

1632. S. TREMULÆ. F. Cette espèce, qui n'était pas rare autrefois dans les environs de Dijon, l'est devenue depuis que les tilleuls disparaissent de nos promenades. Sur les vieux tilleuls sur pied et abattus, quelquefois au vol autour de ces arbres, surtout sur l'espèce à petites feuilles, *Tilia microphylla*. Fin mai, juin, commencement de juillet; trouvée une fois en août; et une autre fois le 20 septembre, sur un tronc d'arbre abattu d'où elle venait de sortir. Dijon, Allée-de-la-Retraite, cours du Parc, intérieur du Parc, route de Langres; la journée à l'ombre, mais surtout la soirée, de quatre à sept heures et demie. (Beaune. — Rare; M. Arias. — M. André.)

STENOSTOLA. Dej.

1633. S. NIGRIPES. F. Rare. Dans les bois, sur les feuilles de différents arbres, surtout de noisetier et de chêne; dans







les coupes en exploitation, sur le bois coupé. Mai, juin. Dijon, au Parc, sur du bois coupé, et en fauchant sur les *Anthriscus sylvestris*; cours du Parc et Allée-de-la-Retraite, au vol. Marsannay-la-Côte, bois près de Gouville et dans la grande combe. Flavignerot. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray; fort rare. — M. *Émy*.) (Beaune. — M. *Arias*.)

TETROPS. Kirby. — ANÆTIA. Dej.

1634. T. PRÆUSTA. Linn. Pas rare. Dans les bois, en fauchant, principalement sur le chêne et le noisetier. Du 13 mai au 2 juillet. Dijon, au Parc, en fauchant sur l'*Anthriscus sylvestris*; (Saint-Joseph, sur les buissons, en fauchant. — M. *Nodot*.) Corcelles-les-Monts, Combe-aux-Serpents. Plombières, combe de Neuvon. Blaisy-Bas. Flavignerot. Fixin, bois de la plaine. Gevrey. Chambolle. (Rouvray; très commune. — M. *Émy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

OBEREÆ. Meg.

1635. O. LINEARIS. Linn. Rare. Dans les bois, à l'ombre, sur le noisetier ou plutôt sous les feuilles de cet arbrisseau. Fin mai, juin. Plombières, bois de Bonveau. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois de la plaine. Gevrey. Chambolle. (Rouvray; pas rare. — M. *Émy*.) (Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide, en fauchant dans les prés. — M. *Pérangallo*.)

1636. O. ERYTHROCEPHALA. Schr. Pas commune. Sur les Euphorbes (*Euphorbia palustris*, d'après M. *Nodot*.) Juin, juillet. Dijon, derrière le Parc, au bord de l'Ouche en aval du pont du chemin de fer; Vieux-Suzon. Longvic, entre les deux bras de l'Ouche du côté de Dijon.

1637. O. PUPILLATA. Gyll. Pas rare dans les jardins sur

différents chèvre-feuilles, surtout le *Lonicera tatarica*, qu'elle fait souvent périr lorsqu'à l'état de larve elle ronge l'intérieur des branches; rare dans les bois sur le *Lonicera xylosteum*. Du 31 mai au 18 juillet. Dijon, dans les jardins de la ville où se trouvent des chèvre-feuilles. Fixin, bois de la plaine sur le *Lonicera xylosteum*. (Rouvray; assez rare. — M. Emy.) (Beaune. — M. André.) (Serrigny, bois de Lépenot; sur l'aulne; rare. — M. Bourlier.)

1638. O. OCLATA. Linn. Très rare. Je n'ai jamais pris cette espèce, qui a cependant été trouvée quelquefois dans nos environs; notamment deux exemplaires pris en ma présence par M. Tarnier, l'un à Dijon, à la fontaine de Larrey, au vol près des saules le 19 juillet, et l'autre à Chevigny-Saint-Sauveur, en fauchant dans le petit bois qui est devant le château, le 6 du même mois. (Rouvray; rare; sur les fleurs de l'*Achillea phtarmica*. — M. Emy.) (Beaune. — M. André.)

PHYTOECIA. Dej.

1639. P. EPHIPPIMUM. F. (Beaune. — M. André.)

1640. P. LINEOLA. F. Un seul exemplaire de cette espèce a été trouvé dans les environs de Dijon, à ma connaissance, par un jeune entomologiste qui a quitté Dijon depuis longtemps; il l'avait pris dans les prés du bord de l'Ouche près de l'écluse de Larrey, en fauchant, le 12 mai 1839. (Beaune; rare. — M. Arias.)

1641. P. JOURDANI. Muls. — OPTHALMICA. Dej. Rare. Sur les graminées des pelouses. Mai. Dijon, fossé à l'ouest du cours du Parc entre le rond-point et le Parc, sur les tiges des graminées; montagne de Larrey, sous une pierre; (chemin des Perrières, derrière la plate-forme, 9 avril. — M. Nodot.) Chambolle, au vol au-dessus d'une pelouse entre les deux combes. (Beaune; un seul exemplaire. — M. Arias.)





1642. P. CYLINDRICA. *Linn.* Cette espèce est fort rare ailleurs que dans la combe de Neuvon à Darois, sur le territoire de cette commune; elle n'est pas rare dans cette localité, soit en fauchant, soit sur les feuilles de l'*Heracleum sphondylium*. Du 20 mai au 24 juillet. (Gevrey, près de la fontaine qui est dans la combe. — M. Tarnier.) Curley, bois des Liards, en fauchant. (Rouvray; rare. — M. Emy.) (1)

1643. P. VIRESCENS. *Panz.* Commune. Sur l'*Echium vulgare*, plus rarement sur le *Cynoglossum officinale* et le *Lithospermum officinale*. Du 21 mai au 30 juillet. Dijon, le long des chemins où croissent les plantes précitées, principalement les chemins secs du côté de Fontaine, Daix, Talant, Larrey, Chenôve; Vieux-Suzon; Combe-aux-Serpents, Talant. Plombières, combe de Neuvon. Velars-sur-Ouche, chemin de la combe de Flavignerot. Flavignerot. (Fixin. — M. Tarnier.) Chambolle. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.) (Pommard. — M. Pérageallo.)

1644. P. MOLYBDÆNA. *Dalm.* Pas commune. Je l'ai trouvée sur les plantes et dans la plupart des localités indiquées pour l'espèce précédente; à peu près à la même époque. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André.) Savigny-sous-Beaune.

1645. P. NIGRICORNIS. *F.* Rare. Dans les bois, en fauchant. Du 16 mai au 26 juillet. Plombières, combe de Neuvon. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, sur des ronces dans un champ inculte au bord du bois du Chaignot. Chambolle, au vol. (Beaune; un seul exemplaire. — M. Arias.)

---

(1) M. Emy indique une espèce sous le nom de *Cylindricollis*. Comme je n'en connais aucune de ce nom, je suppose qu'il a voulu parler de la *Cylindrica*, et je la fais figurer sous ce dernier nom.

AGAPANTHIA. *Serv.*

1646. A. CARDUI. *F.* Rare. Sur le *Carduus nutans*. Juin (1). Dijon, Vieux-Suzon ; entre le Parc et Longvic ; chemin de Corcelles-les-Monts, au-dessus de la montée. (Beaune. — Juillet. M. *Arias*. — Fin de mai, juin. M. *Bourlier*.)

1647. A. ANGUSTICOLLIS. *Sch.* Pas rare. Dans les bois sur l'*Heracleum sphondylium*, surtout au fond des combes ; on la trouve également, soit dans les bois, soit ailleurs, sur différentes espèces de chardons, principalement le *Carduus nutans*. Du 20 mai au 12 juillet. Dijon, Vieux-Suzon, etc. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Flavignerot, dans la combe. Corcelles-les-Monts, Mont-Afrique. Marsannay-la-Côte, dans la combe. (Fixin. — M. *Tarnier*.) Gevrey, dans la combe et les bois de la plaine ; bord du petit étang de Satenay. Collonges-les-Premières. Chambolle. (Rouvray ; assez rare. — M. *Emy*.) (Beaune. — Peu commun ; M. *Arias*. — M. *André*.)

1648. A. SUTURALIS. *F.* Très-rare. Dans les bois sur différentes plantes. Juin. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Concéur, forêt de Mantuan, près du poste télégraphique, sur une carduacée. Chambolle, dans la combe, embranchement de droite, sur un hellébore.

1649. A. MICANS. *Panz.* — SMARAGDINA. *Dej.* Rare. Dans les bois. Juin, 3 août. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot, dans la combe, sur un noisetier. (Pommard. — M. *Pérangolo*.) (Rouvray. — M. *Emy*.) (2)

---

(1) Je trouve sur mes notes une indication d'époque au 8 août ; tout me porte à croire que c'est là une erreur. Ce serait plutôt 8 juillet.

(2) Je fais figurer ici l'indication de Rouvray dans la supposition que M. *Emy* aura voulu parler de cette espèce qu'il désigne sous le nom de *Violacea* ; l'espèce portant ce dernier nom n'a jamais été signalée en France à ma connaissance.







RHAMNUSIUM. *Meg.*

1650. R. SALICIS. *F.* Pas rare. Dans les tilleuls creux, rarement dans les autres arbres ; je l'ai cependant trouvé dans un marronnier d'Inde. Du 15 mai au 15 juin. Dijon, promenades autour de la ville ; remparts ; Allée-de-la-Retraite ; cours du Parc. (Châtillon-sur-Seine ; d'après M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

La variété à élytres ferrugineuses est beaucoup plus rare que le type.

RHAGIUM. *F.*

1651. R. BIFASCIATUM. *F.* (Rouvray ; pas commun ; sur les vieux hêtres. — M. Emy. Se trouve en juillet, d'après M. Nodot.) (Beaune. — Rare ; M. Arias. — M. André.)

1652. R. INDAGATOR. *F.* (Beaune. — M. André.)

1653. R. MORDAX. *F.* Pas rare. Dans les bois sur les gros chênes abattus, surtout sur la souche qui reste en terre ; sur les ételles, les piles de bois, au vol, etc. Du 6 mai au 19 juin ; on le trouve aussi quelquefois sous les écorces des arbres abattus ou des souches, en automne, en hiver et au printemps. Bois des environs de Dijon, Plombières, Flavignerot, Marsannay-la-Côte, Fixin, Gevrey, Chamholle, etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.) (Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide. — MM. Bourlier et Péragallo.)

La variété CEPHALOTES. *Muls.* est beaucoup plus rare que le type.

1654. R. INQUISITOR. *Linn.* Un peu plus rare que l'espèce précédente ; je l'ai trouvé dans les mêmes conditions, les mêmes localités et aux mêmes époques. Se trouve aussi quelquefois sous les écorces, depuis le mois d'octobre jusqu'à la sortie de l'insecte. (Rouvray, Beaune, Savigny, comme le *R. Mordax*.)

TOXOTUS. *Meg.*

1655. T. MERIDIANUS. *Linn.* Pas rare. Dans les bois, sur les feuilles des arbustes et sur différentes fleurs, surtout les ombellifères et les fleurs de cornouiller sanguin ; quelquefois aussi sur le bois coupé. Du 24 mai au 26 juin. Dijon, au Parc ; trouvé aussi sur le chemin de Daix, sur une fleur de cornouiller sanguin dans une haie. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot, dans la combe. Marsannay-la-Côte, dans la combe et près de la fontaine de Gouville. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, dans la combe. Chambolle. (Beaune. MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.) (Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide.—MM. *Bourlier* et *Péracallo*.) (Pommard. — M. *Péracallo*.)

Les variétés de couleur foncée sont plus rares que les exemplaires de couleur claire.

PACHYTA. *Meg.*

1656. P. OCTOMACULATA. *F.* Très-rare. J'en ai trouvé quelques exemplaires sur les ombellifères du pré de la combe de Flavignerot, dans la première quinzaine de juin. (Rouvray. — M. *Emy*.)

Variété DECEMPUNCTATA. *Oliv.* (Rouvray ; pas rare. — M. *Emy*.)

1657. P. COLLARIS. *Linn.* Très-commune. Sur différentes fleurs, surtout celles de l'épine blanche, des rosiers sauvages, des plantains, etc. Du 13 mai au 11 juillet. Dijon, chemin de Fontaine, Daix, Talant, Chenôve, etc. ; fontaine de Larrey ; Parc ; Combe-aux-Serpents. Marsannay-la-Côte. Etc. (Rouvray ; commune. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)





STRANGALIA. *Serv.*

1658. S. NIGRA. *Linn.* Pas rare dans les bois de la plaine, beaucoup plus rare dans ceux de la montagne; très-rare en dehors des bois. Sur différentes fleurs, surtout les ombellifères et le cornouiller sanguin. Du 16 mai au 4 juillet. Dijon, chemin de Daix, sur la haie. Plombières, combe de Neuvon. Quetigny. Crimolois. Collonges-les-Premières. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, dans la combe. Chambolle. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier*, *Péragallo* et *André.*)

1659. S. VILICA. *F.* Rare. Sur les arbres et les arbustes. Du 20 mai au 20 juin. Dijon, cours du Parc; Allée-de-la-Retraite; remparts autour de la ville; bord du Canal du côté de Larrey. Chambolle, dans la combe. (Rouvray; pas rare. — M. *Emy.*) (Beauné. — MM. *Arias* et *Bourlier.*)

1660. S. ATRA. *F.* Assez rare. Dans les bois de la plaine sur différentes fleurs, notamment celles de cornouiller sanguin, de ronce, etc. Fixin, bois de la plaine. Collonges-les-Premières. Soirans-Fouffrans, bord de l'étang Noirot, sur les fleurs d'iris. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Serrigny, bois de Lépenot. — M. *Bourlier.*)

1661. S. AURULENTA. *F.* Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cette belle espèce, le 20 juillet, à Curley, dans le bois des Liards, sous des plateaux à l'ombre. (Rouvray; très-rare. — M. *Emy.*)

1662. S. ARMATA. *Herbst.* Commune. Dans les bois, surtout ceux de la plaine, et le fond des combes de ceux de montagne; sur différentes fleurs, principalement l'*Heraclium sphondylium*, le cornouiller sanguin, les ronces et les roses. Dijon, trouvée une fois dans un jardin de la ville sur une rose cultivée. Collonges-les-Premières. Plombières, combe de Neuvon. Marsannay-la-Côte. (Fixin. —

M. *Turnier*.) Chambolle. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray; très-commune. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

1663. S. ATTENUATA. *Linn*. (Beaune. — M. *André*.)

1664. S. MELANURA. *Linn*. Commune. Sur différentes fleurs, surtout les ombellifères, les plantains, etc., principalement dans les bois. Juin, juillet, commencement d'août. Dijon, chemins autour de la ville, surtout ceux où se trouvent des buissons et des haies; Combe-aux-Serpents; etc. Plombières, combe de Neuvon. Chambolle. Etc. (Rouvray; pas commune. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

1665. S. CRUCIATA. *Oliv*. Assez commune. Sur différentes fleurs, surtout les ombellifères, les ronces, etc., principalement dans les bois. Juin, juillet, commencement d'août. Plombières, combe de Neuvon. Chambolle. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Etc. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

#### LEPTURA. *Linn*.

1666. L. HASTATA. *F*. Cette espèce a été trouvée, je crois, et même en certain nombre, dans les environs de Dijon, notamment dans la vallée de l'Ouche, au-dessus de Pont-de-Pany, mais je ne l'ai jamais prise moi-même. M. *Arias* la signale comme trouvée, mais peu communément, dans les environs de Beaune, en été, sur des fleurs. M. *André* l'indique aussi comme se trouvant à Beaune.

1667. L. TOMENTOSA. *F*. Commune. Sur les ombellifères. Juillet, août. Dijon, chemins autour de la ville, principalement sur les fleurs de carotte sauvage. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

1668. L. CINCTA. *Gyll*. (Rouvray. — M. *Emy*.)







1669. L. MACULICORNIS. *De Gée*r. (Environs de Dijon, sur les buissons, dans les bois; mai. — M. *Nodot*.) (Beaune; pas commune. — M. *Arias*.)

1670. L. LIVIDA. *F*. Très-rare. J'ai trouvé seulement deux exemplaires de cette espèce dans les bois des environs de Dijon; mais il m'est impossible de me rappeler aucune circonstance de lieu ou d'époque. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune; pas commune; l'été sur les fleurs. — M. *Arias*.)

ANOPLODERA. *Muls.* — LEPTURA. *F*.

1671. A. SEXGUTTATA. *F*. Je n'ai jamais trouvé cet insecte, dont deux exemplaires ont été pris par M. *Tarnier*, à Gevrey, dans le bois du Chaignot, le 28 mai. (Rouvray; rare. — M. *Emy*.)

1672. A. RUFIPES. *F*. Très-rare. J'ai pris quelques exemplaires de cette espèce, à Fixin, dans le bois traversé par le chemin de fer, sur les fleurs de cornouiller sanguin, les 21 mai et 5 juin.

1673. A. LURIDA. *F*. (Rouvray; rare. — M. *Emy*.)

GRAMMOPTERA. *Serv*.

1674. G. LÆVIS. *F*. Pas rare. Dans les bois de la plaine, en fauchant, et sur les ombellifères dans les endroits ombragés. Du 17 mai au 20 juin. Dijon, au Parc, sur les fleurs d'*Anthriscus sylvestris*. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, bois de la plaine. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray; commune. — M. *Emy*.)

1675. G. QUADRIGUTTATA. *Muls.* Variété SUTURALIS. *F*. Rare. Je n'ai pris cette espèce qu'à Fixin, dans le bois qui est traversé par le chemin de fer, soit en fauchant, soit sur la barrière de ce chemin; du 1<sup>er</sup> au 29 mai.

Variété FEMORATA... (Rouvray; assez rare. — M. *Emy*.)

1676. G. ANALIS. *Panz.* — VARIANS. *Meg.* Rare. Dans les bois, en fauchant. Du 9 mai au 5 juin. Gevrey, dans la combe. Fixin, bois près du chemin de fer. Chambolle. (Beaune. — M. *Arias.*)

1677. G. RUFICORNIS. *F.* Pas rare. Dans les bois ombrueux, en fauchant et sur les ombellifères. Du 1<sup>er</sup> mai au 26 juin. Dijon, au Parc, sur l'*Anthriscus sylvestris* et sur le bois coupé. Plombières, combe de Neuvon. Athée, bois des Noues. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, bois de la plaine. Chambolle. (Rouvray; assez commune. — M. *Emy.*) (Beaune. — Commune; avril. M. *Arias.* — Bois de Battaut; avril; sur le chêne en fleurs. M. *Bourlier.* — M. *André.*)

Cette espèce vit, à l'état de larve, dans les tiges de lierre mort; j'en ai obtenu un certain nombre d'exemplaires qui sont sortis de tiges sèches de lierre rapportées du Parc.

1678. G. PRÆUSTA. *F.* Rare. Dans les bois, en fauchant. Mai. Fixin, bois près de la voie romaine. Chambolle. (Rouvray; assez rare; en battant l'aubépine en fleurs. — M. *Emy.*) (Beaune. — Mai, juin; chêne; peu commune. M. *Arias.* — Bois de Battaut; avril; moins commune que la *Ruficornis*. M. *Bourlier.* — M. *André.*)



## DONACIÆ.

### DONACIA. *F.*

1679. D. CRASSIPES. *F.* Pas rare. Sur les feuilles de nénuphar, *Nuphar lutea*, exposées au soleil (1). Juin, juillet,

---

(1) Cette espèce s'envole avec facilité; cependant il n'est pas difficile de la prendre en s'en approchant avec précaution, soit en se mettant à l'eau, soit à l'aide d'une barque, et en plongeant brusquement sous l'eau, avec la main, la feuille sur laquelle l'insecte se trouve posé; il s'y cramponne fortement dès qu'il est submergé, et il est alors





commencement d'août. Dijon, dans les parties profondes et peu courantes de l'Ouche, en amont de la ville. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *André.*)

1680. D. BIDENS. *Oliv.* (Beaune. — Très-commune. M. *Arias.* — M. *André.*)

1681. D. DENTATA. *Hoppe.* Commune. Sur les plantes aquatiques au bord des ruisseaux. Printemps, été. Fixin, bas du petit pré près de la voie romaine. Gevrey, près du chemin de Saulon, au-dessus du grand étang de Satenay; petit étang de Satenay. (Beaune. — M. *André.*)

1682. D. SPARGANII. *Ahrens.* Commune. Sur les plantes aquatiques, au bord des ruisseaux et des eaux stagnantes. Dijon, bords du Canal. Gevrey, près des étangs de Satenay.

1683. D. APPENDICULATA. *Ahrens.* — RETICULATA. *Sch.* Rare. J'en possède un exemplaire pris dans les environs de Dijon. M. *Tarnier* en a trouvé quelques-uns à Premeaux, près de la fontaine, le 1<sup>er</sup> août.

1684. D. DENTIPES. *F.* Pas rare. Sur les plantes aquatiques, au bord des ruisseaux et des eaux stagnantes. Fin avril, mai. Dijon, bords du Canal, bords de l'Ouche, fontaine de Larrey. La Rochette, près Oisilly, bords de la Vingeanne. Gevrey, près des étangs de Satenay. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

1685. D. LEMNÆ. *F.* Pas rare. Sur les plantes aquatiques, dans les lieux marécageux. Printemps. Fixin, bas du petit pré vers la voie romaine. Gevrey, près des étangs

---

très-facile de le saisir. On peut aussi en restant sur le bord prendre cet insecte, mais beaucoup plus difficilement, en se procurant un bâton léger et peu flexible et en s'en servant pour plonger la feuille de nénuphar; il faut ensuite, en approchant de l'insecte l'extrémité du bâton, chercher à lui faire quitter la feuille pour se fixer à cette extrémité de bâton, que l'on retire alors rapidement à soi, sans laisser à l'insecte le temps de s'envoler.

de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, près du chemin à l'ouest de la forêt. (Premeaux, près de la fontaine. — M. Tarnier.) (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1686. D. SAGITTARIÆ. *F.* Assez commune. Sur les plantes aquatiques, au bord des ruisseaux et des eaux stagnantes. Printemps, été. Dijon, bords du Canal, de l'Ouche et de la fontaine de Larrey. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, bord du petit étang près de la Chocelle. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1687. D. IMPRESSA. *Payk.* Commune. Sur les plantes aquatiques, surtout au bord des eaux stagnantes. Dijon, bords du Canal, de l'Ouche et de la fontaine de Larrey, principalement sur les iris. Gevrey. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, petit étang près de la Chocelle. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune; rare. — MM. Arias et André.)

1688. D. MENYANTHIDIS. *F.* Pas commune. Sur les plantes aquatiques. Printemps. Dijon, bords du Canal, en aval du bassin.

1689. D. LINEARIS. *Hoppe.* Très-commune. Sur les plantes aquatiques. Printemps. Dijon, bords du Canal, de l'Ouche, de la fontaine de Larrey. Gevrey. Etc. (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1690. D. SIMPLEX. *F.* Commune. Sur les plantes aquatiques, surtout dans les lieux marécageux. Printemps, commencement de l'été. Gevrey, près des étangs de Satenay. Collonges-les-Premières, grand étang. (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1691. D. MALINOVSKYI. *Ahrens.* J'ai pris un seul exemplaire de cette espèce dans les environs de Dijon; mais je n'ai aucun renseignement sur l'époque ou la localité. Cette espèce n'a, je crois, pas encore été signalée en France.

1692. D. HYDROCHERIDIS. *F.* (Rouvray. — M. Emy.)

1693. D. DISCOLOR. *Hoppe.* Pas rare. Sur les plantes







aquatiques dans les lieux marécageux. Printemps. Fixin, bas du petit pré vers la voie romaine. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

1694. D. AFFINIS. *Kunze.* Pas commune. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — Très-commune. M. *Arias.* — MM. *Bourlier* et *André.*)

1695. D. SERICEA. *Ill.* — NYMPHÆA. *F.* Assez commune. Sur les plantes aquatiques, dans les lieux marécageux. Printemps. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. Fixin, bas du petit pré vers la voie romaine. Gevrey, fossés au-dessus du grand étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — Pas commune. M. *Arias.* — MM. *Bourlier* et *André.*)



## CHRYSOMELE.

### ORSODACNA. *Latr.*

1696. O. MESPILI. *Lacord.* Rare. J'en ai trouvé quelques exemplaires en fauchant dans les bois de la plaine, au bas de Fixin, le 15 mai.

1697. O. CERASI. *F.* Commun. Dans les bois, sur les ombellifères; principalement dans les endroits ombragés. Du 6 mai au 26 juin. Dijon, au Parc, sur les fleurs d'*Anthriscus sylvestris*. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. (Messigny, vallon de Sainte-Foy. — M. *Nodot.*) Fixin, bois de la plaine. (Rouvray; bois au bord du Serein. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

### ZEUGOPHORA. *Kunze.* — AUCHENIA. *Meg.*

1698. Z. FRONTALIS. *Suffr.* Rare. Bois de la plaine, en fauchant. Mai. Fixin, bois près du chemin de fer.

1699. Z. SUBSPINOSA. *Linn.* Commune. Sur les pousses de peuplier et d'aulne. Mai, juin, septembre. Dijon, Parc; bords du Canal, en aval du bassin. Fixin, bois de la plaine. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Villenotte près Semur, en fauchant au bord des prés. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — Rare. M. Arias. — MM. Bourlier et André.)

LEMA. F.

1700. L. MERDIGERA. *Linn.* Très-commune dans les jardins, sur les liliacées, notamment le *Lilium candidum* et les autres espèces cultivées de ce genre, la *Fritillaria imperialis*, etc.; rare dans les bois. Avril à août. Dijon, jardins de la ville et des environs; Jardin botanique. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

La larve vit sur les mêmes plantes que l'insecte parfait.

1701. L. BRUNNEA. *F.* Pas commune. Dans les bois, sur le muguet, *Convallaria majalis*, principalement dans les bois de la plaine. Mai, juin. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, dans la combe. (Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. — M. Bourlier.) (Rouvray; bois Darié. — M. Emy.)

1702. L. DODECASTIGMA. *Suffr.* Commune. Sur les asperges. Mai à août. Dijon, sur les asperges *montées*, dans les vignes. Environs de Dijon.

Je suis très-disposé à ne considérer cette espèce que comme une variété de la suivante; on les trouve, en effet, simultanément, et il m'est arrivé souvent de prendre les deux espèces l'une sur l'autre, sans avoir vérifié néanmoins s'il y avait dans ce cas accouplement réel.

1703. L. DUODECIMPUNCTATA. *Linn.* Très-commune. Comme la précédente et aux mêmes époques. (Rouvray. — M. Emy.)





(Beaune. — MM. *Arias* et *André*. — Sur les céréales. M. *Bourlier*.)

1704. L. ASPARAGI. *Linn.* Extrêmement commune. Egalement sur les asperges. Mai à septembre. Dijon, sur les asperges montées, dans les jardins et les vignes; l'hiver sous les écorces; au printemps sous les pierres près des vignes où l'on cultive des asperges; Parc. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

La larve se trouve également sur l'asperge en même temps que l'insecte parfait.

1705. L. RUGICOLLIS. *Suffr.* (Rouvray, en fauchant dans une clairière près la corne des Trois-Bois; fin juillet. — M. *Emy*.)

1706. L. CYANELLA. *F.* Commune. Sur les céréales, les graminées, au bord des chemins et dans les bois. 30 avril à septembre; quelquefois l'hiver sous les écorces. Dijon, sur les blés et les orges lorsqu'ils sont encore verts; sur l'herbe au bord des chemins autour de la ville; au Parc. Plombières, combe de Neuvon. Marsannay-la-Côte. Etc. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

1707. L. ERICHSONI. *Suffr.* J'ai trouvé cette espèce à Plombières, dans la combe de Neuvon à Darois, où elle ne paraît pas rare en août et septembre. Il est probable qu'elle s'y trouverait avant cette époque; mais comme je l'avais confondue avec la précédente, dont elle est cependant bien distincte, jusqu'au mois d'août dernier (1858), je n'ai pas encore vérifié le commencement de son apparition.

1708. L. MELANOPA. *Linn.* Commune. Sur les céréales et les graminées au bord des chemins. Avril à septembre; quelquefois sous les pierres au premier printemps. Dijon, dans les champs et au bord des chemins autour de la ville, surtout avant la maturité des blés; barrière au-dessus de la

gare ; Combe-aux-Serpents. Plombières, combe de Neuvon. Blaisy-Bas, au bord du ruisseau. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

HISPA. *Linn.*

1709. H. ATRA. *F.* Assez commune. Sur les graminées le long des chemins, dans les prés. Avril à septembre ; souvent dès le premier printemps, sur ou sous les pierres. Dijon, chemins autour de la ville, surtout ceux de Fontaine, Daix, Talant, Chenôve ; bords du Canal, fontaine de Larrey ; près de l'Ouche. Plombières, combe de Neuvon. Marsannay-la-Côte. (Fixin. — M. *Tarnier*.) Villenotte près Semur. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

CASSIDA. *Linn.*

1710. C. EQUESTRIS. *F.* Commune. Sur les menthes dans les endroits humides. Mai à juillet. Dijon, bords de l'Ouche, etc. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

1711. C. HEMISPHERICA. *Herbst.* Rare. Dans les bois humides. Juin à octobre. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Villenotte près Semur, bord du bois de Champeaux. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux.

1712. C. AUSTRIACA. *F.* M. *Emy* indique cette espèce, avec doute, comme trouvée à Rouvray.

1713. C. VITTATA. *F.* J'ai trouvé un seul exemplaire de cette jolie espèce à Fénay, au nord d'un petit bois d'aulnes situé près de la voie romaine et dans lequel se trouve une source, en fauchant sur des menthes, le 20 juin 1858.

1714. C. MURRÆA. *Linn.* Pas rare. Dans les endroits humides sur les menthes. 31 mai à juillet. Dijon, trouvée







une fois par terre dans une rue. (Fauverney, à la Bayotte. — M. *Nodot*.) Fénay, bord du petit bois d'aulnes près de la voie romaine. Fixin, petit pré de l'autre côté du bois précité. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

Les exemplaires rouges sont beaucoup plus rares que les verts et je les ai trouvés en mai et juin, tandis que j'ai pris les seconds en juillet. Je n'oserais cependant affirmer que cette différence dans l'apparition des uns et des autres est constante.

1715. C. VIBEX. *Linn*. Assez commune. Dans les lieux humides, surtout dans les bois, sur différentes plantes. Juin, juillet. Plombières, combe de Neuvo à Darois. Flavignerot, dans le pré. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — Pas commune. M. *Arias*. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1716. C. RUBIGINOSA. *Ill.* — VIRIDIS. *F.* Commune. Sur les chardons et l'*Onopordon acanthium*. Mai à juillet. Dijon, chemins autour de la ville, surtout ceux qui sont peu fréquentés; Vieux-Suzon; Parc; Allée-de-la-Retraite; au pied des arbres le long du ruisseau qui sort du clos de Pouilly, sous les feuilles mortes, avril. Marsannay-la-Côte. (Fixin. — M. *Tarnier*.) Chambolle. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

La larve vit sur les mêmes plantes que l'insecte parfait.

1717. C. THORACICA. *F.* Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cette espèce, à Gevrey, au bord du petit étang de Satenay, le 3 septembre. (Beaune. — M. *André*.)

1718. C. AZUREA. *F.* Généralement rare; en fauchant dans les lieux un peu humides. Je l'ai trouvée communément le 8 juin à Plombières, dans la combe de Neuvo à Darois, sur le *Cucubalus inflatus*, dont elle rongait les feuilles

et le calice. Mai à juillet. Dijon, pré au bas du clos de Pouilly, sous les feuilles sèches au pied des arbres le long du ruisseau; fin avril. Plombières, combe de Neuven. Flavignerot, sous les pierres, fin avril. Gevrey, dans la combe. Fixin, bois de la plaine. Chambolle. (Rouvray; fort rare. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1719. C. SANGUINOLENTA. *F.* Pas rare. Dans les prés et les lieux humides. Juin. Flavignerot, dans le pré. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sur des chardons. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1720. C. MARGARITACEA. *Schaller.* J'en ai pris seulement deux exemplaires, dont l'un le 5 octobre à Villenotte, au bord du bois de Champeaux; je n'ai aucune donnée sur le second. (Rouvray; pas commune. — M. Emy.)

1721. C. OBLONGA. *Ill.* Rare. Endroits humides. Juin. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc, en fauchant. (Beaune. — M. Arias.)

1722. C. NOBILIS. *Linn.* — *PULCHELLA. Panz.* Pas commune. Dans les prés et les endroits humides, en fauchant. Mai. Dijon, rempart de Tivoli, par terre; viaduc du chemin de fer devant l'Arquebuse; pré au bas du clos de Pouilly, sous les feuilles sèches, fin avril. (Fixin. — M. Tarnier.) Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1723. C. OBSOLETA. *Ill.* Pas rare. Endroits marécageux. Du 10 juin au 3 septembre. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. (Beaune. — M. Bourlier.)

1724. C. FERRUGINEA. *F.* Commune. Dans les bois, en fauchant. Juin, juillet. Plombières, combe de Neuven. Chambolle. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. André.)





1725. *C. NEBULOSA*. *Linn.* — *AFFINIS*. *F.* Pas rare. Dans les endroits humides, en fauchant. Du 15 mai au 5 juillet. Dijon, Vieux-Suzon. Plombières, combe de Neuvon à Darrois. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, bois de la plaine. (Rouvray; commune. — *M. Emy.*) (Beaune. — *MM. Arias, Bourlier et André.*)

*ADIMONIA. Laichart.*

1726. *A. LITTORALIS*. *F.* (Rouvray; pas commune. — *M. Emy.*)

1727. *A. TANACETI*. *F.* Commune. Par terre; sur les friches, le bord des chemins et des fossés, surtout sur les montagnes. Été, automne; quelquefois l'hiver sous les pierres. Dijon, chemins autour de la ville; montagnes de Talant, Larrey, Sainte-Anne, etc. Plombières, combes de Neuvon, et sur le viaduc. Etc. (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune. — *MM. Arias, Bourlier et André.*)

1728. *A. RUSTICA*. *Schall.* Assez commune. Par terre; sur les friches et les pâturages, surtout dans les lieux un peu humides. Du 20 juin au 30 août. Dijon, fossé à l'est du cours du Parc; fossé au bas des tours du Château; derrière le réservoir de la place Darcy. Fixin et Gevrey, bois de la plaine dans les clairières près de la voie romaine. (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune. — Rare. *M. Arias.* — *MM. Bourlier et André.*)

1729. *A. INTERRUPTA*. *Oliv.* (Rouvray; assez rare. — *M. Emy.*) (Beaune; rare. — *M. Arias.*)

1730. *A. SANGUINEA*. *F.* Rare. Environs de Dijon, dans les lieux humides. (Rouvray; commune sur l'aubépine en fleurs. — *M. Emy.*) (Beaune. — *MM. Bourlier et André.*)

1731. *A. CAPRÆ*. *Linn.* Commune. Dans les endroits humides, surtout sur le saule Marceau. Juin à septembre. Flavignerot, dans la combe. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Etc. (Rouvray; très-commune. — *M. Emy.*) (Beaune. — *MM. Arias et André.*)

GALLERUCA. *Geoffr.*

1732. G. VIBURNI. *Payk.* Assez commune. Dans les bois sur le *Viburnum lantana*. Fin août, septembre, commencement d'octobre. Bois des environs de Dijon, Flavignerot, Plombières, combe de Neuvon, etc. Baume-la-Roche. (Rouvray. — M. Emy.)

La larve vit sur les feuilles du même arbrisseau.

1733. G. XANTHOMELÆNA. *Schr.* — CALMARIENSIS. *F.* Assez commune. Sur les rejets d'orme au pied de ces arbres. Mai à juillet; quelquefois l'hiver dans le tronc pourri des ormes. Dijon, au Parc; route de Langres; Allée-de-la-Retraite. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias et André.)

La larve se trouve également sur les feuilles d'orme.

1734. G. NYMPHÆÆ. *Linn.* Pas rare. Sur les feuilles de nénuphar, *Nuphar lutea*. Juillet. Dijon, dans les parties stagnantes de l'Ouche. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. André.)

1735. G. LINEOLA. *F.* Commune. Dans les lieux humides sur les plantes aquatiques et sous les détritns. Juin à septembre. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Pontailler-sur-Saône; octobre. — M. Dudrumel.) (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias et Bourlier.)

1736. G. CALMARIENSIS. *Linn.* — LYTHRI. *Gyll.* Commune. Comme la précédente. Mai à septembre. Dijon, barrière au-dessus de la gare; avril. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. (Semur. Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1737. G. TENELLA. *Linn.* Pas commune. Comme les deux précédentes. Juin, juillet. Gevrey, bord du petit de Satenay. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. (Beaune. — M. Arias.)







MALACOSOMA. *Chevr.*

1738. M. LUSITANICA. *Linn.* Commune. Dans les bois secs, dans les clairières sur différentes plantes. Juin. Gevrey. Chambolle. Etc.

AGELASTICA. *Chevr.*

1739. A. HALENSIS. *Linn.* — NIGRICORNIS. *F.* Commune. Dans les bois de montagne, sur différentes plantes, notamment le *Melampyrum arvense*, les *Galium*, etc. Du 3 août au 19 octobre. Plombières, bois de Neuvon. Baume-la-Roche. Chaignay. Chambolle. Concéur. (Rouvray; rare. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

1740. A. ALNI. *Linn.* Très-commune dans les bois d'aulnes, surtout sur les pousses d'un an après la coupe, quelquefois sur d'autres arbres, principalement le noisetier; beaucoup moins commune dans la montagne que dans la plaine. Fin avril à septembre. Dijon, dans la ville, au vol et sur les murs, et sur la barrière au-dessus de la gare; avril; Parc; fontaine de Larrey; Combe-aux-Serpents. Marsannay-la-Côte. Gevrey, bord du petit étang de Satenay; excessivement commune, ainsi que sa larve, sur les feuilles d'aulnes, qui sont souvent presque entièrement détruites par cet insecte. Chambolle. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

PHYLLOBROTICA. *Chevr.*

1741. P. QUADRIMACULATA. *F.* Rare. Dans les lieux marécageux sur les plantes aquatiques. Juin, juillet. Dijon, sur le parapet au-dessus de la gare. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Villers-les-Pots, au bord d'un fossé dans le bois. Collonges-les-Premières, pas bien rare en 1857 au-dessus du grand étang, après la coupe du bois,

surtout sur le *Lycopus europæus*. (Rouvray; en fauchant sur la digue du bas des étangs de Bucher. — M. Emy.) (Pommard; route de Nantoux, sur du trèfle. — M. Péragallo.)

CALOMICRUS. Dillw. — LUPERUS. Geoffr.

1742. C. CIRCUMFUSUS. Marsh. — SUTURELLUS. Ill. Très-commun. En fauchant sur les graminées dans les clairières des bois de montagne. Du 8 juin au 13 juillet. Plombières, bois de Gontard, près de l'entrée de la grotte, et les autres coteaux peu boisés. Marsannay-la-Côte, montagne entre les deux combes. Chambolle. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

LUPERUS. Geoffr.

1743. L. RUFIPES. F. Commun. Sur les arbres et les arbustes, surtout les haies vives; vole le soir. Mai, juin. Dijon, fontaine de Larrey; chemin de Daix; Parc. Plombières, combe de Neuvo. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1744. L. FLAVIPES. Linn. Très-commun. Sur les arbres et les arbustes, surtout les haies vives; extrêmement commun au vol autour des haies à l'entrée de la nuit. Mai, juin. Dijon, au bord des chemins sur les haies et les buissons; Combe-aux-Serpents; fontaine de Larrey; Parc; etc. Bois des environs de Dijon, sur les feuilles des arbres. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias et Bourlier.)

ALTICA. Linn. — GRAPTODERA. Chev.

1745. A. OLERACEA. F. Très-commune. Sur différentes plantes, surtout les crucifères; dans les bois, en fauchant, etc. Avril à octobre; quelquefois l'hiver sous les écorces des arbres et sous les pierres. Dijon, dans la ville





sur les murs et dans les jardins, surtout les jardins potagers; Jardin botanique; barrière au-dessus de la gare; Parc; cours du Parc, sur les troncs d'arbres, fin février, mars; chemin de la Charmette, après avoir passé le chemin de Fontaine, excessivement commune le 5 octobre sur le petit talus exposé au soleil au-dessus de l'ornière de droite, par terre et sur les plantes basses. Plombières, combe de Neuvon. Partout dans les environs de Dijon. Villenotte près Semur. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1746. A. LYTHR. Aubé. Commune. Sur les plantes aquatiques, notamment les menthes, le *Lythrum salicaria*, etc. Juin, juillet. Dijon, ruisseau de la fontaine qui est au bas de l'Asile des aliénés, bord de l'Ouche. Collonges-les-Premières. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1747. A. ERUGÆ. Aubé. Pas rare. Dans les bois, sur les feuilles de chêne. Juin. Fixin. Gevrey, bois de la plaine. (Beaune. — M. André.)

1748. A. MERCURIALIS. Hellw. Commune. Sur la *Mercurialis perennis*. Mai à septembre. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Marsannay-la-Côte, le long du sentier au-dessus de la fontaine qui est près du parc de Gouville. Flavignerot. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune; rare. — M. Arias.)

1749. A. CICATRIX. Ill. J'ai trouvé un certain nombre d'exemplaires de cet insecte à Dijon, en avril et mai, sur la barrière au-dessus de la gare et sous les pierres au bord d'une sablière près de l'Allée-de-la-Retraite.

PODAGRICA. Chevr.

1750. A. FUSCIPES. F. Commune. Sur les mauves. Du 23 mai au 4 octobre. Dijon, dans les jardins, sur les mauves, guimauves, roses à bâtons; barrière au-dessus de la gare, avril; Jardin botanique, sur différentes malvacées des genres *Malva Anoda*, *Althæa*, *Lavathera*, etc.;

mais surtout sur les *Althæa rosea* et *officinalis*. Plombières, combe de Neuvon. Gevrey, bois de la plaine. (Rouvray. — M. Emy.)

1751. A. FUSCICORNIS. *Linn.* — FULVIPES. *F.* Très-commune. Comme la précédente; à peu près aux mêmes époques et dans les mêmes localités. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

CREPIDODERA. *Chevr.*

1752. A. TRANSVERSA. *Marsh.* Commune. Sur les charbons, dans les endroits humides. Juin, juillet. Dijon, Vieux-Suzon. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Etc. (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

1753. A. EXOLETA. *Linn.* Très-commune. Sur les charbons et autres plantes voisines, dans les lieux humides. Juin, juillet, septembre. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Flavignerot, dans la combe. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

1754. A. RUFIPES. *Linn.* — RUFICORNIS. *F.* Rare. Je n'en possède que trois exemplaires pris dans les environs de Dijon, dont un à Flavignerot le 3 juin.

1755. A. NITIDULA. *F.* J'en ai pris un seul exemplaire aux environs de Dijon. Il est indiqué sur mes notes comme trouvé dans la combe de Marsannay-la-Côte, sur le saule Marceau, le 17 juin; mais j'ai quelques doutes sur cette indication, qui pourrait bien se rapporter à l'espèce suivante.

1756. A. HELXINES. *F.* — FULVICORNIS. *F.* Très-commune. Sur le saule Marceau, quelquefois sur d'autres espèces de saule. Mai à septembre. Dijon, barrière au-dessus de la gare. Bois des environs de Dijon, soit dans la montagne, soit dans la plaine, mais plus communément dans cette dernière condition. La Rochette près Oisilly. Collonges-les-Premières. Villenotte près Semur. Saint-







Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Pontailier-sur-Saône, sous des écorces de chêne; octobre. — M. *Dudrumel.*) (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

MM. *Arias, Bourlier et André* signalent sous le nom de *Aurata* une espèce qui doit certainement être rapportée à l'une des nombreuses variétés de l'*Helxines*.

1757. A. MODEERI. *Linn.* Peu commune. Endroits marécageux, en fauchant. Juin, juillet. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. (Rouvray; rare. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *André.*)

1758. A. PUBESCENS. *Ent. Hefte.* Commune. Dans les lieux marécageux, en fauchant et sous les détrit. Du 25 avril au 3 septembre. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. (Rouvray. — M. *Emy.*)

1759. A. ATROPE. *Markel.* Commune (1). Sur l'*Atropa belladonna*. Du 20 mai au 30 octobre. Dijon, Jardin botanique, sur la plante précitée et sur la *Nicandra physalodes*, plante non indigène. Blaisy-Haut, au-dessus de la montée du coteau sous lequel est percé le tunnel. Concœur, bois de Mantuan, sur la lisière dans l'endroit bas près de la limite nord de la commune.

1760. A. VENTRALIS. *Ill.* — NIGRIVENTRIS. *Chevrolat.* Pas

---

(1) L'indication *commune* appliquée à cette espèce veut dire que celle-ci se trouve communément sur la belladone; mais comme cette plante n'est pas commune dans nos environs et que l'insecte ne se trouve pas sur d'autres végétaux ou dans d'autres conditions, on pourrait le chercher longtemps sans le rencontrer; une fois la plante découverte on le prend abondamment, quelquefois par centaines, sur le même pied d'*Atropa belladonna*.

Cette observation s'applique également à d'autres espèces de coléoptères vivant sur des plantes spéciales, plantes qu'il est indispensable de rechercher préalablement.

rare. Dans les endroits humides, surtout au bord de l'eau. Avril à juin. Dijon, sur des plantes aquatiques, notamment le *Nasturtium amphibium*, entre la route d'Auxonne et le chemin de Morvau, dans une sablière après son exploitation; sur une barrière dans un jardin à l'est de l'Asile des aliénés. Fixin, bois de la plaine. Plombières, combe de Neuvon, près de la fontaine qui se trouve dans l'embranchement de gauche.

1761. A. HORTENSIS. *Latr.* (Rouvray. — M. Emy.)

*PHYLLOTRETA. Chevr.*

1762. A. EXCISA. *Redt.* — CINCTA. *Dej.* Pas commune. Lieux humides et voisins de l'eau. Juin, juillet. Gevrey, au bord du ruisseau dans le bois qui est à gauche du chemin de Saulon, au-dessus du grand étang de Satenay. Plombières, combe de Neuvon à Darois.

1763. A. BRASSICÆ. *F.* Pas rare. Dans les prairies humides, au bord des ruisseaux et des eaux stagnantes. Mai, juin. Dijon, trouvée une fois dans la ville sur un mur. La Rochette, près Oisilly, en fauchant dans les prés au bord de la Vingeanne; assez commune. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Collonges-les-Premières. Etc. (Rouvray; battue des haies sèches. — M. Emy.) (Beaune. — M. Bourlier.)

1764. A. SINUATA. *Dej.* Pas très-commune. Sur différentes plantes, notamment les crucifères. Avril à juin. Dijon, dans la ville sur les murs exposés au nord, surtout dans le voisinage des urinoirs (1); barrière au-dessus de

---

(1) Cette circonstance du voisinage des urinoirs n'est pas indifférente, comme on pourrait le supposer; et leur effet ne se borne pas uniquement à la production contre les murs de l'humidité que semblent rechercher les insectes, humidité qui existe ordinairement indépendamment de ces urinoirs, car c'est surtout par les temps chauds et lorsque l'air est humide qu'on rencontre le plus de coléoptères sur les murs, le plus souvent à l'ombre et à l'exposition du nord. L'odeur de l'urine sem-





la gare. Plombières, combe de Neuvon et les autres bois des environs de Dijon, surtout en fauchant sur la moutarde que l'on cultive sur les places à charbon. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune. — M. André.)

1765. A. FLEXUOSA. *Ent. Hefte*. Très-commune. Dans les jardins potagers sur les crucifères ; sur les navettes et les colzas dans les champs, surtout lorsque ces plantes sont encore peu développées ; sur les murs à l'ombre ; dans les bois en fauchant, surtout sur les crucifères cultivées dans les places à charbon ; quelquefois l'hiver sous les écorces. Avril à septembre. Dijon, dans les champs de navette et de colza ; dans les jardins ; Jardin botanique ; barrière au-dessus de la gare ; sur les murs dans la ville, surtout ceux exposés à l'ombre et voisins des urinoirs ; près au bord de l'Ouche ; Parc ; fontaine de Larrey ; etc. Plombières, combe de Neuvon, etc. Flavignerot. Magny-sur-Tille. Collonges-les-Premières. Blaisy-Bas et Blaisy-Haut. Chambolle. Etc. (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1766. A. NEMORUM. *Linn.* Commune. Se trouve à peu près dans les mêmes conditions, aux mêmes époques et dans les mêmes localités que la précédente. (Rouvray.

---

ble attirer particulièrement certaines espèces d'*Altica*, notamment celles du groupe des *Phyllotreta*.

Une autre observation vient encore démontrer la propension des *Altica* pour l'urine.

M. Dudrumel avait exposé dans son jardin un vase cylindrique dans lequel se trouvait de l'urine destinée à une manipulation chimique ; à côté se trouvait un autre vase de même forme contenant de l'eau, mais dont l'ouverture était trois ou quatre fois plus considérable que celle du premier. Malgré cette différence d'ouverture, une grande quantité d'*Altica* vint se noyer dans le vase d'urine, et un très-petit nombre, au contraire, fut trouvé dans le vase d'eau.

Ne pourrait-on pas trouver là un moyen facile, sinon de détruire complètement, au moins de diminuer notablement quelques espèces d'*Altica* qui, dans certaines circonstances, causent des dégâts considérables ? L'essai est si simple qu'il mérite bien d'être tenté. Il suffirait de disposer dans les jardins potagers, et même dans les champs de crucifères, des vases d'urine, soit à l'ombre, soit au soleil.

— M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1767. A. ANTENNATA. *Ent. Hefte*. Pas rare. Sur le *Reseda luteola*; très-rarement sur le *R. lutea*. Mai, juin. Dijon, chemins autour de la ville, principalement ceux du côté de Fontaine et Talant, sur la plante précitée; quelquefois sur les murs au bord de ces chemins, en avril. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées, sur l'*Erysimum lanceolatum*. (Rouvray. — M. Emy.)

1768. A. ATRA. *Payk*. Assez commune. Sur les crucifères et en fauchant sur différentes plantes, surtout dans les lieux humides. Avril à juillet. Dijon, sur les murs à l'ombre, dans la ville. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées, sur l'*Erysimum lanceolatum*. Plombières, combes de Neuvon, en fauchant, surtout sur les crucifères cultivées dans les places à charbon. Collonges-les-Premières. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias et André.)

1769. A. MELÆNA. *Ill*. Pas commune. Environs de Dijon. Ressemble beaucoup à la précédente, avec laquelle elle est généralement confondue; elle en diffère par la couleur générale, la ponctuation plus serrée, les antennes entièrement noires, à 5<sup>e</sup> article évidemment plus long que le 4<sup>e</sup>; ces deux articles dilatés chez les mâles.

1770. A. PŒCILOCERA. *Comolli*. Pas rare. Se trouve à peu près dans les mêmes conditions que l'A. Atra, aux mêmes époques et dans les mêmes localités.

1771. A. LEPIDII. *Ent. Hefte*. Commune. Sur les crucifères et quelques autres plantes. Avril à octobre. Dijon, dans les jardins, surtout les jardins potagers; Jardin botanique; barrière au-dessus de la gare; sur les murs dans la ville. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées, sur l'*Erysimum lanceolatum*. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. (Rouvray. — M. Emy.)







1772. A. EMARGINATA... (Rouvray; rare. — M. Emy.)

1773. A. ALBELLA... (Rouvray. — M. Emy.)

APHTHONA. Chevr.

1774. A. CYPARISSIÆ. Ent. Hefte. Commune. Sur l'*Euphorbia cyparissias*. Juin, commencement de juillet. Dijon, Vieux-Suzon; le long du mur de Montmuzard; etc. Plombières, combe de Neuvon à Prenoïs.

1775. A. CYANELLA. Redt. — EUPHORBIE. F. Commune. En fauchant dans les endroits humides. Juin à août, quelquefois en avril sur les murs, les barrières et sous les feuilles sèches. Dijon, dans la ville sur les murs; barrière au-dessus de la gare; mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles tombées; (derrière le Parc, sur l'euphorbe. — M. Nodot.) Plombières, combe de Neuvon. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune; rare. — M. Arias.)

1776. A. EUPHORBIE. Redt. Pas rare. Environs de Dijon, dans les lieux humides, en fauchant.

1777. A. PALUSTRIS. Chevr. (Rouvray. — M. Emy.)

1778. A. COERULEA. Payk. Très-commune. Dans les endroits marécageux, sur les feuilles d'iris. Du 7 avril au 3 septembre. Dijon, Jardin botanique sur les iris contre le mur de clôture au midi. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias et André.)

1779. A. CAMPANULÆ. Redt. Commune. En fauchant sur les pelouses dans les bois. Août, septembre. Plombières, combe de Neuvon, dans les clairières, notamment dans le bois de Gontard.

1780. A. SALICARIÆ. Payk. Pas commune. Environs de Dijon, dans les lieux humides. Collonges-les-Premières, en fauchant dans le bois, 12 juillet.

1781. A. LUTESCENS. Gyll. Pas rare. Dans les endroits

humides, surtout les bois, en fauchant. Fin avril à juillet. La Rochette près Oisilly, près au bord de la Vingeanne. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux.

1782. A. NIGRICEPS. *Redt.* Un seul exemplaire. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant, 29 août.

BALANOMORPHA. *Chevr.*

1783. A. RUSTICA. *Linn.* — SEMIÆNEA. *F.* Rare. En fauchant, surtout dans les bois. Juillet à octobre. Dijon, sous une pierre au bord d'un chemin au nord de la ville; printemps. Blaisy-Haut, dans le bois près du dessus du tunnel. Villenotte près Semur, bord du bois de Champeaux. (Rouvray; pas commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — Un seul exemplaire. M. *Arias.* — M. *André.*)

1784. A. CHRYSANTHEMI. *Ent. Hefte.* (Rouvray; pas commune. — M. *Emy.*)

LONGITARSUS. *Latr.* — TEINODACTYLA. *Chevr.*

1785. L. ECHII. *Ent. Hefte.* Pas rare. Sur l'*Echium vulgare* et le *Cynoglossum officinale*. Avril, mai. Dijon, sur le mur au midi du réservoir de la place Darcy, après le coucher du soleil, mars et avril; Jardin botanique sur une *Anchusa tinctoria*; chemin de Corcelles. Plombières, au-dessus de la montagne du côté de Daix. (Beaune. — MM. *Arias* et *André.*)

1786. L. ANCHUSÆ. *Payk.* Commun. Sur le *Symphytum officinale*, l'*Echium vulgare* et le *Cynoglossum officinale*. Du 22 avril au 6 juillet. Dijon, chemins autour de la ville, notamment ceux du côté de Fontaine et de Talant sur les deux dernières plantes indiquées; Jardin botanique, très-commun sur les plantes des genres *Cynoglossum*, *Anchusa*, *Asperugo*, *Myosotis*, *Symphytum*, *Pulmonaria*, *Echium*





et *Lithospermum*. Plombières; combe de Neuvon à Pre-nois. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, très-com-mun sur le *Symphytum officinale*. (Beaune. — MM. *Arias* et *André*.)

1787. L. HOLSATICUS. *Linn.* Un seul exemplaire pris à Gevrey, en fauchant au bord du petit étang de Satenay, le 10 juin. (Rouvray; grande mare du bois Darié, en fau-chant. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *André*.)

1788. L. QUADRIPISTULATUS. *F.* Commun. Sur le *Cyno-glossum officinale*. Du 27 mai au 27 juillet. Dijon, chemins autour de la ville, surtout du côté de Corcelles-les-Monts, de Talant et de Fontaine; autour du mur de Montmuzard; Jardin botanique sur plusieurs espèces de *Cynoglossum*. Talant autour du clos Echalié et dans la petite combe qui conduit à la route de Plombières au-delà du moulin Ves-son. (Beaune. — M. *André*.)

1789. L. DORSALIS. *F.* (Fontaine-les-Dijon, chemin qui conduit au clos de Pouilly, près de Suzon, dans l'eau des ornières. — M. *Ph. d'Aumont*.) (Gevrey, près du chemin de fer, en fauchant dans un endroit humide, juin. — M. *Pérangolo*.) (Beaune. Trouvé en 1851 en grande abon-dance par MM. *Arias* et *Pérangolo* contre un viaduc du che-min de fer alors récemment construit et sous de petites pierres au bord d'une mare voisine du même viaduc, en avril; l'année suivante il était encore abondant; plus tard quelques exemplaires ont été pris par les mêmes entomo-logistes et par MM. *Bourlier* et *André*. Depuis quelque temps cet insecte paraît avoir à peu près disparu de ces localités.) (Rouvray; fort rare. — M. *Emy*.)

1790. L. SISYMBRII. *F.* Pas rare. Sur les *Verbascum*. Comme le suivant pour l'époque et les localités.

1791. L. VERBASCI. *Panz.* Commun. Sur différentes es-pèces de *Verbascum*, rarement sur d'autres plantes; trouvé cependant sur l'*Echium vulgare*, la *Scrophularia*

*verna* et un *Symphytum*. Du 26 mars au 19 octobre. Dijon, Jardin botanique ; chemins autour de la ville, surtout ceux du côté de Fontaine, Talant, Corcelles ; montagne de Saint-Joseph. Talant. Plombières, chemin de Velars et combe de Neuvon à Prenois. Flavignerot. Gevrey, voie romaine entre les deux étangs de Satenay. (Rouvray ; pas commun. — M. Emy.)

1792. L. MELANOCEPHALUS. *Sch.* Environs de Dijon. (Beaune ; commun. — M. Arias.)

1793. L. OCHROLEUCUS. *Marsh.* Pas rare. Dans les lieux humides, en fauchant. Juin à septembre. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Gevrey, parties humides des bois de la plaine. (Beaune. — M. André.)

1794. L. TABIDUS. *F.* (Rouvray. — M. Emy.)

1795. L. ATRIGILLUS. *Linn.* Commun. Endroits humides, en fauchant. Du 15 avril au 6 juillet. Dijon, dans la ville sur les murs ; Vieux-Suzon ; mur au nord du clos de Pouilly sous des feuilles sèches. Plombières, combes de Neuvon. La Rochette près Oisilly. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Beaune. — MM. Arias et André.)

1796. L. ATRICAPILLUS. *Duft.* Pas rare. En fauchant dans les endroits humides. Avril, mai. Dijon, dans la ville sur les murs à l'ombre. Plombières, chemin de Velars, sur un mur. Flavignerot.

1797. L. NASTURTH. *F.* Commun. Dans les lieux humides sur différentes plantes et en fauchant. Du 25 avril au 26 septembre. Dijon, Jardin botanique. Plombières, combes de Neuvon. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. Collonges-les-Premières. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, sur différentes plantes, *Senecio paludosus*, *Symphytum officinale*, etc. Villenotte près Semur.

1798. L. LÆVIS. *Duft.* Rare. Plombières, combe de Neuvon à Darois ; juillet.

1799. L. PRATENSIS. *Panz.* Peu commun. Lieux humides. Dijon, Vieux-Suzon, juin. Environs de Dijon.







1800. L. PUSILLUS. *Gyll.* Pas très-commun. Environs de Dijon.

1801. L. LURIDUS. *Oliv.* Commun. Dans les lieux humides, en fauchant. Du 17 avril au 3 octobre. Dijon, sur le *Nasturtium amphibium* et d'autres plantes dans l'eau d'une sablière entre la route d'Auxonne et le chemin de Morvau. Plombières, combes de Neuvon à Baume-la-Roche. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray.—M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

1802. L. PARVULUS. *Payk.* Pas rare. Lieux humides. Plombières, combe de Neuvon à Darois; juillet, août. Etc.

PSYLLIODES. *Latr.*

1803. P. AFFINIS. *Payk.* Commune. Sur le *Solanum dulcamara*. Fin mai, juin, juillet. Dijon, bords de l'Ouche. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées. Blaisy-Bas. Collonges-les-Premières. Gevrey, bois d'aulnes, près du petit étang de Satenay.

1804. P. PROPINQUA. *Redt.* Pas commune. Environs de Dijon.

1805. P. DULCAMARÆ. *Ent. Hefte.* Pas rare. Son nom semble indiquer que cet insecte se trouve sur le *Solanum dulcamara*; je ne l'ai pas, à la vérité, observé sur cette plante; mais, comme elle est abondante dans les lieux où j'ai pris l'insecte en fauchant, il est à peu près certain qu'il vit sur la plante précitée, mais seulement dans les lieux marécageux. Fin avril à juillet. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, en fauchant et sous les détrit. Collonges-les-Premières, au-dessus du grand étang. (Rouvray. — M. *Emy.*)

1806. P. CUPREA. *Ent. Hefte.* Pas commune. Dans les lieux humides. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt; juillet. Etc.

1807. *P. ATTENUATA. Ent. Hefte.* Très-commune. Sur différentes plantes, notamment sur la chenevière dans les champs, et sur le houblon dans les lieux humides. Du 25 avril au commencement de septembre. Dijon, au Parc ; sur la barrière au-dessus de la gare ; chemin de Daix ; etc. Talant, dans le petit vallon au nord, du côté de Fontaine ; près de la Fontaine-aux-Fées, sur l'*Erysimum lanceolatum*. Plombières, combe de Neuvon, extraordinairement commune dans un champ de chenevière au commencement de septembre. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, dans les coupes récentes sur le houblon. (Beaune. — MM. Arias et André.)

1808. *P. CUCULLATA. Ill. — SPERGULÆ. Gyll.* (Rouvray ; sur l'ortie. — M. Emy.) (Beaune ; rare. — M. Arias.)

1809. *P. CHRYSOCEPHALA. Linn.* Très-commune. Sur la navette et le colza, dans les champs, surtout à l'époque où ces plantes approchent de leur maturité ; rarement ailleurs. Fin mai à octobre. Dijon et les environs, partout où l'on cultive de la navette ou du colza. Baume-la-Roche. Villenotte près Semur. Fixin, bois de la plaine. (Beaune. M. André.)

1810. *P. RAPÆ. Ill. — NAPI. F.* Commune. Sur les crucifères. Avril à juillet. Dijon, Vieux-Suzon, etc. Plombières, combes de Neuvon. Blaisy-Bas.

1811. *P. PICEA. Redt.* (Rouvray. — M. Emy.)

PLECTROSCELIS. *Chevr.*

1812. *P. DENTIPES. Ent. Hefte.* Commune. En fauchant, principalement dans les bois. Mai à octobre. Dijon, dans la ville sur les murs et au bas du mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles sèches ; avril. Plombières, combe de Neuvon. Villenotte près Semur. Collonges-les-Prémières, Bois-le-Duc, en fauchant et sur le *Lythrum salicaria*. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)





1813. P. MANNERHEIMII. *Gyll.* — EUMOLPUS. *Dej.* Deux exemplaires. Environs de Dijon.

1814. P. ARIDELLA. *Payk.* Commune. Dans les bois, en fauchant. Mai à octobre. Dijon, dans la ville sur les murs et sous les feuilles sèches au bas du mur au nord du clos de Pouilly ; 30 mars, avril. Plombières, combes de Neuven. Maguy-sur-Tille, bois de Malforêt. Baume-la-Roche. Colonges-les-Premières. Gevrey, bois de la plaine, surtout près du petit étang de Satenay. Villenotte près Semur, bord du bois de Champeaux. (Beaune. — Pas commune. M. Arias. — M. André.)

1815. P. ARIDULA. *Gyll.* Commune. Comme la précédente, aux mêmes époques et dans les mêmes localités ; trouvée de plus à Talant près de la Fontaine-aux-Fées, sur un *Erysimum lanceolatum*, et à la Rochette près Oisilly, en fauchant sur les prés au bord de la Vingeanne. (Beaune. — MM. Arias et André.)

1816. P. TIBIALIS. *Ill.* Un seul exemplaire trouvé à Gevrey, au bord du petit étang de Satenay, sous des détritus, le 3 septembre.

DIBOLIA. *Latr.*

1817. D. FEMORALIS. *Redt.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Beaune. — M. André.)

1818. D. OCCULTANS. *Ent. Hefte.* Rare. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant ; fin avril à juin. (Montberthaud ; chaumes en haut du Serein ; été et automne ; en fauchant. — M. Emy.)

1819. D. CRYPTOCEPHALA. *Ent. Hefte.* J'ai trouvé cette espèce en certain nombre le 13 juin dernier (1858), à Plombières, sur le coteau du bois de Gontard, en fauchant dans les clairières. (Rouvray. — M. Emy.)

ARGOPUS. *Fisch.*

1820. A. CARDUI. *Kirby*. Commun. Sur les chardons, principalement le *Carduus nutans* et le *Cirsium lanceolatum*, surtout dans les lieux humides. Juin, juillet. Dijon, Vieux-Suzon ; bord de l'Ouche derrière le Parc, en aval du pont du chemin de fer de Besançon ; etc. Plombières, combes de Champmoron et Neuvon. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1821. A. TESTACEUS. *F.* Moins commun que le précédent. Sur les mêmes plantes, à la même époque et dans les mêmes localités. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

APTEROPEDA. *Chevr.*

1822. A. CILIATA. *Oliv.* Pas commune. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant ; juin à août. (Rouvray ; battue des haies. — M. Emy.)

1823. A. CONGLOMERATA. *Ill.* Rare. Plombières, combe de Neuvon à Darois, et petite combe près de la ferme du Fays, en fauchant ; juin à août. Gemeaux, bois de la Charme, sous la mousse ; octobre.

MNIOPHILA. *Steph.*

1824. M. MUSCORUM. *Ent. Hefte.* — LEODIENSIS. *Wesmaël*. Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

TIMARCHA. *Meg.*

1825. T. TENEBRICOSA. *F.* Commune. Par terre, sur l'herbe, sous les pierres, surtout sur les montagnes. Toute l'année ; l'hiver, seulement sous les pierres et beaucoup







plus rarement. Dijon, chemins peu fréquentés autour de la ville; montagnes de Talant, Larrey, Sainte-Anne; Parc; etc. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

La larve est commune sur une espèce de *Galium*, plante sur laquelle se trouve aussi quelquefois l'insecte parfait.

1826. T. LÆVIGATA. Duft. Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

Cette espèce n'est peut-être pas aussi rare que cette indication pourrait le faire supposer; mais, comme elle est très-voisine de la précédente et de la suivante, je l'ai confondue avec elles jusqu'à une époque très-récente.

1827. T. CORIARIA. F. Un peu moins commune que la *Tenebricosa*. Elle se trouve comme elle aux mêmes époques et dans les mêmes localités. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

#### CHRYSOMELA. Linn.

1828. C. GOETTINGENSIS. Linn. — HÆMOPTERA. F. Deux exemplaires. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. Emy.)

1829. C. HÆMOPTERA. Duft. — HOTTENTOTA. F. Commune. Par terre, sur l'herbe; sous les pierres; surtout sur les montagnes. Avril à septembre. Dijon, chemins peu fréquentés autour de la ville; combe Saint-Joseph; etc. Plombières, combe de Neuvois à Prenois, friche près de la partie cultivée. Chambolle. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1830. C. OBLONGA. Dej. (Rouvray. — M. Emy.)

1831. C. SANGUINOLENTA. Linn. Commune. Sur les montagnes, dans les parties incultes. Toute l'année; l'hiver sous les pierres. Dijon, montagnes de Talant, Larrey et Sainte-Anne. Montagnes des environs de Dijon. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1832. C. DEPRESSA. *Suffr.* Rare. Environs de Dijon. J'en possède trois exemplaires pris par moi, dont un à Marcilly, sur la friche en coteau à l'ouest du bois appelé la Petite-Forêt, le 2 octobre. (Beaune. — M. André.)

1833. C. LIMBATA. *F.* Très-rare. Sur les friches des montagnes. (Fixin. — M. Tarnier.) Chambolle. (Beaune. — M. André. M. Pérégallo, d'après M. Arias.) (Larocheptot. — M. Bourlier.)

1834. C. MARGINATA. *Linn.* Rare. Dans les parties peu garnies des bois de montagne. Juin. Marsannay-la-Côte. Plombières, bois de Bonveau, sur une scabieuse et sur un noisetier.

1835. C. RUFOÆNEA. *Dej.* (Rouvray; au vol près les Terreaux; 1831. — M. Emy.)

1836. C. GEMINATA. *Payk.* Cette espèce n'est pas rare à Plombières, dans les combes de Neuvon, sur des *Hypericum* et en fauchant; du 13 juin au 19 septembre. Trouvée une fois le 5 avril sous une pierre.

1837. C. QUADRIGEMINA. *Suffr.* J'ai trouvé deux exemplaires de cette espèce à Gevrey, le 5 septembre 1858, l'un sur un petit saule dans la mare à l'ouest de la gare, et l'autre en fauchant dans le bois de Pennecière, récemment coupé.

1838. C. FUCATA. *F.* Pas rare. Dans les bois, sur les *Hypericum* et en fauchant. Du 24 mai au mois de juillet. Blaisy-Bas. Flavignerot. Gevrey, dans la combe et près de l'étang de Satenay. Chambolle. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1839. C. CENTAUREI. *F.* Rare. Cette espèce, qui n'est bien certainement qu'une variété de coloration de la suivante, se trouve comme celle-ci et aux mêmes époques. Je l'ai trouvée notamment à Plombières, dans la combe de Neuvon à Darois, en juin et juillet. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune; un seul exemplaire. — M. Arias.)





1840. C. VARIANS. *F.* Pas rare. Dans les bois sur les *Hypericum*, et en fauchant. Du 21 mai au 19 septembre. Plombières, combe de Neuvon à Darois, commune. Collonges-les-Premières. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, dans la combe. (Rouvray; pas commune. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

1841. C. PALUSTRIS. *Suffr.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1842. C. MENTHASTRI. *Suffr.* — GRAMINIS. *Redt.* Commune. Dans les lieux humides, sur une espèce de menthe à feuilles très-cotonneuses (*M. Rotundifolia*). Du 28 mai au 27 août. Plombières, combe de Neuvon, près de la fontaine qui est sur un coteau au milieu des champs. Blaisy-Bas, bord du ruisseau au midi du village. Gevrey, bord du chemin de Saulon, près du ruisseau qui le traverse entre les bois. (Pommard, route de Nantoux. — M. *Pérageallo.*) (Beaune. — Sur la *Mentha sylvestris*; M. *Arias.* — MM. *Bourlier* et *André.*)

1843. C. FASTUOSA. *Linn.* Très-commune. Sur les céréales et d'autres plantes. Mai, juin, juillet. Dijon, sur le blé et l'orge cultivés dans les champs; au bord des chemins sur les graminées; derrière le Parc, du côté de Longvic, sous les pierres, fin mars. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées et près du clos Echalié, sur l'*Erysimum lanceolatum*. Plombières, combe de Neuvon à Darois. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Pommard, route de Nantoux. — M. *Pérageallo.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

J'ai trouvé dans la combe de Neuvon à Darois des exemplaires à coloration très-vive, avec les bandes d'un cuivreux doré éclatant, que je n'ai jamais rencontrés dans d'autres localités.

1844. C. VIOLACEA. *Panz.* — MENTHÆ. *Schrank.* Commune. Sur les menthes, au bord de l'eau. Mai à juillet. Dijon, Vieux-Suzon; pré au bas du clos de Pouilly, le long

du ruisseau, sur une menthe, et en avril sous les feuilles sèches au pied des peupliers. Plombières, combe de Neuvon, près de la fontaine qui est dans les champs sur un coteau. Gevrey, bord du chemin de Saulon, près du ruisseau entre les bois. (Rouvray; rare. — M. *Emy.*) (Châtillon-sur-Seine; commune. — M. *Emy.*) (Pommard, route de Nantoux. — M. *Pérégallo.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

1845. C. CEREALIS. *F.* Commune. Sur les montagnes, dans les parties incultes, sous les pierres. Toute l'année. Dijon, montagnes de Larrey et de Sainte-Anne. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées. (Fixin, Gevrey. — M. *Tarnier.*) Chambolle. Villenotte près Semur, montagne au nord du village. (Rouvray; pas rare. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

1846. C. STAPHYLEA. *Linn.* Pas rare. Dans les prés et les lieux humides, en fauchant; quelquefois sous les pierres et les feuilles mortes. Fin mars à octobre. Dijon, au Parc; derrière le Parc, du côté de Longvic; pré au bas du clos de Pouilly. Flavignerot, dans la combe. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Gevrey, dans la combe et près de l'étang de Satenay. Chambolle. (Rouvray; pas commune. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*) (Savigny-sous-Beaune; Fontaine-Froide. — MM. *Bourlier et Pérégallo.*)

1847. C. POLITA. *Linn.* Pas rare. Dans les lieux humides et les bois, en fauchant. Fin mai à juillet. Dijon, au Parc. Flavignerot, dans la combe. Gevrey, bois de la plaine, près des ruisseaux et au bord du petit étang de Satenay. (Pontailler-sur-Saône, dans le bois, sous la mousse, au pied des arbres; septembre. — M. *Dudrumel.*) (Rouvray; rare. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)







OREINA. *Chev.*

1848. O. SPECIOSA. *Linn.* (Savigny-sous-Beaune; sur une espèce de menthe; cinq exemplaires. — M. *Maldant*, d'après M. *Bourlier*.)

1849. O. GLORIOSA. *F.* Variété PRETIOSA. *Duft.* (Rouvray. — M. *Emy*.)

LINA. *Meg.*

1850. L. POPULI. *Linn.* Très-commune. Sur les saules, les osiers et les peupliers, et surtout dans les bois sur les pousses de tremble après l'exploitation des coupes. Mai à octobre. Dijon, bord du Canal sur des pousses de peuplier; Mirande; etc. Bois des environs de Dijon, surtout ceux de la plaine. Bourberain, forêt de Velours. Villenotte près Semur, bois de Champeaux. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Pommard. — M. *Péracallo*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

On trouve sur le tremble, avec l'insecte parfait, et extrêmement communément, sa larve qui dévore les feuilles de cet arbre; elle répand, lorsqu'on la touche, une odeur très-forte d'amande amère.

1851. L. TREMULÆ. *F.* Moins commune que la précédente. Dans les bois, surtout ceux de la plaine, sur les pousses de tremble. Mai à septembre. Fixin, bois de la plaine. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Etc. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

1852. L. ÆNEA. *Linn.* Un exemplaire de cette espèce a été trouvé aux environs de Bagnot, en fauchant dans un bois humide, le 29 juin 1857, par M. *Arthur Grasset*. (Rouvray; assez rare. — M. *Emy*.)

PLAGIODERA. Chevr.

1853. P. ARMORIACÆ. *Linn.* Très-commune. Sur les saules et les plantes environnantes. Toute l'année; l'hiver sous les écorces des saules. Dijon, bords de l'Ouche; fontaine de Larrey. Environs de Dijon, dans les endroits où il y a des saules. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

GASTROPHYSA. Chevr.

1854. G. POLYGONI. *Linn.* Commune. Sur le *Polygonum aviculare*; sur les murs et sous les pierres près des lieux où croît cette plante. Fin mars, avril, sous les pierres et sur les murs; juillet, août, sur la plante. Dijon, dans les cours et sur les murs; derrière le Parc, du côté de Longvic; chemins autour de la ville; barrière au-dessus de la gare. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune; — sur le *Polygonum aquaticum*? M. Bourlier. — MM. Arias et André.)

J'ai trouvé en août, dans une cour de la ville, simultanément la larve, la nymphe et l'insecte parfait sur le *Polygonum aviculare*.

1855. G. RAPHANI. *F.* (Rouvray; peu commun. — M. Emy.) (Beaune. — M. André.)

PHRATORA. Chevr.

1856. P. VITELLINÆ. *Linn.* Très-commune. Sur les saules et les plantes qui sont dans leur voisinage. Toute l'année; l'hiver sous les écorces des saules. Dijon, bords de l'Ouche; fontaine de Larrey. Environs de Dijon, partout où il y a des saules. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1857. P. VULGATISSIMA. *Linn.* Commune. Comme la précédente.





PHÆDON. *Meg.*

1858. P. BETULÆ. *Linn.* — COCHLEARIÆ. *F.* Commun. Sur les plantes aquatiques, notamment sur le *Nasturtium officinale*, dans les lieux marécageux. Mai à octobre. Dijon, fontaine au bas de l'Asile des aliénés, sous la mousse et sous les pierres quand le ruisseau est à sec; barrière au-dessus de la gare, avril; fontaine de Larrey. Blaisy-Bas au bord du ruisseau, près du bois. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

1859. P. EGENUM. *Ziegl.* Rare. Je n'ai trouvé cette espèce qu'une seule fois, au nombre de dix à douze exemplaires, à Dijon, dans la Combe-aux-Serpents sur une espèce de renoncule, le 16 mai; (près de l'Ouche, vers le moulin Vesson, en fauchant; mai. — M. *Nodot.*) (Beaune. — M. *André.*)

HELLODES. *F.*

1860. H. VIOLACEA. *F.* Rare. Dans les lieux marécageux, en fauchant et sous la mousse. Mai à octobre. Dijon, fontaine au bas de l'Asile des aliénés; (même endroit, sur le linge étendu, 17 mars; petite mare derrière Montmuzard, 25 mars. — M. *Nodot.*) Gevrey, bord du petit étang de Satenay et fossés au-dessus du grand étang. (Rouvray; rare. — M. *Emy.*)

1861. H. PHELLANDRII. *Linn.* Commune. Sur les plantes aquatiques et sous les détritrus au bord des mares et des ruisseaux. Mars à octobre. Dijon, contre-fossé au midi du Canal, près du pont du chemin de fer; bords du Canal; fontaine au bas de l'Asile des aliénés; près du bord de l'Ouche; (petite mare derrière Montmuzard; mars. — M. *Nodot.*) Flavignerot. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Péragallo*, *Bourlier* et *André.*)

1862. H. MARGINELLA. *Linn.* Rare. Environs de Dijon.

1863. H. AUCTA. *F.* Pas commune. Dans les lieux humides, en fauchant et sous les détritits. Avril à juillet. Dijon, au bord du ruisseau qui est au bas du clos de Pouilly, sous les feuilles sèches. Quetigny, au bord d'un ruisseau dans les prés. (Rouvray; sous les pierres, lieux un peu humides dans les prés, au printemps. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *André.*)

GONIOCTENA. *Chev.* — SPARTOPHILA. *Chev.*

1864. G. LITURA. *F.* Pas rare. Lieux humides, surtout dans les bois. Mai à septembre. Marsannay-la-Côte, près de Gouvillle. Plombières, combe de Neuvon. Villenotte, bord du bois de Champeaux. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *André.*)

GONIOCTENA. *Chev.*

1865. G. RUFIPES. *Payk.* — DECEMPUNCTATA. *F.* Commune. Dans les bois, surtout ceux de la plaine, principalement sur le saule Marceau; moins communément sur le tremble. Mai, juin. Fixin, bois près du chemin de fer. Concéœur, forêt de Mantuan. Curley, bois des Liards. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*) (Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide. — M. *Péragallo.*)

1866. G. VIMINALIS. *Gyll.* Commune. Comme la précédente et dans les mêmes localités; trouvée de plus par M. *Tarnier* à Messigny dans le vallon de Jouvence, sur les saules au bord de Suzon, en juillet ou août. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*) (Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide; pas rare sur les osiers; juin. — M. *Arias.*)







LAMPROSOMA. Kirby. — BYRRHUS. F.

1867. L. CONCOLOR. Sturm. Cet insecte est commun à Plombières, dans la combe de Neuvon à Darois, surtout près de cette dernière commune, en fauchant; du 3 mai au 19 septembre. Trouvé aussi, mais rarement, dans d'autres localités. Plombières, bord du chemin à gauche du vallon de Champmoron, au-dessus de la montée, par terre, dans un endroit découvert. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Fixin, bois près du chemin de fer, en fauchant dans une partie humide et ombreuse, et sous des ételles humides dans une coupe en exploitation.

BROMIUS. Chevr.

1868. B. OBSCURUS. Linn. Un seul exemplaire de cet insecte a été pris à ma connaissance dans les environs de Dijon. Il a été trouvé, en ma présence, au Parc sur une ortie à gauche de la porte d'entrée, par feu M. H. Blainville, le 22 mai 1836.

1869. B. VITIS. F. Trop commun malheureusement. Cet insecte est désigné vulgairement sous le nom d'*Écrivain*; il se trouve sur la vigne de mai à août, principalement le soir, et se laisse tomber très-facilement; on le rencontre aussi dès le mois d'avril par terre et sur les tiges vertes ou sèches de différentes plantes. Dijon et tous les lieux où l'on cultive la vigne. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

CHRYSOCHUS. Chevr.

1870. C. PRETIOSUS. F. Pas rare. Sur l'*Asclepias vinetoxicum*. Août; quelquefois dès le 30 juin. Dijon, Combeaux-Serpents, sur la plante précitée et par terre dans son voisinage.

PACHNEPHORUS. *Chevr.*

1871. P. ARENARIUS. *F.* J'ai trouvé seulement deux exemplaires de cette espèce à Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans la forêt de Cîteaux, en fauchant, le 19 juin.

CLYTHRA. *Laichart.* — LABIDOSTOMIS. *Chevr.*

1872. C. TRIDENTATA. *Linn.* — VIRIDICOLLIS. *Dej.* Rare. Je n'ai trouvé que trois exemplaires de cette espèce, à Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans la forêt de Cîteaux, en fauchant, en juin. (Fauverney, à la Bayotte, sur des feuilles de chêne, au bord d'un fossé; juin. — M. *Nodot.*) (Rouvray; pas commune. — M. *Emy.*) (1).

1873. C. HUMERALIS. *Schn.* Pas commune. Même localité que la précédente; également, je crois, en juin.

1874. C. LUCIDA. *Germ.* Très-commune. Sur les céréales et différentes plantes au bord des chemins; je l'ai trouvée notamment sur les *Rumex*, le blé, la navette, etc. Fin mai, juin. Dijon, au bord des chemins dans les environs de la ville, surtout au bord des champs de céréales. Velars-sur-Ouche, bord du bois au-dessus de la forge. Fixin, bord du bois près du chemin de fer. (Beaune. — Sur l'*Achillea millefolium*; M. *Bourlier.* — MM. *Arias* et *André.*)

1875. C. LONGIMANA. *Linn.* Pas rare. Lieux humides, surtout les bois, en fauchant. Juin. Dijon, pré au bas du clos de Pouilly. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

MACROLENES. *Dej.*

1876. C. RUFICOLLIS. *F.* Cette espèce est indiquée, avec doute, par M. *Emy*, comme trouvée à Rouvray.

---

(1. M. *Emy* indique avec la même mention *pas commune* les *C. Tridentata* et *Viridicollis* comme deux espèces distinctes.





*LACHNAIA. Dej.*

1877. C. LONGIPES. *F.* (Rouvray; dans les taillis, sur le chêne. — M. *Emy.*)

*CLYTHRA. Laichart.*

1878. C. QUADRI-PUNCTATA. *Linn.* Commune. Dans les bois, sur le chêne et sur différentes plantes. Mai, juin. Plombières, bois de Neuvon. Marsannay-la-Côte. Gevrey. Chambolle. Etc. (Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. — M. *Bourlier.*) (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

1879. C. LÆVIUSCULA. *Ratz.* Commune. Au bord des chemins sur les haies, les graminées et différentes plantes. Mai, juin. Dijon, chemins autour de la ville, surtout du côté de Fontaine; Parc; etc.

J'ai trouvé plusieurs fois la larve de cette espèce, contenue dans un fourreau à côtes obliques en dessous, sous les pierres avec la *Formica ensecta*. M. *Vallot* l'a fait connaître sous le nom de l'espèce précédente, avec laquelle elle a été très-longtemps confondue. (*Comptes-rendus hebdomadaires de l'Académie des sciences*, t. XXVI, p. 610.)

Je dois faire observer que, jusqu'à une époque très-récente, j'avais confondu ensemble cette espèce et la précédente, et que l'*habitat* distinct assigné à ces deux espèces a besoin d'être vérifié.

*GYNANDROPHTHALMA. Lacord. — SMARAGDINA. Chevr.*

1880. C. CONCOLOR. *F.* (Rouvray; sur le prunellier. — M. *Emy.*)

*CYANIRIS. Chevr.*

1881. C. CYANEA. *F.* Commune. Dans les bois, principalement sur le noisetier coupé depuis un an ou deux. Du 9 mai au 21 juin. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

1882. *C. AFFINIS*. *Ill.* Pas commune. Dans les bois coupés depuis peu d'années. Juin. Flavignerot, dans la combe. Marsannay-la-Côte, près du parc de Gouville. Gevrey, dans la combe.

1883. *C. AURITA*. *Linn.* Pas rare. Egalement dans les bois coupés depuis peu de temps, principalement sur le noisetier. Du 21 mai au 8 juillet. Dijon, au Parc. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot, dans la combe. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, dans la combe. (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

*CHEILOTOMA. Chevr.*

1884. *C. BUCEPHALA*. *F.* Pas commune. Sur les friches et au bord des chemins sur les graminées et sur les fleurs de différentes plantes basses. Du 27 mai au 1<sup>er</sup> juillet. Dijon, Parc; fontaine de Larrey. Plombières, bois de Gontard et combe de Neuvon. Marsannay-la-Côte, chemin du côté de la combe. (Rouvray; rare. — *M. Emy.*) (Beaune. — Au bord du torrent de Genet sur une petite fleur jaune peu élevée; MM. *Arias et Péragallo.* — Sur les graminées dans les terrains secs. *M. Bourlier.* — *M. André.*)

*COPTOCEPHALA. Chevr.*

1885. *C. SCOPOLINA*. *Linn.* Pas rare. Sur les ombellifères dans les clairières des coteaux boisés. Du 1<sup>er</sup> juillet au 2 septembre. Asnières, bois des Grottes. Plombières, coteaux près de Neuvon. Chambolle. (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune. — Bord du torrent de Genet; *M. Péragallo.* — *M. Bourlier.*)

*PACHYBRACHYS. Chevr.*

1886. *P. HISTRIO*. *Oliv.* Commun. Dans les lieux humides; quelquefois cependant dans les bois de montagne.







Juin, juillet. Dijon, derrière le Parc du côté de Longvic, en fauchant sur les tithymales et les chardons. Magny-sur-Tille, bord du bois de Malforêt. Marsannay-la-Côte, bois près du parc de Gouville. Fixin et Gevrey, bois de la plaine. Chambolle, sur le chêne. (Rouvray; pas commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — Sur les graminées et les saules dans les endroits humides; M. *Bourlier.* — MM. *Arias* et *André.*)

1887. P. *HIEROGLYPHICUS*. *F.* (Beaune. — MM. *Arias* et *André.*)

*STYLOSOMUS. Suffr.*

1888. S. *MINUTISSIMUS. Suffr.* Pas rare. J'ai trouvé cet insecte seulement à Gevrey, au bord du petit étang de Satenay, du 14 juin au 22 juillet, sur les pousses d'aulnes coupés l'hiver précédent.

*PROTOPHYSUS. Chevr.*

1889. P. *LOBATUS. F.* Rare. Dans les bois de montagne, dans les coupes de deux ou trois ans, sur le chêne. Du 18 mai au 17 juin. Plombières, coteaux de la combe de Neuvon, notamment dans l'embranchement de droite, près d'une fontaine qui est dans le bois. Velars-sur-Ouche, coteaux au-dessus du Crucifix, coteau au-dessus de la forge. Gevrey, bois du Chaignot et de Château-Renard. Chambolle, dans la combe, embranchement de gauche, coteau exposé au midi. (Beaune. — Bois de Battant; en battant les buissons; M. *Bourlier.* — M. *André.*)

Le mâle et la femelle se trouvent en nombre à peu près égal.

*HOMALOPUS. Chevr.*

1890. H. *LOREYI. Solier.* Cette belle espèce, dédiée à l'un des auteurs de la Flore de la Côte-d'Or, a été dé-

couverte par lui dans le Piémont, aux environs de Suse, en 1802. Depuis lors elle avait été retrouvée soit dans la même contrée, soit aux environs de Dijon, mais était toujours extrêmement rare, et il n'en existait que dans quelques collections. En 1843, je trouvai un assez grand nombre d'exemplaires de cet insecte et je découvris le mâle, qui n'était pas encore connu, ou plutôt avait été décrit sous le nom de *Major* comme une espèce distincte (1). Je l'ai également prise depuis, à différentes reprises, en nombre plus ou moins considérable selon les conditions de localité, d'époque ou de température dans lesquelles je l'avais cherchée.

Cette espèce, sans être rare, ne peut être prise en nombre qu'à la suite de patientes recherches. On la trouve principalement au milieu du jour, lorsque la température est élevée, sur les coteaux boisés peu garnis, deux ou trois ans après la coupe et presque toujours à l'exposition du midi, sur les feuilles de chêne (2), quelquefois sur celles de charme et de noisetier; je l'ai également prise au vol, surtout le mâle qui est plus rare que la femelle et

---

(1) Voyez, indépendamment de la notice que j'ai publiée dans les *Annales de la Société Entomologique de France*, 2<sup>e</sup> série, t. II (1844), p. 207, pl. 6, III; d'autres articles relatifs à cet insecte insérés dans le même recueil : t. V (1836), p. 687, pl. 20, A; — VI (1837), p. 125; — VII (1838), bulletin p. xxxiii.

(2) M. Chevrolat (*Dictionnaire universel d'Histoire naturelle*, t. VI, p. 671, v<sup>o</sup> *Homalopus*) dit que cet insecte se trouve sur une espèce particulière de chêne. J'avoue ne pas connaître les différentes espèces de chêne qui croissent dans nos environs, et, par conséquent, n'avoir pas remarqué la propension que pourrait avoir l'*Homalopus Loreyi* pour telle ou telle de ces espèces; j'ai cru observer cependant que cet insecte se tenait de préférence sur les chênes dont la feuille est lisse et assez découpée sur ses bords, et dont les pousses récentes sont d'une couleur rougeâtre assez tranchée; mais comme, ainsi que je l'ai indiqué, on ne trouve l'insecte facilement que dans les jeunes taillis, je n'ai pu assigner d'autres caractères à ce chêne, dont je n'ai pu voir ni la fleur ni le fruit.





ne se rencontre que dans la proportion d'un tiers environ du nombre total.

Elle commence à paraître vers le 18 ou le 20 mai, à l'époque où les feuilles de chêne ont à peu près acquis leur développement, époque qui coïncide assez exactement avec celle où l'on met en vente les premières cerises dans les rues de Dijon; on la trouve jusqu'au 19 juin; quelquefois, lorsque l'année a été tardive et le printemps pluvieux, j'en ai pris quelques exemplaires jusqu'au 28 du même mois.

Plombières, combe de Neuvon, embranchement de droite dans la direction de Champmoron, notamment près de la fontaine qui est dans le bois, jusqu'à l'extrémité de cet embranchement. Velars-sur-Ouche, coteau au-dessus de la forge et bois au-dessus du Crucifix. Gevrey, bois du Chaignot et de Château-Renard. Chambolle, dans la combe, embranchement de gauche après la montée (1). (Pouilly-en-Auxois. — M. Bonier.)

---

(1) J'ai essayé d'élever, *ab ovo*, la larve de l'*Homalopus Loreyi*; mais j'ai eu le regret de voir échouer cette tentative lorsque j'approchais de l'époque à laquelle j'espérais arriver à un résultat.

Malgré cet échec, je crois devoir donner ici quelques détails sur mon éducation, qu'il serait facile de renouveler, et qui probablement réussirait sous la direction d'un observateur plus expérimenté.

Rien n'est plus aisé que de se procurer des œufs de l'*Homalopus Loreyi*: il suffit de conserver vivantes, en les renfermant, les femelles de cet insecte; elles ne tardent pas à pondre des œufs jaunâtres, oblongs, d'un millimètre environ de longueur, qu'elles recouvrent d'une enveloppe formée avec leurs excréments, en se servant de leurs pattes de derrière et de la fossette qui existe sur leur dernier segment abdominal.

Ces œufs ainsi recouverts ont une forme subcylindrique et présentent longitudinalement des sortes de côtes peu régulières; ils ressemblent alors assez bien aux excréments de certaines chenilles. Quelques-uns de ces œufs sont abandonnés par les femelles sans être recouverts d'excréments, circonstance que je ne puis m'expliquer, mais qui pourrait induire en erreur, car on serait exposé à recueillir seulement ces œufs (comme je l'avais fait d'abord), et à rejeter, les prenant pour des excréments, ceux qui en sont recouverts.

A quelque époque que j'aie pris des femelles, j'en ai toujours obtenu des œufs féconds, dont j'ai conservé un certain nombre dans de petites

CRYPTOCEPHALUS. *Geoffr.*

1891. C. IMPERIALIS. *F.* Pas rare. Sur les graminées des pelouses dans les endroits secs. Juin. Plombières, coteaux de la combe de Neuvon, notamment celui de Gontard. Flavignerot. (Fixin. — M. Tarnier.) Chambolle. (Rouvray; sur le *Génétaie* en fleurs. — M. Emy.) (Beaune. — M. Arias.) (Pommard; route de Nantoux. — M. Pérégallo.)

1892. C. CORDIGER. *Linn.* Rare. Dans les bois sur le noisetier récemment coupé. Fin mai, juin. Flavignerot. Vellars-sur-Ouche, bois au-dessus du Crucifix. Chambolle. (Rouvray. — M. Emy.)

1893. C. VARIABILIS. *Schn.* Pas rare. Dans les bois, principalement sur le noisetier et le saule Marceau. Du 18 mai au 2 juillet. Plombières, combe de Neuvon. Blaisy-Bas. Flavignerot, dans la combe. Fixin, bois près du chemin

---

boîtes, et qui sont éclos à la fin de juin ou dans le mois de juillet, selon l'époque à laquelle ils avaient été pondus.

Les œufs *nus* éclosent comme les autres; les petites larves qui en sortent sont d'abord assez vives, elles marchent avec une certaine activité, mais refusent de manger, et ne tardent pas à périr. Les larves provenant des œufs recouverts restent dans l'enveloppe d'excréments, qui les protège; elles font une ouverture à l'une des extrémités de cette enveloppe, avec laquelle elles marchent, en faisant sortir la partie antérieure de leur corps, à peu près comme un *Helix* avec sa coquille.

J'ai disposé mes petites larves dans des pots à fleurs remplis de terre jusqu'aux trois quarts environ de leur hauteur, recouverts avec de la gaze et plus tard avec du tulle, et exposés à l'air sur le balcon d'une fenêtre. J'ai eu soin de les tenir presque toujours à l'abri de la pluie et de les garantir du soleil, dont elles paraissaient craindre la lumière; j'ai mis sur la terre des pots de petits fragments d'écorces et de racines de chêne, ainsi que quelques brindilles provenant de grosses fourmières; j'y ai ajouté des feuilles de chêne, les unes sèches, les autres fraîches, en partie entières et en partie coupées en morceaux. Les larves n'ont mangé que les feuilles desséchées; quant aux fraîches, elles ne les ont attaquées qu'au bout de deux ou trois jours, lorsqu'elles commençaient à sécher. J'ai ainsi nourri mes larves, dont un assez grand nombre a péri au bout de quelque temps, et dont les autres ont







de fer, sur le saule Marceau et sur la barrière du chemin de fer. Gevrey, dans la combe.

1894. *C. SXPUNCTATUS*. *Linn.* Pas rare. Dans les bois, surtout sur le noisetier et le saule Marceau. Du 9 mai au 20 juillet. Plombières, combe de Neuvon. Velars-sur-Ouche, bois au-dessus du Crucifix. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, dans la combe et dans le bois du Chaignot. Chambolle. (Rouvray; fort rare.—*M. Emy.*) (Beaune.—*M. Bourlier.*)

1895. *C. CORYLI*. *Linn.* Pas commun. Dans les bois, sur le noisetier récemment coupé, quelquefois sur le tilleul. Du 18 mai au 23 juin. Dijon, trouvé une fois au Parc. Velars-sur-Ouche, bois au-dessus du Crucifix. Flavignerot. Marsannay-la-Côte, dans la combe et près du parc de Gouville, du côté de Corcelles. Gevrey, dans la combe et dans le bois de Château-Renard. Chambolle. (Rouvray.—*M. Emy.*) (Beaune.—*MM. Bourlier et André.*) (Savignysous-Beaune, Fontaine-Froide. — *M. Arias.*)

---

acquis un notable accroissement, jusqu'à la fin d'octobre, en prenant la précaution d'humecter de temps en temps avec de l'eau la surface de la terre de mes pots; je les ai à cette époque rentrés dans ma chambre où je les ai gardés, en ne les humectant qu'à de longs intervalles, jusqu'au mois d'avril. Je les ai alors de nouveau mis à l'air, en les traitant de la même manière jusqu'à la fin du mois d'octobre suivant; un certain nombre de larves avaient encore péri pendant la belle saison; les survivantes s'étaient considérablement développées, quelques-unes présentaient un fourreau d'une longueur de 9 millimètres; je les rentrai comme l'année précédente. Au mois d'avril suivant, nouvelle mise à l'air; à cette époque j'avais remplacé mon système d'humectation par un autre qui consistait à placer mes pots sur une soucoupe dans laquelle je versais une certaine quantité d'eau, de manière à humecter la terre par le bas, au moyen du trou existant au fond de ces pots. Soit que cette nouvelle méthode fût défectueuse, soit que la grande sécheresse de l'année leur fût contraire, mes larves périrent en très grand nombre pendant l'été; celles qui restèrent avaient peu mangé, et leur accroissement avait été peu considérable. J'ai rentré, comme les années précédentes, mes larves au mois d'octobre, mais sans vérifier alors s'il en existait encore de vivantes. Au mois d'avril suivant toutes étaient mortes. Les plus grands fourreaux avaient 14 millim. de long sur 5 et demi de large. — Comme on le voit, mon éducation a duré plus de deux ans.

Mâle beaucoup plus rare que la femelle; à peine dans la proportion d'un cinquième des exemplaires.

1896. *C. VIOLACEUS*. *F.* Pas rare. Sur différentes fleurs, sur les gazons, surtout dans les bois. Fin mai, juin. Flavignerot. Marsannay-la-Côte, bois près de Gouvillle. Plombières, combe de Neuvon. (Fixin. — M. Tarnier.) (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Péragallo et Bourlier; sur les ombelles d'après ce dernier.)

1897. *C. HYPOCHÆRIDIS*. *Linn.* Commun. Sur différentes fleurs, surtout les *Hypericum*, quelquefois sur les graminées, principalement dans les bois. Juin, commencement de juillet. Plombières, combes de Neuvon et coteau de Gontard. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. Gevrey, bois de la plaine. (Beaune; sur les ombelles. — M. Bourlier.)

1898. *C. AUREOLUS*. *Suffrian.* Commun. Sur différentes fleurs et sur les graminées; dans les friches et au bord des chemins où l'herbe croît abondamment. Du 10 mai au 20 juin. Dijon, fossés du cours du Parc; Combe-aux-Serpents; etc. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées, sur l'*Erysimum lanceolatum*. Plombières, combe de Neuvon. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bois de la plaine. (Rouvray. — M. Emy.) (1). (Beaune. — MM. Arias, André et Bourlier; sur les ombelles d'après ce dernier.)

1899. *C. NITENS*. *Linn.* — *FLAVIFRONS*. *F.* Commun. Dans les bois de montagne, surtout les taillis de deux ou trois ans, principalement sur le chêne. Du 23 mai au 20 juillet. Plombières, combe de Neuvon. Velars-sur-Ouche, coteau au-dessus de la forge. Flavignerot. Mar-

---

(1) M. Emy l'indique sous le nom de *Sericeus*, sous lequel il était en effet connu dans les collections jusqu'à l'époque de la publication de la Monographie de M. Suffrian.

Il est même assez probable que M. Emy a trouvé en outre, et confondu avec cette espèce, le *C. Hypochæridis*, qui en est excessivement voisin.





sannay-la-Côte. Gevrey. Chambolle. (Rouvray. — M. Emy.)

1900. C. MARGINELLUS. *Oliv.* Commun. Comme le précédent; quelquefois cependant sur les haies et les buissons dans les lieux non boisés. Du 18 mai à la fin de juin. Dijon, chemin de Daix sur une haie. Plombières. Velars. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Gevrey. (Rouvray; pas très-commun. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1901. C. FLAVIPES. *F.* Commun. Sur les buissons et les arbustes, mais surtout dans les bois sur le chêne. Fin mai, juin, commencement de juillet. Dijon, Parc; etc. Flavignerot. Plombières. Gevrey. Chambolle. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1902. C. MOREL. *Linn.* Commun. Dans les lieux humides, en fauchant sur différentes plantes. Du 18 juin au 27 juillet. Dijon, pré au bas du clos de Pouilly. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. Collonges-les-Premières. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, bois de la plaine, surtout près du petit étang de Satenay. Reulle-Vergy, forêt de Mantuan. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier, Péracallo et André.)

1903. C. DECIMPUNCTATUS. *Linn.* M. Bourlier m'a communiqué deux exemplaires de cette espèce pris par lui, en juin, sur des saules, à Beaune; l'un s'éloigne peu du type, et l'autre appartient à la variété BOTHNICUS. *Linn.*

1904. C. FULCRATUS. *Germ.* — FLAVILABRIS. *F.* Rare. Lieux humides et boisés. Du 21 mai au 20 juin. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, dans la combe et surtout près du petit étang de Satenay, en fauchant et sur les rejets d'aulne. (Rouvray. — M. Emy.)

1905. C. MARGINATUS. *F.* (Rouvray; fort rare. — M. Emy.)

1906. C. PALLIFRONS. *Gyll.* Je possède trois exemplaires de cette espèce qui m'ont été donnés par M. *Lombard*. Il ne se rappelle pas positivement la localité où il les avait pris, mais ce ne peut être que dans les environs de Villenotte ou de Saulieu.

1907. C. BISTRIPUNCTATUS. *Creutz.* Assez rare. Dans les bois de montagne, sur les feuilles de chêne ou de noisetier dans les taillis de deux ou trois ans. Du 20 mai au 22 juin; trouvé un exemplaire exceptionnellement le 5 septembre. Plombières, coteaux de la combe de Neuvon. Velars-sur-Ouche, bois près du Crucifix. Villey-sur-Tille. Marsannay-la-Côte, combe Pernelle et surtout bord du bois vers le parc de Gouvillle du côté de Corcelles. Gevrey, bois du Chaignot et de Château-Renard.

1908. C. BIPUNCTATUS. *Linn.* Commun. Sur les buissons, les arbustes et les feuilles de différents arbres dans les bois, notamment le noisetier et le chêne. Du 17 mai à la fin de juin. Dijon, Parc; chemin de Daix; Combe-aux-Serpents; (sur les prés en fauchant. — M. *Nodot.*) Plombières, combe de Neuvon. Velars-sur-Ouche. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Gevrey. Fixin. Chambolle. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — Sur les saules; M. *Bourlier.* — MM. *Arias* et *André.*) (Pommard. — M. *Péragallo.*)

La variété BIPUSTULATUS. *F.*, qu'on prendrait facilement pour une espèce distincte, semble habiter plus spécialement les bois humides; elle est beaucoup moins commune que le type. Je l'ai trouvée notamment à Gevrey, dans le bois de Pennecière au bord d'un ruisseau, et à Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans la forêt. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

1909. C. SEXPUSTULATUS. *Rossi.* Pas commun. Je n'ai trouvé cette espèce qu'à Gevrey, en fauchant au bord du petit étang de Satenay, du 6 juin au 22 juillet.

1910. C. GRAVIDUS. *Dej.* Pas commun. Quetigny, dans le pré qui est près du petit bois, en fauchant le long du







ruisseau, les premiers jours de juillet. (Beaune; sur les saules; juin. — M. *Bourlier*.)

1911. C. VITTATUS. *F.* Pas rare. Prés et lieux humides en fauchant. Juin. Quetigny, pré vers le petit bois. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune; pas commun. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *Péragallo*.)

1912. C. BILINEATUS. *Linn.* Pas commun. Lieux humides, en fauchant. Du 8 juin au 5 juillet. Quetigny, pré vers le petit bois. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. Fixin, bois de la plaine. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *Bourlier*.)

1913. C. PYGMÆUS. *F.* Rare. Dans les bois de montagne sur le chêne et en fauchant. Plombières, cômbe de Neuvon, coteaux exposés au midi, notamment celui du bois de Gontard. Chambolle. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune; un seul exemplaire. — M. *Arias*.)

1914. C. MINUTUS. *F.* Rare. Dans les bois de montagne, sur les feuilles de chêne. Fin juin, juillet. Plombières, bois de la combe de Neuvon. Chambolle. (Rouvray. — M. *Emy*.)

1915. C. PUSILUS. *F.* Commun. En fauchant dans les lieux humides, surtout les bois, et sur les feuilles de peuplier et d'aulne. Du 14 juin au 2 septembre. Dijon, bords du Canal en aval du bassin, sur les pousses de peuplier au pied de cet arbre. Collonges-les-Premières. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, en fauchant et sur les rejets d'aulnes coupés l'hiver précédent. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *André*.)

J'ai obtenu cet insecte de larves contenues dans leurs fourreaux que j'avais trouvées dans des fourmières de *Formica rufa* dans les bois voisins de la combe de Neuvon. L'éclosion a eu lieu du 15 au 24 juin.

1916. *C. GRACILIS. F.* Rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

1917. *C. HUBNERI. F.* — *HYBNERI. F.* Pas commun. Sur le prunellier. Du 7 juin au 14 juillet. Dijon, chemin de Daix, sur les feuilles de prunellier dans une haie. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

1918. *C. LABIATUS. Linn.* Commun. Dans les bois en fauchant dans les jeunes taillis, notamment sur les feuilles de chêne. Du 11 juin au 29 août. Plombières, combes et coteaux de Neuvon. Velars-sur-Ouche, bois près du Crucifix. Collonges-les-Premières. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, sur les pousses d'aulnes coupés l'hiver précédent. (Beaune. — M. *Bourlier.*)

1919. *C. GEMINUS. Meg.* Commun. Dans les bois, surtout ceux de la plaine, principalement sur les feuilles de chêne, de noisetier et d'aulne; quelquefois dans les lieux non boisés. Du 16 juin au 22 juillet. Dijon, chemin de Corcelles-les-Monts, sur un osier au bord d'une vigne. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte, bois près du parc de Gouville. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay sur les pousses d'aulne. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

1920. *C. QUERCETI. Erichs.* Pas commun. Dans les bois, en fauchant; quelquefois dans les endroits non boisés. Juin. Dijon, chemin de Daix sur un prunellier dans une haie. Environs de Dijon.

1921. *C. FRONTALIS. Marsh.* Rare. Environs de Dijon. (Beaune. — M. *Bourlier.*)







## CLYPEASTRES.

CLYPEASTER. *Andersch.*

1922. C. LIVIDUS. *Dej.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

GRYPHINUS. *Redt.*

1923. G. LATERALIS. *Meg.* Pas rare. Dans les endroits humides, en fauchant et sous les détrit. Mai à septembre. La Rochette près Oisilly. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux, entre des plateaux de chêne. (Beaune. — M. *André.* — Hameau de Gigny, automne, sous les meules de foin. M. *Bourlier.*)

CORYLOPHUS. *Leach.*

1924. C. CASSIDOIDES. *Marsh.* Pas commun. Endroits humides, en fauchant. Juillet à septembre. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Collonges-les-Premières. (Beaune. — M. *André.*)

ORTHOPERUS. *Steph.* (1).

1925. O. PICEUS. *Steph.* Pas rare. Dans les bois sous les écorces et les détrit. humides. Été, automne. Fixin, bois de la plaine. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Etc.

---

(1) Ce genre n'existe pas dans le *Catologue Gaubil*, et sa place dans la série des coléoptères est des plus controversées. Je le fais figurer ici d'après l'observation présentée par M. Perris dans les *Annales de la Société Entomologique de France*, 2<sup>e</sup> série, t. 10 (1852), p. 590. M. Peyron (voyez le même recueil, 3<sup>e</sup> série, t. 5 (1857), bulletin p. cxiv) rapproche au contraire ce genre des *Trichopteryx*, en donnant les motifs de son opinion.

## COCCINELLÆ.

---

### CHILOCORUS. *Leuch.*

1926. C. RENIPUSTULATUS. *Scriba.* Pas très-commun. Sur les troncs d'arbres, sous les écorces, sur les feuilles et en fauchant; quelquefois sur les murs et les barrières. Mai à septembre. Dijon, dans la ville sur les murs; Parc; Jardin botanique; barrière au-dessus de la gare; chemin d'Ahuy, sur les peupliers; le long du cours extérieur de Suzon près du mur de la caserne des Capucins, sur les frênes. Plombières, combe de Neuvon. Gevrey, dans la combe. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier.*)

J'ai trouvé avec M. *Dudrumel*, assez abondamment sur les troncs de frênes près de la caserne des Capucins, cet insecte ainsi que sa larve et sa nymphe, à la fin du mois de juin, en juillet et les premiers jours d'août.

1927. C. BIPUSTULATUS. *Linn.* Commun. Sur les feuilles, les troncs d'arbres, sous les écorces, en fauchant et sur les murs. Avril à octobre. Dijon et les environs; Parc, surtout sur les jeunes arbres verts près de l'Ouche; Jardin botanique; murs de la ville; etc. Plombières, combe de Neuvon, sur viaduc et en fauchant. (Rouvray; pas commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

### EXOCHOMUS. *Redt.*

1928. E. QUADRIPUSTULATUS. *Linn.* — QUADRIVERRUGATUS. *F.* Commun. Sur les feuilles des arbres et de différentes plantes, sur les troncs des arbres à écorce lisse, etc., presque toute l'année; l'hiver sous les écorces. Dijon, au Parc;







cours du Parc, sur les troncs des jeunes arbres. Environs de Dijon. Marsannay-la-Côte, bois près de Gouvillle. Cham-bolle. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

1929. E. AURITUS. Scriba. Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cette espèce, à Gevrey dans le bois de Château-Renard, dans une coupe de deux ans, sur un *Carduus nutans* le 25 juin. M. Tarnier en a pris plusieurs dans les environs de Fixin. (Rouvray; pas très-commun. — M. Emy.) (Beaune. — Très-commun en battant les arbres; M. Arias. — MM. Bourlier et André.)

PLATYNASPIS. Redt. — SCYMNUS. Herbst.

1930. P. VILLOSA. Fourcr. — QUADRINOTATA. Meg. — BISBIPUSTULATA. F. Pas rare. Sur les feuilles d'arbres et en fauchant l'été; plus communément l'hiver, au commencement du printemps et en automne sous les écorces et les mousses qui croissent sur le tronc des arbres. Dijon, Parc, écorces de platane; autour de la ville principalement sous les écorces de frêne et de noyer; (bords du Canal en aval du bassin, sous les lichens parasites des troncs de peupliers. — M. Dudrumel.) (Pontailler-sur-Saône; sous des écorces de pommiers. — M. Dudrumel.) (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune; sur les pins; avril. — M. Bourlier.)

ANISOSTICTA. Chevr.

1931. A. NOVEMDECIMPUNCTATA. Linn. Pas commune. Sur les plantes aquatiques. Mai, juin. Dijon, fontaine de Larrey, en fauchant sur les plantes au bord du ruisseau. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

MICRASPID. *Chevr.*

1932. M. DUODECIMPUNCTATA. *Linn.* Commune. Sur différentes plantes, en fauchant. Printemps, été, automne. Dijon, chemins autour de la ville, quelquefois sous les pierres en avril et en novembre; fontaine de Larrey; mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles sèches; etc. Plombières, combe de Neuvon. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

HYPERASPIS. *Chevr.*

1933. H. REPPENSIS. *Herbst.* — MARGINELLA. *F.* Pas commune. Dans les lieux secs, principalement sur les coteaux herbeux et incultes. Depuis la fin de mai au commencement de septembre. Talant, coteaux au-dessus du chemin de fer sur l'*Erysimum lanceolatum*. Plombières, combe de Neuvon, surtout sur les coteaux non boisés et dans les clairières de ceux qui sont peu garnis de bois, en fauchant.

1934. H. CAMPESTRIS. *Herbst.* — LATERALIS. *F.* Pas commune; un peu plus cependant que la précédente. Dans les lieux secs, en fauchant. Juin. Dijon, Combe-aux-Serpents, sur un prunellier. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Flavignerot, en battant des fagots. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune; un seul exemplaire. — M. *Arias.*)

SCYMNUS. *Kugel.*

1935. S. PYGMÆUS. *Fourcr.* — FLAVIPES. *Ill.* — PARVULUS. *F.* Commun. Sur les feuilles des arbrisseaux et de différentes plantes, surtout dans les bois. Du 20 mai au 8 juillet. Dijon, chemin de Daix sur une haie, et sous les pierres à la fin d'avril. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois de la plaine. Saint-





Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. Bourlier.)

1936. S. QUADRILUNULATUS. *Ill.* Pas commun. Dijon, Parc, en fauchant sur l'*Anthriscus sylvestris*. Mai. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune; sur du lierre tapissant un mur dans un jardin humide; été. — M. Bourlier. Trouvé aussi dans les mêmes conditions par MM. Arias et André.)

1937. S. FRONTALIS. *F.* Commun. En fauchant, surtout dans les bois. Du 17 mai au 5 septembre. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot. Gevrey, bois de la plaine. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — En battant les arbres; M. Bourlier. — M. André.)

1938. S. MARGINALIS. *Rossi.* — MORIO. *F.* Peu commun. Sur différentes plantes, en fauchant, quelquefois sur les murs et l'hiver sous les pierres. Été, automne. Talant, coteau près du chemin de fer. Malain, sur le viaduc. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. Arias.)

1939. S. APETZII. *Muls.* Pas rare. Sur différentes plantes et en fauchant, surtout dans les bois. Juin à octobre. Dijon, chemin de Talant, au sommet d'un petit mur sur un *Sedum*. Plombières, bois de Neuvon, en fauchant et en battant les fagots. Villenotte, bois de Champeaux. (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

1940. S. FASCIATUS. *Fourcr.* — LURIDUS. *Dej.* Pas commun. Sur différentes fleurs, notamment une fois en certain nombre sur des fleurs de laurier thym. (Beaune. — M. Bourlier.)

1941. S. ARCUATUS. *Rossi.* Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cet insecte, à Plombières, en fauchant dans la combe de Neuvon à Darois, le 26 juin. Il a été pris abondamment à Beaune, par M. Bourlier, dans un jardin humide sur du lierre tapissant un mur; en juin et juillet; MM. Arias et André l'ont aussi trouvé dans la même localité.

1942. *S. CAPITATUS. F.* Commun. En fauchant dans les lieux ombragés et un peu humides, surtout les bois. Mai à juillet. Dijon, au bas du mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles sèches; avril. Plombières, combes de Neuvon. Fixin, bois de la plaine. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1943. *S. ATER. Kugel.* — *OBLONGUS. Dej.* Rare. Environs de Dijon.

1944. *S. ANALIS. F.* Je possède seulement trois exemplaires de cette espèce, pris tous trois dans les environs de Dijon, l'un à Villenotte près Semur.

1945. *S. HÆMORRHOIDALIS. Herbst.* Commun. En fauchant dans les bois, surtout ceux de la plaine. Mai à octobre. Plombières, combe de Neuvon et coteau du bois de Gontard. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. Collonges-les-Premières. Gevrey, bois de la plaine. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Villenotte près Semur, bois de Champeaux. (Beaune. — M. *André*.)

1946. *S. DISCOIDEUS. Schn.* Pas commun. Environs de Dijon. Collonges-les-Premières, en fauchant dans le bois, 12 juillet. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *André*.)

1947. *S. MINIMUS. Payk.* — *ATER. Ill.* Pas rare. Sur les feuilles dans les jardins et les bois. Mai à octobre. Dijon, jardins dans la ville. Plombières, combe de Neuvon. Marsannay-la-Côte. Fixin, bois de la plaine. Villenotte près Semur, bois de Champeaux. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias* et *André*.)

J'ai trouvé un certain nombre de larves de cette espèce, en même temps que la nymphe et l'insecte parfait, à Dijon, dans un jardin dans l'intérieur de la ville, en août et au commencement de septembre, sur la face inférieure des feuilles de l'acacia rose (*Robinia hispida*) et du faux ébénier (*Cytisus laburnum*); les feuilles présentent dans la partie où se tiennent ces larves des fils très-ténus et peu serrés, semblables à ceux des araignées.







Je ne sais si ces fils sont produits par cette larve, je le suppose néanmoins; ils auraient alors pour objet soit de l'empêcher de tomber, soit de retenir les petits *Acarus* qui se trouvent toujours sous ces feuilles et dont les larves du *Scymnus minimus* se nourrissent probablement, car je n'ai remarqué aucune lésion sur les feuilles où plusieurs de ces larves se trouvaient quelquefois réunies; lésions qui auraient été de nature alors à me faire penser qu'elles se nourrissent aux dépens du végétal.

La nymphe se trouve aussi, comme je l'ai déjà dit, à la face inférieure des feuilles; elle tient à la feuille par la peau desséchée provenant de la métamorphose de la larve; cette peau est repliée sur elle-même, et la nymphe s'y trouve engagée. On aperçoit à la partie antérieure de cette peau deux points d'un vert brillant et transparent, visibles seulement à un certain jour, et qui sont probablement la place des yeux de la larve.

La transformation de la nymphe en insecte parfait a lieu au bout de cinq jours; l'insecte sort par une ouverture transversale de la peau de la nymphe qui se forme alors entre le prosternum et le mesosternum; il est d'abord mou et en entier d'un jaune paille très-clair, et ne devient noir qu'après quelques heures (1).

RHIZOBIUS. Steph. — NUNDINA. Dej.

1948. R. LITURA. F. Commun. En fauchant, surtout dans les lieux humides. Été, automne; quelquefois l'hiver

---

(1) La larve du *Sc. minimus* est indiquée dans le *Catalogue des larves des Coléoptères* de MM. Chapuis et Candèze, p. 636, comme n'étant encore connue que par une très-courte description donnée par M. Bouché (*Entom. Zeit. zu Stett.*, 1837, p. 164). Je crois alors qu'il n'est pas sans utilité de faire connaître plus complètement cette larve, ainsi que la nymphe de l'espèce en question.

Larve (long. 0<sup>m</sup>0025; larg. 0<sup>m</sup>0008). D'un blanc grisâtre (plus foncé aux approches de l'époque de sa transformation en nymphe) ayant en

et au commencement du printemps, sous les pierres. Dijon, près du moulin Vesson, entre l'Ouche et la route; chemin de Daix, au bas de la haie. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Villenotte près Semur. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

COCCIDULA. Kugel.

1949. C. RUFa. *Herbst.* — PECTORALIS. F. Assez commune. Dans les lieux humides, principalement sur les plantes aquatiques, sous les détritux et les mousses. Du 22 avril au 9 octobre. Dijon, fontaine au bas de l'Asile des aliénés. Collonges-les-Premières, près du grand étang. La Rochette près Oisilly. Blaisy-Bas, sur le *Nasturtium officinale*, dans le ruisseau près du bois. Fixin, fossés du chemin de fer, près du bois. Gevrey, bord du petit étang de Satenay et fossés au-dessus du grand étang. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — En battant les arbres; M. Arias. — MM. Bourlier et André.)

1950. C. SCUTELLATA. *Herbst.* Pas rare. Sur les plantes

---

dessus des taches obscures, entièrement molle, oblongue, déprimée, hexapode, composée de douze segments non compris la tête, présentant à la partie supérieure quelques poils supportés par de petits points noirs et saillants, surtout sur les taches obscures. Tête horizontale, petite, un peu rétrécie en avant, ayant de chaque côté une tache obscure et étroite; antennes très-petites, visibles seulement lorsqu'on presse la tête de l'animal. Premier segment (prothoracique) beaucoup plus large que la tête, arrondi antérieurement et sur les côtés; le deuxième (mésothoracique) plus large que le premier, mais beaucoup plus court; le troisième (métathoracique) un peu plus large encore que le deuxième; ces deux derniers assez arrondis sur les côtés; ayant tous trois en dessus une tache obscure de chaque côté de leur milieu; ces taches ainsi que le reste de leur surface, à l'exception de la ligne médiane, présentant de petits points noirs surmontés d'un poil. Segments abdominaux courts, fortement arrondis sur les côtés; les deux ou trois premiers, c'est-à-dire les quatrième, cinquième et sixième segments, au moins aussi larges que le précédent; les suivants diminuant graduellement de largeur jusqu'à l'extrémité; ayant chacun trois tubercules de chaque côté, un tout à fait latéral, un autre près du milieu, et le troisième intermédiaire,





aquatiques. Mai, juin. Dijon, près de l'Ouche ; barrière au-dessus de la gare ; Parc, l'hiver sous une écorce de charme, exemplaire mort. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. Marsannay-la-Côte, fontaine près de Gouvillle. Fixin, fossés près de la voie romaine. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

HIPPODAMIA. *Cherv.*

1954. H. TREDECIMPUNCTATA. *Linn.* Assez commune. Sur les plantes aquatiques. Mai à août. Dijon, bords du Canal et de l'Ouche. Plombières, sur le viaduc de Neuvon, 1<sup>er</sup> novembre. La Rochette près Oisilly, bords de la Vingeanne. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. (Rouvray; pas très-commune. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

ADONIA. *Muls.*

1952. A. MUTABILIS. *Scriba.* Commune. Sur les feuilles des arbres et arbustes et sur différentes plantes. Été, au-

---

formant ainsi sur l'ensemble des segments quatre à onze, six rangées de ces tubercules, dont le sommet est de couleur obscure et présente quelques petits points noirâtres, saillants, et donnant chacun naissance à un poil; le douzième segment, ayant seulement deux tubercules de chaque côté, est terminé par un appendice étroit et bilobé. Pattes courtes, débordant à peine le corps.

*Nymphe* (long. 0<sup>m</sup>0016; larg. 0<sup>m</sup>0012). Noirâtre en dessus, blanchâtre en dessous, ovale, peu allongée, un peu rétrécie en arrière, présentant en dessus de petites aspérités surmontées d'un poil. Tête courbée en dessous; yeux assez gros; labre et épistome distincts, le premier de ceux-ci quadrilobé; antennes très-courtes; palpes très-apparents, beaucoup plus longs et plus gros que les antennes. Prothorax court, presque vertical. Abdomen à neuf segments visibles en dessus, tous très-courts et diminuant graduellement de largeur jusqu'à l'extrémité. Élytres courtes, arrondies, repliées en dessous, mais paraissant aussi en partie en dessus, où elles sont assez écartées l'une de l'autre. Pattes repliées en dessous, et appliquées contre le corps, les quatre antérieures seules visibles, celles de derrière étant cachées sous les élytres, sauf les tarses qui sont un peu apparents.

tomme; quelquefois sous les écorces, sous les pierres et sur les murs au premier printemps et à la fin de l'automne. Dijon, sur les murs dans la ville; chemins autour de la ville sur les haies et les buissons et sous les pierres; Parc, sous les écorces; fontaine au bas de l'Asile des aliénés sous les pierres; barrière au-dessus de la gare. Asnières, sous les pierres au bord du chemin. Talant, sur un mur au bord du chemin de Dijon. Plombières, combe de Neuvon et sur le viaduc. Gevrey, sur de petits saules au bord de la mare près de la gare. (Pontailler-sur-Saône; sous les écorces. — M. *Dudrumel*.) (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

IDALIA. *Muls*.

1953. I. LIVIDA. *De Géer*. — M. NIGRUM. *F*. Pas commune. Je n'ai trouvé cette espèce qu'à Plombières, sur le viaduc de Neuvon, à la fin d'octobre et le 4<sup>er</sup> novembre. (Beaune; en battant les arbres. — M. *Bourlier*.)

1954. I. BIPUNCTATA. *Linn*. Commune. Sur les feuilles des arbres et arbrisseaux, ainsi que sur les feuilles et les fleurs de différentes plantes; sur les murs; sous les écorces. Printemps, été, automne; l'hiver, au premier printemps et à la fin de l'automne sous les écorces. Dijon et les environs, à peu près partout. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

J'ai trouvé à Plombières, sur le viaduc de Neuvon, en octobre, un exemplaire d'une variété qui diffère de l'état normal par la présence, à la base de chaque élytre, de deux petits traits noirs.

Les variétés à taches rouges sur un fond noir sont moins communes que le type.

1955. I. UNDECIMNOTATA. *Schn*. Pas rare. Sur le *Carduus nutans*, les saules, etc. Juin à septembre. Dijon, Vieux-Suzon. Talant, coteaux près du chemin de fer. Gevrey, sur







les saules au bord de la mare qui est près de la gare. (Rouvray ; pas commune, mais trouvée une fois par masses considérables sur la montagne de Viserny. — M. Emy.) (1). (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

COCCINELLA. *Linn.*

1956. C. QUINQUEPUNCTATA. *Linn.* Pas rare. Sur les feuilles des arbres, surtout dans les endroits un peu humides. Mai à octobre. La Rochette près Oisilly. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, sur les saules au bord de la mare qui est près de la gare. Blaisy-Bas, bois au midi du village. Villenotte près Semur. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

1957. C. SEPTEMPUNCTATA. *Linn.* Commune. Sur différentes plantes, notamment les chardons, et sur les feuilles des arbres et arbustes ; quelquefois sous les écorces et sous les pierres. Mai à octobre : l'hiver, au premier printemps et à la fin de l'automne sous les écorces et les pierres. Dijon et les environs, à peu près partout. Je l'ai trouvée très-communément, ainsi que sa larve et sa nymphe, sur des fèves dans un champ près de Dijon, le 15 juillet. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

1958. C. LABILIS. *Ericks.* Pas commune. Dans les bois sur les feuilles et en fauchant. Mai à juillet. Plombières, combe de Neuvon, trouvée une fois au vol le 18 avril. Etc. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

1959. C. VARIABILIS. *Ill.* Commune. Sur les plantes et les arbrisseaux. Mai à août. Dijon, presque partout autour

---

(1) M. Emy l'indique sous le nom de *Undecimpunctata* ; mais je la rapporte à la *Undecimnotata*, dans la supposition très-probable d'une erreur de sa part. La *Coccinella Undecimpunctata* est une espèce qui s'éloigne peu des bords de la mer, et dont je ne m'expliquerais pas la capture dans le centre ou l'est de la France.

de la ville ; Parc. Gevrey. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

1960. C. HIEROGLYPHICA. *Linn.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Beaune ; pas trop commune. — M. *Arias.*)

1961. C. QUATUORDECIMPUSTULATA. *Linn.* Commune. Sur les plantes et les arbustes. Été, automne. Dijon et les environs, presque partout ; quelquefois l'hiver et au printemps sous les écorces. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

HARMONIA. *Muls.*

1962. H. IMPUSTULATA. *Linn.* — CONGLOBATA. *F.* Commune. Sur les plantes en été, au vol et sur les murs en automne, sous les écorces l'hiver et au premier printemps. Dijon, dans la ville sur les murs ; Parc ; etc. Plombières, viaduc de Neuvo. Mâlain, viaduc. Chambolle. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

1963. H. MARGINEPUNCTATA. *Schall.* — SEDECIMPUNCTATA. *F.* Peu commune. Je ne l'ai trouvée que l'hiver sous les écorces, et l'automne sur les murs. Dijon, Parc et Jardin botanique, sous les écorces de platane et de sycomore. Plombières, sur le viaduc de Neuvo. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

MYRRHA. *Muls.*

1964. M. OCTODECIMGUTTATA. *Linn.* (Beaune. — M. *André.*)

MYSIA. *Muls.*

1965. M. OBLONGOCUTTATA. *Linn.* Ce n'est qu'avec doute que je fais figurer ici cet insecte, dont quelques exemplaires m'ont été donnés, il y a fort longtemps, comme provenant des environs de Dijon.





ANATIS. *Muls.*

1966. A. OCELLATA. *Linn.* Un seul exemplaire de cette belle espèce a été trouvé, à ma connaissance, dans nos environs. M. *Turnier* l'a pris, en ma présence, à Dijon, à la fontaine de Larrey, le soir, à la lanterne, en chassant à la filoché des lépidoptères nocturnes sur des saules couverts de pucerons, le 10 août 1846.

SOSPITA. *Muls.*

1967. S. TIGRINA. *Linn.* (Montberthaud; rare, en fauchant sur les osiers et les houblons sur la rive droite du Serein, au-dessous du village; juillet. — M. *Emy.*)

CALVIA. *Muls.*

1968. C. QUATUORDECIMGUTTATA. *Linn.* Pas commune. Sur les feuilles des arbustes l'été, sous les écorces l'hiver, etc. Dijon, dans divers endroits autour de la ville, trouvée aussi dans la ville par terre. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

1969. C. DEGEMGUTTATA. *Linn.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

1970. C. SEPTEMGUTTATA. *Schall.* — BISSEPTEMGUTTATA. *F.* (Beaune. — Sur les arbres; l'hiver sous les écorces. M. *Bourlier.* — M. *André.*)

HALYZIA. *Muls.*

1971. H. SEDECMGUTTATA. *Linn.* Pas commune. Dans les endroits humides. Eté. Dijon, mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles mortes; 15 avril. Environs de Dijon. Gevrey, bois près du petit étang de Satenay, sous les feuilles de noisetier, 24 avril. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

VIBIDIA. *Muls.*

1972. V. DUODECIMGUTTATA. *Poda.* — BISSEXGUTTATA. *F.* Pas rare. Sur les feuilles de différents arbres et arbustes. Été, automne. Dijon, mur au nord du clos de Pouilly sous les feuilles sèches, le 13 avril. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Plombières, combes de Neuvon et sur le viaduc. (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

PROPYLEA. *Muls.*

1973. P. QUATUORDECIMPUNCTATA. *Linn.* — CONGLOMERATA. *F.* Commune. Sur les plantes et les feuilles des arbres, surtout en fauchant. Mai à septembre. Dijon, presque partout autour de la ville. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Gevrey, bois de la plaine et de la montagne. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

THEA. *Muls.*

1974. T. PUNCTATA. *Linn.* — VIGINTIDUOPUNCTATA. *Linn.* — VIGINTIPUNCTATA. *F.* Assez commune. Sur différentes plantes et arbustes en été et en automne, l'hiver et au premier printemps sous les écorces et les pierres, sur les murs en automne. Dijon, chemins autour de la ville ; fontaine au bas de l'Asile des aliénés, sous les mousses ; mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles mortes. Plombières, combe et viaduc de Neuvon. Marsannay-la-Côte. Chambolle. Villenotte près Semur. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

EPILACHNA. *Chevr.*

1975. E. ARGUS. *Foucr.* — UNDECIMMACULATA. *F.* Commune. Sur la bryone, *Bryonia dioica*. Mai à juillet ; quel-







quefois au premier printemps sous les pierres. Dijon, partout où croit la plante précitée, surtout au bord des chemins le long des haies et des buissons. Environs de Dijon. (Fixin. — M. Tarnier.) La larve se trouve sur la même plante et s'en nourrit. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — Pas commune; sur la *Momordica elaterium*. M. Arias. — Sur la clématite. M. Bourlier. — M. André.)

LASIA. Hoppe. — CYNEGETIS. Chev.

1976. L. GLOBOSA. Schn. Commune. Sur la saponaire, *Saponaria officinalis*, quelquefois sur la *Lychnis vespertina* (*dioica*). Mai à août; quelquefois en avril sous les pierres. Dijon, chemins un peu humides autour de la ville; bords du Canal; Combe-aux-Serpents; etc. Plombières, combe de Neuvo. Flavignerot. Collonges-les-Premières. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — Très-commune. M. Arias. — Dans les bois, en battant les arbres. M. Bourlier. — M. André.)



## LYCOPERDINÆ.

ENDOMYCHUS. Helwig.

1977. E. COCCINNEUS. Linn. Cet insecte est assez commun à Dijon, au Parc, lorsqu'il s'y trouve des charmes morts sur pied; sous l'écorce de ces arbres à peu près toute l'année, surtout l'hiver; on trouve également sa larve sous les mêmes écorces. J'ai trouvé à Flavignerot, en battant de vieux fagots, une larve que je crois être celle de cet insecte; cependant il me reste quelques doutes, et il

serait possible que cette larve appartint à la *Lycoperdina bovista*. (Rouvray; fort rare. — M. Emy.) (Beaune; un exemplaire. — M. Arias.)

LYCOPERDINA. Latr.

1978. L. BOVISTÆ. F. Assez commune. Dans les lycoperdons, notamment le *Lycoperdon bovista*, dans les endroits peu garnis et les friches des bois; trouvée aussi sur d'autres espèces de *Lycoperdon* dans les bois humides et ombreux; je l'ai prise également quelquefois en battant les fagots. Automne, hiver, printemps, dans les lycoperdons; mai, en battant les fagots. Corcelles-les-Monts, Mont-Afrique. Chaignay. Baume-la-Roche. Epernay. Chambolle. Villenotte, bois de Champeaux, dans les *Lyc. Verrucosum?* et autres. (Environs de Rouvray; bois de Champcourt, dans un champignon; juin. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)



**BLAPES.**

ASIDA. Latr.

1979. A. MORBILLOSA. F. — GRISEA. F. Pas rare. Par terre et sous les pierres, surtout sur les montagnes. Toute l'année. Dijon, route de Langres; derrière le Parc du côté de Longvic; montagnes à l'ouest de Dijon. Talant. (Fixin. — M. Tarnier.) (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

BLAPS. F.

1980. B. OBTUSA. F. — MUCRONATA. Latr. — CHEVROLATI. Solier. Commune. Dans les lieux obscurs du rez-de-chaus-





sée des maisons, surtout les écuries, les latrines et les caves peu profondes et peu humides; l'insecte se tient caché pendant le jour et ne circule à peu près que la nuit. Presque toute l'année. Dijon. (Rouvray; assez rare. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

1981. B. FATIDICA. *Sturm.* Moins commune que la précédente; dans les mêmes conditions. Dijon. (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*)

PEDINUS. *Latr.*

1982. P. FEMORALIS. *Latr.* Je n'ai jamais trouvé cette espèce, dont je possède deux exemplaires qui m'ont été donnés, il y a longtemps déjà, par M. V. *Gruère*, actuellement docteur-médecin à Dijon; il les avait trouvés sous des pierres sur la montagne de Fontaine-les-Dijon. J'ai également entendu dire qu'elle avait été trouvée à Plombières par des élèves du petit-séminaire.



**OPATRI.**

OPATRUM. *F.*

1983. O. SABULOSUM. *Linn.* Commun. Par terre et sous les pierres, principalement au bord des chemins secs et sur les talus exposés au midi. Toute l'année. Dijon, chemins à l'ouest de la ville. Plombières, combe de Neuvon, dans la partie non boisée. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

BOLITOPHAGUS. *III.*

1984. B. AGRICOLA. *F.* — AGARICOLA. *Panz.* (Rouvray; pas fort commun. — M. *Emy.*)

## DIAPERIDES.

---

### PHYLETHUS. *Meg.*

1985. P. POPULI. *Meg.* (Rouvray; battue des haies sèches; pas commun. — M. *Emy.*)

### DIAPERIS. *Geoffr.*

1986. D. BOLETI. *Linn.* Je n'ai trouvé cette espèce qu'une seule fois, mais en certain nombre, au mois de septembre 1837, à Chambolle, dans un bolet encore mou, sur le tronc d'un vieux noyer, dans la combe, avant la bifurcation. J'ai trouvé en même temps des nymphes et des insectes parfaits, non encore colorés. (Rouvray; pas commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *André.*)

### SCAPHIDEMA. *Redt.* — NEOMIDA. *Ziegl.*

1987. S. BICOLOR. *F.* (Rouvray; pas commun; battue des haies sèches et vives. — M. *Emy.*)

### PLATYDEMA. *Laporte.* — NEOMIDA. *Ziegl.*

1988. P. VIOLACEA. *F.* Très-rare. Sous les écorces d'ormes morts, principalement celles des troncs abattus et des grosses branches tombées; trouvée aussi sous les écorces de charmes morts. Janvier et février. Dijon, Parc.









## **TENEBRIONES.**

---

### HYPOPHLOEUS. *F.*

1989. *H. CASTANEUS. F.* (Beaune ; rare. — *M. Arias.*)

1990. *H. DEPRESSUS. F.* Très-rare. Sous les écorces. Dijon, au Parc sous des écorces de charmes morts. (Rouvray ; rare. — *M. Emy.*)

1991. *H. BICOLOR. F.* Pas rare. Sous les écorces d'arbres morts. Hiver, commencement du printemps, fin de l'automne. Dijon, au Parc sous les écorces de charme, plus rarement sous celles des ormes ; trouvé aussi sur du bois coupé, en mai.

### TENEBRIO. *Linn.*

1992. *T. MOLITOR. Linn.* Commun. Dans les magasins où l'on conserve de la farine, chez les boulangers ; le soir. Été, automne. Dijon. (Fixin ; dans un grenier. — *M. Tarnier.*) (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune. — *MM. Arias, Bourlier et André.*)

La larve est commune dans la vieille farine.

1993. *T. OBSCURUS. F.* Commun. Comme le précédent, et en outre dans les vieux troncs d'arbres. Été, automne. Dijon, chez les boulangers, les marchands de farine, quelquefois aussi dans les maisons particulières ; Allée-de-la-Retraite, le soir, sur les troncs creux des tilleuls, à l'entrée de la nuit. (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune. — *MM. Arias, Bourlier et André.*)

La larve se trouve également dans la vieille farine.

---

## HELOPES.

---

CRYPTICUS. *Latr.*

1994. C. GLABER. *F.* (Rouvray; rare. — M. *Emy.*)

HELOPS. *F.*

1995. H. LANIPES. *F.* Commun. Sous les écorces, sur les barrières, les échalas, etc. Fin mars à mai. Dijon, Parc; barrière au-dessus de la gare; au-dessus de la fontaine de Larrey; dans les vignes sur les tas d'échalas. Fixin, barrière du chemin de fer. Chambolle. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

1996. H. CARABOIDES. *Panz.* (Rouvray; très commun. — M. *Emy.*) (Semur; écorces des chênes, principalement sous la mousse. — M. *Nodot.*)

1997. H. ASSIMILIS. *Küst.* J'ai trouvé un seul exemplaire de cet insecte, le 21 juin 1856, à Talant dans la petite combe qui conduit à la route de Plombières, au-dessus du moulin Vesson, sur une feuille basse d'un *Verbascum*.



## CISTELÆ.

---

ALLECULÆ. *F.*

1998. A. MORIO. *F.* Pas rare; surtout avant la destruction des tilleuls des promenades de Dijon, et notamment





de ceux de l'Allée-de-la-Retraite. Dans et sur les troncs creux des tilleuls le soir; quelquefois la journée par des temps couverts et orageux. Du 23 juillet au 12 août. Dijon, Allée-de-la-Retraite; cours du Parc; cours Fleury; remparts autour de la ville. M. *Dudrumet* a obtenu cet insecte d'éclosion; il provenait de bois pourri de tilleul conservé chez lui. (Rouvray; très-rare. — M. *Emy*.)

PRIONYCHUS. *Solier*. — CISTELA. *F.*

1999. P. ATER. *F.* Pas rare. Le soir au vol autour des vieux saules et des peupliers, ainsi que sur le tronc de ces arbres; quelquefois sur le tronc des tilleuls. Du 22 juin au 10 août. Dijon, fontaine de Larrey; bords de l'Ouche; Allée-de-la-Retraite; route de Langres. Flavignerot. (Rouvray; rare. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

M. *Dudrumet* a également obtenu cette espèce d'éclosion provenant du même bois pourri que la précédente.

CISTELA. *Geoffr.*

2000. C. FULVIPES. *F.* Pas commune. Sur les feuilles de chêne dans les bois de la montagne, deux ou trois ans après la coupe. Du 18 mai au 23 juin. Marsannay-la-Côte, dans la combe. Gevrey, bois du Chaignot et de Château-Renard; elle n'était pas rare dans ce dernier bois en 1852, au-dessus de la montée. (Rouvray; rare. — M. *Emy*.)

2001. C. CERAMBOIDES. *Linn.* Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cette espèce le 14 juin, à Gevrey, sur une feuille de sureau dans une coupe de l'hiver précédent du bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. M. *Tarnier* en a pris deux exemplaires, probablement dans les environs de Fixin. (Rouvray; assez rare. — M. *Emy*.)

2002. *C. MURINA*. *P.* Pas rare. Sur les arbustes, surtout dans les bois de montagne. Du 28 mai au 3 août. Dijon, Combe-aux-Serpents sur le cornouiller sanguin et l'épine-vinette. Fontaine, grande friche à l'ouest. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot. Velars-sur-Ouche, bois près du Crucifix, sur les fleurs de cornouiller sanguin. Fixin, bois près du chemin de fer. (Rouvray; commune.— *M. Emy.*) (Beaune. — *M. André.*)

*CTENIOPUS. Solier. — CISTELA. F.*

2003. *C. SULPHUREUS. Linn.* Commun. Dans les bois de montagne, sur les fleurs de *Galium*, d'ombellifères et de quelques autres plantes. Du 21 juin au 11 juillet. Plombières, coteaux de Neuvon, et dans la combe. Velars-sur-Ouche, Notre-Dame-d'Etang. Marsannay-la-Côte, près du parc de Gouville. Gevrey. (Beaune. — *MM. Bourlier et André.*)

J'ai vu une fois cette espèce en nombre très-considérable à Dijon, chez un pharmacien, sur de la fleur de tilleul qui venait de lui être apportée des environs de La Cude.

*OMOPHILUS. Solier.*

2004. *O. PINICOLA. Meg.* (Rouvray; commun. — *M. Emy.*)

2005. *O. BREVICOLLIS. Muls.* Commun. Sur les arbustes, surtout dans les bois sur le chêne dans les jeunes taillis et en secouant les baliveaux. Fin mai, commencement de juin. Dijon. Plombières, bois de Neuvon. Velars-sur-Ouche. Gevrey. Chambolle. Etc. (Beaune. — *MM. Arias et André.*)

*MYCETOCHARES. Latr.*

2006. *M. LINEARIS. Ill. — BARBATA. Latr.* Commune. Dans les troncs creux de différents arbres, notamment de







tilleuls, saules, etc. Mai, juin, commencement de juillet. Dijon, cours du Parc; Allée-de-la-Retraite; cours Fleury; route de Langres; remparts; intérieur du Parc, sur du bois coupé. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

2007. M. BIPUSTULATA. *Ill.* — SCAPULARIS. *Gyll.* (Rouvray; fin juin; dans le bois pourri des hêtres; assez rare. — M. *Emy.*)



## SERROPALPI.

### MELANDRYA. *F.*

2008. M. CARABOIDES. *Linn.* — SERRATA. *F.* Rare. Je n'ai pris que deux exemplaires de cette espèce : l'un dans la combe de Flavignerot, au vol à l'ombre, le 3 juin, et l'autre à Gevrey, au bord du chemin de Saulon, près du ruisseau qui le traverse, sur le tronc d'un peuplier où il venait de se poser. Un autre exemplaire a été pris aussi dans les environs de Flavignerot. (Rouvray; assez rare. — M. *Emy.*)

### CONOPALPUS. *Gyll.*

2009. C. VIGORSII. *Steph.* — COLLARIS. *Dej.* Excessivement rare. Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cet insecte, le 14 juin 1846, à Dijon, sur le rempart de la Miséricorde, vis-à-vis la rue du Mouton, au vol le soir sur les 6 heures 1/2 par un temps très chaud; il sortait, sans doute, soit d'un tilleul, soit du bois des chantiers de charpentiers qui se trouvent à l'ouest de ce rempart.

HYPULUS. *Payk.*

2010. H. BIFASCIATUS. *F.* (Rouvray ; extrêmement rare. — M. *Emy.*)

DIRCÆA. *F.*

2011. D. VARIEGATA. *F.* Rare. Nous avons trouvé, M. le capitaine *Godart* et moi, chacun un exemplaire de cette espèce en battant des fagots dans la combe de Flavignerot, le 13 mai. (Beaune ; trouvée dans des échalas provenant de Gigny, par M. *Ed. André.*) (Rouvray ; commune ; en battant les haies sèches. — M. *Emy.*)

SERROPALPUS. *Hellen.*

2012. S. STRIATUS. *Hellen.* — BARBATUS. *F.* Je possède un exemplaire de cet insecte qui m'a été donné il y a fort longtemps comme trouvé à Dijon.

HALLOMENUS. *Hellwig.*

2013. H. FLEXUOSUS. *Payk.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

2014. H. AFFINIS. *Payk.* (Rouvray ; battue des haies près le moulin Bierry ; août. — M. *Emy.*)

ABDERA. *Steph.*

2015. A. QUADRIFASCIATA. *Steph.* Cette espèce paraît extrêmement rare. J'en ai pris un seul exemplaire en juin 1837, à Chambolle, dans la combe, embranchement de gauche, au bas de la montée, courant sur l'écorce du tronc-d'un vieux noyer.

ORCHESIA. *Latr.*

2016. O. MICANS. *Payk.* Pas commune. Dans les bolets ligneux croissant sur les vieux troncs d'arbres, notam-

ment des saules et des noyers. Juin. Environs de Dijon.  
(Rouvray. — M. Emy.)

---

## MORDELLÆ.

---

### SCRAPTIA. Latr.

2017. S. FUSCA. Latr. Très-commune. Dans les friches des bois de montagne, en fauchant sur les graminées et les arbustes; quelquefois dans les lieux non boisés. Du 6 juin au 26 juillet. Dijon, Combe-aux-Serpents sur les cornouillers et les épinettes. Plombières, coteaux de Neuvon, principalement dans le bois de Gontard; Champmoron. Marsannay-la-Côte, montagne entre les deux combes. Gevrey. Etc.

2018. S. FUSCULA. Ill. — MINUTA. Dej. Rare. J'ai trouvé quelques exemplaires de cette espèce à Dijon, sur le tronc d'un tilleul creux, à l'Allée-de-la-Retraite, le soir, les 21 et 26 juillet. M. Dudrumel l'a obtenu d'éclosion du 12 juillet au 2 août; il provenait de bois pourri de tilleul rapporté d'une des promenades des environs de Dijon.

### RHIPIPHORUS. F. — METOECUS. Dej.

2019. R. PARADOXUS. Linn. Feu M. J. Saintpère a trouvé trois exemplaires de cette belle et rare espèce (un mâle, et deux femelles dont je possède une), à Dijon, au commencement de septembre 1843 dans un jardin qui lui appartenait alors et qui est aujourd'hui la propriété de M<sup>me</sup> veuve Papinot, au-dessus de la gare sur le chemin des Perrières, dans un nid souterrain de guêpes.

MORDELLA. *Linn.*

2020. M. BISIGNATA. *Ziegl.* — FASCIATA. *Payk.* — BIGUTTATA. *Laporte.* Pas commune. Dans les bois. Juin. Flavignerot. Chambolle. Etc.

2021. M. FASCIATA. *F.* Commune. Sur différentes fleurs, surtout les ombellifères et l'*Achillea millefolium*. Juin, juillet, août. Dijon, chemins autour de la ville, bords du Canal, fontaine de Larrey, etc. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot. Collonges-les-Premières. Gevrey. Chambolle. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

2022. M. ACULEATA. *Linn.* Très-commune. Sur les fleurs, principalement les ombellifères. Mai à septembre. Dijon, presque partout, au Parc, à la fontaine de Larrey, etc. Plombières, combes de Neuvon. Collonges-les-Premières. Chambolle. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*)

MORDELLISTENA. *Costa.* — MORDELLA. *Linn.*

2023. M. GRISEA. *Froehl.* Pas commune. Sur les fleurs. Été. Gevrey, bois de la plaine. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*)

2024. M. SUBTRUNCATA. *Muls.* Pas rare. Sur différentes fleurs. Juin. Dijon, Parc, fontaine de Larrey, etc. Plombières, combes et coteaux de Neuvon. Gevrey, bois de la plaine. Etc.

2025. M. PUMILA. *Gyll.* — ELONGATA. *Dej.* Commune. Sur différentes fleurs, surtout dans les bois sur les ombellifères. Juin, juillet. Dijon, Parc, fontaine de Larrey, chemins autour de la ville. Plombières, combes et coteaux de





Neuvon. Magny-sur-Tille. Collonges-les-Premières. Gevrey (1).

2026. *M. PUSILLA*. *Meg.* (Rouvray. — *M. Emy.*)

2027. *M. INÆQUALIS*. *Muls.* Pas rare. Dans les bois sur les ombellifères et en fauchant. Juîn. Plombières, bois de Neuvon. Gevrey, bois de la plaine.

2028. *M. ABDOMINALIS*. *F.* Rare. Sur les ombellifères, surtout dans les bois ombreux. Juîn. Dijon, au Parc sur l'*Anthriscus sylvestris*. Flavignerot. (Rouvray. — *M. Emy.*)

2029. *M. VENTRALIS*. *F.* Plus rare que la précédente; comme elle et dans les mêmes localités.

*M. Mulsant* considère cette espèce comme le mâle de l'*Abdominalis*.

2030. *M. AXILLARIS*. *Gyll.* Pas commun. Dans les lieux ombragés et les bois, sur les ombellifères. Juîn. Dijon, au Parc. Chambolle.

2031. *M. BRUNNEA*. *F.* Cette espèce, que *M. Mulsant* ne considère, ainsi que la précédente, que comme des variétés de la *M. Humeralis*. *Linn.* se trouve comme l'*Axillaris*, mais plus communément. (Rouvray. — *M. Emy.*)

2032. *M. FERRUGINEA*. *Gyll.* Pas rare. Egalement regardée par *M. Mulsant* comme une variété de la *M. Hume-*

---

(1) *M. Vallot* a fait connaître (*Mémoires de l'Académie de Dijon*, année 1829, p. 97) la larve d'une espèce qu'il désigne sous le nom de *Mordella pusilla*. *Dej.*; il l'avait trouvée l'hiver dans l'intérieur des tiges du *Marrubium vulgare*. La transformation en nymphe a eu lieu au mois de juin suivant, et l'insecte parfait est éclos en juillet.

Il serait difficile de dire à quelle espèce se rapporte cette larve, car à l'époque de cette observation plusieurs espèces de couleur noire uniforme étaient confondues sous le même nom. La *Mordella pusilla* du *Catalogue de Dejean* est celle de *Megerle*, à laquelle on donne pour synonyme la *M. Pumila*. *Gyll.*, qui en est aujourd'hui séparée et rentre avec elle dans le genre *Mordellistena*.

Je suppose néanmoins qu'il s'agit plutôt de la *Mordellistena pumila*, qui est commune dans les environs de Dijon, tandis que je n'y ai jamais rencontré la *Pusilla*.



*ralis*. Comme les deux précédentes. Trouvée de plus à Plombières, dans la combe de Neuvon à Darois, en juillet, et à Collonges-les-Premières. (Rouvray; battue des haies; juillet. — M. *Emy*.)

2033. M. VARIEGATA. *F.* — LATERALIS. *Oliv.* Pas rare. Sur les ombellifères et les fleurs de cornouiller sanguin, dans les haies et les bois. Juin à août. Dijon, au Parc; chemin de Daix; etc. Plombières, combe de Neuvon à Darois. (Rouvray. — M. *Emy*.)

ANASPIS: *Geoffr.*

2034. A. FRONTALIS. *Linn.* Commune. Sur les ombellifères, surtout dans les lieux ombragés et les bois. Mai à juillet. Dijon, au Parc, etc. Plombières, combe de Neuvon. Collonges-les-Premières. Gevrey, bois de la plaine. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

2035. A. MELANOSTOMA. *Costa.* — MONILICORNIS. *Muls.* Pas rare. Sur les ombellifères. Environs de Dijon.

2036. A. RUFILABRIS. *Gyll.* Pas rare. Sur les ombellifères, principalement dans les endroits ombragés et les bois. Juin. Dijon, fontaine de Larrey, Parc, etc. Plombières, combe de Neuvon. (Beaune. — M. *Bourlier*.)

2037. A. PULICARIA. *Costa.* — LATERALIS. *Steph.* — FORCIPATA. *Muls.* Pas rare. Sur les ombellifères dans les bois. Juin. Plombières, bois de Neuvon, surtout sur les peulouses.

2038. A. HUMERALIS. *F.* — GEOFFROYI. *Müll.* Commune. Dijon, au Parc sur les fleurs d'*Anthriscus sylvestris*. Du 11 au 28 maj. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

La variété NIGRICOLLIS est indiquée par M. *Emy* comme commune sur le genêt à balais en fleurs.





2039. A. RUFICOLLIS. *F.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*)

2040. A. THORACICA. *Linn.* Pas rare. Dans les bois de la plaine, en fauchant. Mai, juin. (Dijon, sur les fleurs d'aubépine. — M. *Tarnier.*) Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Etc.

2041. A. FLAVA. *Linn.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*)

2042. A. SUBTESTAGEA. *Steph.* Pas commune. Environs de Dijon.

2043. A. MACULATA. *Geoffr.* Très-commune. Sur les ombellifères, à l'ombre dans les bois. Mai, juin. Dijon, au Parc sur l'*Anthriscus sylvestris*. Fixin, bois de la plaine. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

SILARIA. *Muls.*

2044. S. VARIANS. *Muls.* Pas rare. Sur différentes fleurs, notamment sur les ombellifères. Fin juin, juillet, août. Dijon, chemins autour de la ville; chemin de Daix, sur des fleurs de carotte; le long des murs est et sud du clos de Montmuzard, sur les fleurs de *Linaria striata*, *Galium verum*, *Marrubium vulgare*. Plombières, combe de Nœuvon.



**CANTHARIDES.**

SITARIS. *Latr.*

2045. S. HUMERALIS. *F.* — MURALIS. *Forst.* Rare. Sur les murs sur lesquels se trouvent des nids d'abeilles maçonnées (*Anthophora*). Fin août, commencement de septembre. (Dijon. — Dans la ville sur un escalier, 2 sep-

tembre ; M. *Nodot*. — Sur le mur du Parc du côté de Longvic , août ; M. *Blondeau*, d'après M. *Tarnier*. ) ( Savigny-sous-Beaune , sur les murs en pisé ; etc. — M. *Bourlier*. )

MELOE. *Linn.*

2046. M. PROSCARABEUS. *Linn.* Commun. Dans les champs et sur les chemins peu fréquentés. Fin mars , avril , mai. Dijon , chemins autour de la ville , surtout ceux où l'herbe croît ; dans les champs. Quetigny. Etc. ( Rouvray. — M. *Emy*. ) ( Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*. )

Cette espèce ainsi que les suivantes font suinter par les articulations de leurs pattes , lorsqu'on les saisit , un liquide jaunâtre doué de propriétés vésicantes très-énergiques. Il faut éviter , après avoir manié ces insectes , de porter les mains à ses yeux ou à ses lèvres avant de les avoir lavées.

2047. M. CYANEUS. *Dej. Muls.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2048. M. VIOLACEUS. *Marsh.* ( Dijon , chemin conduisant du cours Fleury à l'octroi du chemin du Vieux-Suzon ; commencement de mai ; un exemplaire. — M. *Henri de Lacuisine*. ) ( Rouvray. — M. *Emy*. ) ( Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*. )

2049. M. AUTUMNALIS. *Oliv.* Pas rare. Dans les champs et sur les chemins. Septembre , octobre , commencement de novembre. Dijon , autour de la ville ; combe Saint-Joseph. ( Rouvray. — M. *Emy*. ) ( Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*. )

2050. M. CICATRICOSUS. *Leach.* Rare. Sur les chemins peu fréquentés , Fin avril , mai. Dijon , chemins du côté de Fontaine ; voie romaine de l'autre côté du Canal , près de la ferme de Romelet.





2051. M. VARIEGATUS. *Donovan*. — SCABROSUS. *Ill*. Pas rare. Sur les chemins peu fréquentés et dans les champs. Du 16 mars au 20 mai. Dijon, presque sur tous les chemins herbeux autour de la ville et dans les champs. (Rouvray; rare. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

2052. M. RUGOSUS. *Marsh*. — RUGULOSUS. *Ziegl*. Rare. Sur les chemins peu fréquentés et dans les champs. Avril, mai. Dijon, chemins du côté de Fontaine; près du clos de Pouilly; à l'ouest du Parc; voie romaine derrière le Parc, près de la ferme de Romelet.

2053. M. BREVICOLLIS. *Panz*. Rare. J'ai trouvé un exemplaire de cette espèce à Velars-sur-Ouche, dans la combe Bouchard, sur le chemin, le 27 mars; deux autres ont été pris à Dijon, sur le chemin de la Charmette, les 3 et 30 avril, par M. *H. de Lacuisine*. (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

MYLABRIS. F.

2054. M. VARIABILIS. *Bilb*. Je n'ai trouvé que deux exemplaires de cette espèce, le 20 août, sur des fleurs, dans les champs près de Saint-Philibert. Trouvée aussi par M. *Tarnier* sur le chemin de Marsannay-la-Côte, sur des fleurs. (Beaune. — Très-commune l'été, dans les endroits arides sur les fleurs composées. M. *Arias*. — Sur les scabieuses. M. *Bourlier*. — M. *André*.)

CEROCOMA. *Geoffr*.

2055. C. SCHEFFERI. *Linn*. Rare. Sur les fleurs, surtout les ombellifères. Juillet, août. (Dijon, sur les ombellifères derrière le Parc du côté de Longvic. — M. *Nodot*.) (Epernay, sur des fleurs; 29 juin. — M. *J. Saintpère*.) Saint-Philibert, dans les champs à l'ouest du bois sur des fleurs.



Chambolle, dans la combe, embranchement à gauche. (Rouvray; fort rare. Semur. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*)

CANTHARIS. *Geoffr.* — LYTTA. *F.*

2056. C. VESICATORIA. *Linn.* Très-commune. Sur les frênes; quelquefois sur les lilas. Fin mai, juin. Dijon, cours du Parc, etc. Environs de Dijon, presque partout. Chambolle, sur les lilas dans un jardin. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

Cette espèce est recueillie à cause de sa propriété épispastique, et d'un emploi fréquent en pharmacie.



**CEDEMERÆ.**

ASCLERA. *Dej.*

2057. A. SANGUINICOLLIS. *F.* Rare. Je n'ai trouvé cet insecte qu'à Dijon, au Parc dans du bois d'orme pourri au pied de l'arbre en février, et sur du bois coupé et empilé en mai.

2058. A. COERULEA. *Linn.* — COERULESCENS. *F.* Pas commune. Dijon, au Parc, dans du bois d'orme pourri en février, en fauchant dans l'intérieur de cette promenade et dans le fossé du cours du Parc à l'ouest. (Rouvray. — M. *Emy.*)

ANONCODES. *Dej.*

2059. A. USTULATA. *F.* — MELANURA. *F.* Rare. Gevrey, en fauchant au bord du petit étang de Satenay et sous les





peupliers qui sont au-dessus du grand étang. Juin, juillet. (Montbard. — M. *Gontard*, d'après M. *Emy*.) (Beaune. — Sur les plantes au bord des ruisseaux. M. *Bourlier*. — M. *André*.)

OEDEMERA. *Oliv.*

2060. O. PODAGRARIÆ. *Linn.* Commune. Sur différentes fleurs, surtout dans les bois. Juin, juillet. (Messigny, valon de Sainte-Foy. — M. *Nodot*.) Velars-sur-Ouche, bois près du Crucifix, sur un *Erysimum*. Flavignerot. Fixin, bois près du chemin de fer. Etc. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

2061. O. MARGINATA. *F.* Pas rare. En fauchant dans les bois. Juin, juillet. Plombières, combe de Neuvon à Darois. (Rouvray; très-rare. — M. *Emy*.)

2062. O. FLAVIPES. *F.* — CLAVIPES. *F.* Commune. En fauchant et sur les fleurs dans les bois. Mai, juin. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Velars-sur-Ouche, bois près du Crucifix. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

2063. O. VIRESCENS. *Linn.* Commune. En fauchant dans les bois humides. Mai, juin. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux.

2064. O. LURIDA. *Marsh.* Commune. Comme la précédente. Juin à septembre. Plombières, combe de Neuvon. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

DRYOPS. *F.*

2065. D. FEMORATA. *F.* Rare. Je n'ai jamais pris cette espèce, qui est nocturne et se trouve sur les fleurs de lierre dans les bois en septembre. Elle a été prise à Flavi-

gnerot, par M. *L. Humbert*, le soir dans une chambre du château dont les murs sont couverts de lierre dans plusieurs endroits ; elle avait été attirée par la lumière d'une chandelle placée vers la fenêtre. M. *J. Saintpère* en a également pris, à l'Étang-Vergy, la journée, un certain nombre d'exemplaires appliqués contre le tronc de gros sorbiers (*Pyrus sorbus*) sur lesquels probablement croissait du lierre.

---

**LAGRIÆ.**

---

**LAGRIA. F.**

2066. *L. GLABRATA. Oliv.* Deux exemplaires de cette espèce ont été pris à Talant, sous des pierres, en août 1858 par M. le docteur *Blondeau*. (Rouvray. — M. *Emy*.)

2067. *L. HIRTA. Linn.* — Femelle **PUBESCENS. F.** Commune. Sur les haies et les buissons, et sur les feuilles des arbustes dans les bois. Juin à août, commencement de septembre. Dijon, au bord des chemins, sur les buissons, notamment sur le chemin de Daix ; au Parc ; etc. Plombières, combe de Neuvon. (Fixin. — M. *Tarnier*.) Gevrey, près du petit étang de Satenay. Chambolle. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

---

**PYROCHROÆ.**

---

**PYROCHROA. Geoffr.**

2068. *P. COCCINNEA. Linn.* Pas rare. Dans les bois, sur les piles de bois à brûler, quelquefois sur les feuilles et au





vol. Du 7 mai au 23 juin. Dijon, au Parc. Flavignerot. Velars-sur-Ouche. Blaisy-Bas. Collonges-les-Premières. (Fixin. — M. Tarnier.) Marsannay-la-Côte. Gevrey. Chamholle. Curley. Concœur. (Rouvray; rare. — M. Emy.) Beaune; pas commune. — M. Arias.)

2069. P. RUBENS. *F.* Pas rare. Dans les bois, sur les ombellifères et sur le bois coupé. Du 11 mai au 2 juillet. Dijon, au Parc, sur du bois empilé et sur les fleurs d'*Anthriscus sylvestris*; cours extérieur de Suzon, entre la porte Saint-Nicolas et la porte Neuve, sur un peuplier. Blaisy-Bas, en fauchant. Gevrey, près du petit étang de Satenay. (Rouvray; rare. — M. Emy.) (Beaune; pas commune. — M. Arias.)

---

## **RHINOSIMI.**

---

### **SALPINGUS. III.**

2070. S. QUADRIGUTTATUS. *Lepellet.* (Rouvray; commun; battue des haies sèches. — M. Emy.)

### **RHINOSIMUS. Latr.**

2071. R. ÆNEUS. *Oliv.* J'ai trouvé quelques exemplaires de cet insecte, à Segrois, dans la forêt de Mantuan, sous l'écorce d'un chêne mort sur pied, en octobre.

2072. R. ROBORIS. *F.* Pas commun. Sous les écorces d'arbres morts, principalement de charme; rarement sous les écorces d'arbres vivants. Du 2 novembre au 31 mai. Dijon, au Parc sous les écorces de charme mort, quelquefois sous celles des platanes vivants, et sur du vieux bois empilé la journée et le soir à la lanterne.



2073. R. RUFICOLLIS. *Panz.* Pas commun. Sous les écorces d'arbres morts, principalement de charme; sur le vieux bois coupé, et en battant les vieux fagots. Mars, avril, mai, novembre et décembre. Dijon, au Parc, sous les écorces de charmes morts, rarement sous celles d'autres arbres et sur du bois empilé. Flavignerot, en battant de vieux fagots. (Rouvray; battue des haies sèches. — M. *Emy.*)

2074. R. PLANIROSTRIS. *F.* Commun. Sous les écorces de charmes morts, sous celles des platanes et des sycônares vivants, sur le bois coupé. Décembre à mai. Dijon, au Parc. Chaignay, sous des écorces d'érable-plane vivant. (Rouvray; battue des haies sèches, quelquefois sous les écorces. — M. *Emy.*)



## ANTHICI.

NOTOXUS. *Geoffr.* — MONOCERUS. *Meg.*

2075. N. BRACHYCERUS. *Fald.* — MAJOR. *Schmidt.* J'ai pris un seul exemplaire de cet insecte à Athée, au vol dans le village, le 1<sup>er</sup> juin 1858.

2076. N. MONOCEROS. *Linn.* Rare. En fauchant dans les endroits humides. Mai à juillet. Dijon, bord de la fontaine de Larrey, en fauchant et sur une ortie; au vol sur le chemin qui traverse la Combe-au-Persil. (Seurre; sur le grand Tithymale. — M. *Nodot.*)

ANTHICUS. *Geoffr.*

2077. A. FLORALIS. *F.* Commun. Sous les pierres. Avril, octobre. Dijon, chemins autour de la ville, surtout du





côté de Daix et de Chenôve ; derrière le mur du Parc, du côté de Longvic ; pris aussi dans la ville, au vol, en juin. (Pontailler-sur-Saône, sous des écorces d'orme ; octobre. — M. *Dudrumel*.) Fixin, bois près du chemin de fer, sous des ételles, dans une coupe en exploitation. Vitteaux, au vol sur la route de Dijon ; septembre. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *André*. — L'été sur les fleurs ; M. *Arias*. — Hameau de Gigny, sous les meules de foin ; octobre ; commun ; M. *Bourlier*.)

2078. A. BIFASCIATUS. *Rossi*. — QUADRIPUSTULATUS. *Dahl*. (Beaune ; moins commun que le *Floralis*. — M. *Arias*.) (Rouvray ; dans le sable et les herbes au bord du Serein. — M. *Emy*.)

2079. A. INSTABILIS. *Schmidt*. Pas rare. Environs de Dijon. (Beaune. — M. *Arias*.)

2080. A. SUBFASCIATUS. *Laferté*. J'ai pris deux exemplaires de cette espèce, à Dijon, le soir, les 17 juillet et 4 août, l'un au vol au commencement du chemin d'Ahuy, et l'autre sur la barrière du chemin Meneval, dans la partie qui est entre l'Ouche et le Canal.

2081. A. TENELLUS. *Laferté*. (Beaune. — M. *Bourlier*.)

2082. A. ANTHERINUS. *Linn*. Commun. En fauchant ; sous les pierres et sous les écorces. Presque toute l'année. Dijon, au Parc ; chemins autour de la ville ; Jardin botanique ; etc. Villenotte près Semur, bord du bois de Champpeaux. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

2083. A. QUADRIOCULATUS. *Laferté*. J'ai pris quelques exemplaires de cette espèce à Dijon, au printemps, sous des pierres au bord de l'Ouche près du barrage qui est derrière le Parc, du côté de Longvic.

2084. A. QUADRIGUTTATUS. *Rossi*. (Beaune. — M. *André*.)

2085. A. HISPIDUS. *Rossi*. — HIRTELLUS. *F*. (Rouvray. — M. *Emy*.)


2086. A. FLAVIPES. *Panz.* — RUFIPES. *Payk.* (Rouvray ; sur le sable au bord des ruisseaux. — M. *Emy.*)

XYLOPHILUS. *Latr.*

2087. X. AMABILIS. *Sahlb.* J'ai trouvé un seul exemplaire de cette espèce à Collonges-les-Premières, en fauchant le soir, non loin du grand étang, le 26 juin 1859.

Cet insecte n'a pas encore été signalé, à ma connaissance, comme trouvé en France.

2088. X. POPULNEUS. *F.* Rare. En fauchant. Mai, juin. Dijon, chemin de Daix, au vol le soir ; etc. ; (route de Gray devant Montmuzard, sur un frêne cassé ; mars. — M. *Nodot.*)



SCYDMÆNI.



SCYDMÆNUS. *Latr.*

2089. S. GODARTII. *Latr.* (Rouvray. — M. *Emy.*) Un exemplaire de cette espèce a été également trouvé à Beaune par M. *Bourlier*, sous une pierre, au bord de la Bouzaise, le 16 mars.

2090. S. SCUTELLARIS. *Müller et Kunze.* Pas rare. Sous les pierres, sous la mousse du pied des arbres, sous les feuilles sèches, en fauchant le soir dans les lieux humides, etc. Printemps, été, automne. Dijon, chemin de Daix ; Parc ; mur au nord du clos de Pouilly. Collonges-les-Premières, près du grand étang.

2091. S. PUSILLUS. *Müll. et K.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2092. S. SPARSHALI. *Denny.* Pas rare. En fauchant et sur le bois coupé. Mai à juillet. Dijon, au Parc ; dans la ville, le soir sur les vitres d'un grenier dans lequel se





trouvait du bois à brûler provenant de la forêt de Mantuan, commune de Concoeur. Plombières, combe de Neuvoon à Darois. La Rochette près Oisilly.

2093. *S. DENTICORNIS*. Müll. et K. Pas commun. En fauchant, surtout le soir, dans les bois, principalement dans les coupes en exploitation ou près de ces coupes, quelquefois dans les lieux non boisés. Juin, juillet. Dijon, fontaine de Larrey. Plombières, combes de Neuvoon. Velars-sur-Ouche, au-dessus de la petite combe qui est près de la gare. Gevrey, bois de Pennecière.

2094. *S. HIRTICOLLIS*. Gyll. Commun. En fauchant le soir dans les lieux humides ; sous les pierres dans le voisinage des eaux stagnantes ou des endroits humides, ou sous celles qui recouvrent des places ayant servi à déposer du fumier au bord des chemins. Avril à octobre. Dijon, chemins autour de la ville, dans le voisinage des vignes ; contre-fossé au midi du Canal ; bords du Canal du côté de Plombières. La Rochette près Oisilly. Lamarche-sur-Saône, au bord du petit étang qui se trouve au-dessus du grand étang de Saint-Léger. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. Gevrey, près du petit étang de Satenay. (Beaune. — Sous les pierres au pied des saules et des peupliers, près de la Bouzaise ; mars et avril ; M. Bourlier. — M. André.

2095. *S. WETTERHALLI*. Gyll. — *QUADRATUS*. Müll. Pas rare. Sous les pierres et en fauchant le soir dans les lieux humides. Printemps, été. Dijon, à l'est du petit mur près du moulin Vesson. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. (Beaune. — M. Bourlier.)

2096. *S. RUFUS*. Müll. et K. — *GEOFFROYI*. Dej. Pas commun. Sous les pierres dans les endroits où il y a eu des dépôts de fumier. Avril à juin, septembre. Fontaine, chemin de Daix à Dijon. Chambolle, sur le sable d'un jardin, non loin d'un fumier, par une soirée très chaude.

2097. *S. TARSATUS*. Müll. et K. — *HELLWIGII*. Latr. Com-



mun. Sous les pierres, surtout celles qui recouvrent du fumier ou se trouvent dans une place qui a servi à en déposer; sous les mousses et les détrituts dans les lieux humides; quelquefois le soir au vol dans les soirées très chaudes de l'été; etc. Mars à octobre. Dijon, chemins autour de la ville; bord du ruisseau près de l'Asile des aliénés; fontaine de Larrey; bords du Canal; Parc. Chambole. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — Sous les pierres au pied des saules et des peupliers, près de la Bouzaise; mars; hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre; M. Bourlier. — M. André.)

EUTHEIA. Waterh.

2098. E. TRUNCATELLA. Erichs. — Plicata. Gyll. J'ai pris seulement deux exemplaires de cette espèce, l'un dans une fourmilière de *Formica exsecta*, le 5 avril, à Velars-sur-Ouche dans les bois à l'est de la ferme de Champ-Vichey, et l'autre en fauchant le soir dans les mêmes bois, sur les graminées dans un endroit découvert, le 23 mai, par un temps très chaud.

2099. E. ABBREVIATELLA. Erichs. — SCYDMÆNOIDES. Waterh. Je n'ai pris qu'un exemplaire de cette espèce dans les environs de Dijon, mais je n'ai conservé aucune note sur cette capture.

CEPHENNIUM. Müll. et K.

2100. C. THORACICUM. Müll. et K. Rare. Sous les détrituts et en fauchant dans les endroits humides, quelquefois dans les fourmilières de *Formica rufa* (1). Avril à juin. Plom-

---

(1) Je dois faire observer que, par suite de la confusion, sous le nom de *Formica rufa*, de trois espèces distinctes (confusion qui a cessé seulement depuis leur séparation par M. Nylander dans son travail sur les





bières, combe de Neuvon. Velars-sur-Ouche, sous une pierre. Fixin, bois près du chemin de fer, sous des ételles humides dans une coupe en exploitation. Gevrey, bois d'aulnes, près du petit étang de Satonay, dans le terreau et sous les détritrus autour des souches d'aulnes récemment coupés.

---

## PSELAPHI.

---

### BATRISUS. Aubé.

2101. B. DELAPORTI. Aubé. J'ai pris un seul exemplaire de cet insecte à Dijon, par une soirée très chaude de l'été, au vol, près d'une pile de bois à brûler, au bord du bassin du Canal.

2102. B. OCULATUS. Aubé. Egalement un seul exemplaire; trouvé à Dijon, au Parc, au vol près de bois coupé empilé, le 20 juin.

### CHENNIUM. Latr.

2103. C. BITUBERCULATUM. Latr. Rare. Sous les pierres, en société avec la *Myrmica cœspitum*; surtout sur les coteaux exposés au midi, lorsque la terre est un peu humide. Depuis la fin de mars au milieu de mai; quelquefois, mais très rarement, en septembre et octobre. Dijon, coteau

---

Formicides de France et d'Algérie), mes citations de la *F. rufa*, surtout lorsqu'elle est seule indiquée, doivent se rapporter en réalité soit à la fois à celle-ci et aux *F. congerens* et *exsecta*, soit à une ou deux seulement de ces espèces.

Je crois, au surplus, que la plupart au moins des coléoptères parasites de ces Formicides acervicoles, communes dans nos environs, se trouvent probablement indifféremment avec les trois espèces.

nord de la combe Saint-Joseph ; montagne à droite de l'entrée de la Combe-aux-Serpents, au-delà des maisons. Talant, près de la Fontaine aux Fées. Plombières, coteau au nord du village ; et près de Neuvon entre le chemin de fer et le bois de Champlaran. Velars, coteau au nord de la forge. Lantenay, chemin de Plombières, près de la combe de Fain. Mâlain, coteau au nord de la gare. (Beaune ; dès le 10 mars. — M. *Bourlier*.)

Le mâle, qui n'a pas encore été signalé, à ma connaissance, se distingue de la femelle par ses antennes, dont les articles sont, à partir du 8<sup>e</sup>, plus larges que les précédents, et de plus les 8<sup>e</sup> à 10<sup>e</sup> moins courts ; tandis que chez la femelle les articles 2<sup>e</sup> à 10<sup>e</sup> sont à peu près égaux entre eux, en largeur et en longueur. Je ne l'ai trouvé que dans la proportion d'environ un cinquième.

CENTROTOMA. *De Heyden*.

2104. C. LUCIFUGA. *De Heyden*. Cet insecte, non encore signalé en France, est rare dans nos environs ; il se trouve comme le précédent sur les coteaux calcaires exposés au midi, sous les pierres, en société avec la même espèce de fourmi (*Myrmica cespitum*) ; cependant je ne l'ai pris jusqu'à présent qu'au bord des bois ou à peu de distance, et dans les bois mêmes lorsqu'ils sont très peu garnis, tandis que le *Chennium bituberculatum* se trouve indifféremment soit dans ces conditions, soit à de grandes distances des lieux boisés. De la fin de mars au commencement de mai, également lorsque la terre est humide. Plombières, combe de Neuvon, extrémité d'un petit embranchement dans la direction de Champmoron, et près du viaduc de Neuvon, entre le chemin de fer et le bois de Champlaran, au bord du chemin de Lantenay. Velars-sur-Ouche, coteau au nord de la forge. Lantenay, chemin de





Plombières, près de la combe de Fain. Mâlain, coteau au nord de la gare. (Beaune. — M. *Bourlier*.)

Le mâle, qui sans doute n'est pas connu, diffère de l'autre sexe par ses antennes s'élargissant peu à peu à partir du 8<sup>e</sup> article, les 8<sup>e</sup> à 10<sup>e</sup> articles graduellement moins courts, celui-ci pas plus large que long; (chez la femelle les articles 2<sup>e</sup> à 9<sup>e</sup> sont à peu près égaux entre eux en largeur et en longueur et tous beaucoup plus larges que longs; le 10<sup>e</sup> est moins court que les précédents, mais cependant encore près d'une fois plus large que long). Il ne se trouve que dans la proportion de un quart environ.

CTENISTES. *Reichenbach*.

2105. C. PALPALIS. *Reichenbach*. Je possède depuis longtemps un exemplaire de cette espèce pris dans les environs de Dijon, mais j'ignore où et dans quelles circonstances.

PSELAPHUS. *Herbst*.

2106. P. HEISEL. *Herbst*. Pas rare. Sous les pierres, les feuilles mortes, les détritrus, la mousse, surtout dans les endroits humides; quelquefois en fauchant. Février à novembre. Dijon, entre l'Ouche et la route de Plombières, à l'est du petit mur qui se trouve avant le moulin Vesson; chemin de Daix; mur au nord du clos de Pouilly et le long du ruisseau qui prend sa source dans ce clos. Gemeaux, bois de la Charme. Ahuy, bords de Suzon. Plombières, combe de Neuvon à Prenoix. Chenôve, au bord d'un petit fossé à l'angle nord-est du parc de Gouville. (Rouvray; sous les mousses aquatiques du ruisseau de la Motte au pré de l'étang du Marais; juin. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

2107. P. DRESDENSIS. *Herbst*. Un seul exemplaire pris à Beaune par M. *Bourlier*.



BRYAXIS. *Leach.*

2108. B. SANGUINEA. *F.* — Mâle LONGICORNIS. *Leach.* Commune. Sous les détritns et les pierres, surtout dans les endroits humides ; en fauchant, principalement le soir, dans les prés et les bois humides. Février à novembre. Dijon, derrière le mur du Parc, du côté de Longvic ; près de l'Ouche, à l'est du petit mur qui est avant le moulin Vesson ; mur au nord du clos de Pouilly. Plombières, combe de Neuvon à Darois. La Rochette près Oisilly. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. Gevrey, près du petit étang de Satenay. Chambolle, dans un jardin, au pied de sapins. (Rouvray.—M. *Emy.*) (Beaune.—MM. *Arias, Bourlier et André.*)

La variété LAMINATA. *Motsch.* n'est pas rare parmi les exemplaires du sexe mâle. (Beaune. — M. *Bourlier.*)

Le mâle est beaucoup moins commun que la femelle.

2109. B. FOSSULATA. *Reichenb.* Commune. Sous les pierres et les détritns, ordinairement dans les lieux humides, quelquefois cependant dans des endroits qui le sont peu ; en fauchant, surtout le soir, dans les prés humides ; le soir au vol au soleil couchant. Février à novembre. Dijon, au bord des chemins autour de la ville ; bords du Canal et de la fontaine de Larrey ; petit mur près du moulin Vesson ; mur au nord du clos de Pouilly. Plombières, combe de Neuvon. Ahuy, bord de Suzon. La Rochette près Oisilly. (Pontailler-sur-Saône ; mousses humides. — M. *Dudrumel.*) Collonges-les-Premières. Gevrey, près du petit étang de Satenay. (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*)

2110. B. XANTHOPTERA. *Reichenb.* Pas rare. J'ai trouvé cette espèce seulement à Longvic, dans le sable fin au bord de l'Ouche, en amont du village, dans le bras infé-





rieur de la rivière, en août et septembre, lorsque l'eau est basse.

2111. B. HÆMPTERA. *Aubé*. Un seul exemplaire trouvé à Gevrey, dans le bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, sous les détritits, le 27 août.

2112. B. LEFEBVREI. *Aubé*. Très commune. Sous les pierres et les détritits ; en fauchant dans les prés et au bord des ruisseaux, surtout le soir ; souvent au vol au coucher du soleil. Mars à novembre. Dijon, quelquefois dans la ville sur les murs à l'ombre, au printemps ; chemins autour de la ville ; bords de Suzon, du Canal et de la fontaine de Larrey ; derrière le mur du Parc, du côté de Longvic. Plombières, combes de Neuvo. Asnières, chemin de Dijon. Ahuy, bords de Suzon. La Rochette près Oisilly. Collonges-les-Premières. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Etc. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

2113. B. HÆMATICA. *Reichenb.* Commune. Sous les pierres et les détritits, surtout dans les endroits humides ; en fauchant le soir dans les prés. Mars à novembre. Dijon, petit mur près du moulin Vesson ; chemin de Daix ; route de Langres, sur une fleur de colza ; mur au nord du clos de Pouilly ; derrière le mur du Parc, du côté de Longvic ; (sur le sable au bord de l'Ouche, derrière le Parc. — M. *Nodot*.) Plombières, combes de Neuvo. La Rochette près Oisilly. Collonges-les-Premières. (Pontailler-sur-Saône ; sous les mousses humides. — M. *Dudrumel*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

La variété PERFORATA. *Aubé*. est beaucoup plus commune que le type.

2114. B. JUNCORUM. *Leach*. Pas rare. Dans les bois humides, en fauchant, principalement le soir. Mai à septembre. Plombières, combes de Neuvo. Collonges-les-Premières, près du grand étang. Fixin, bois près du chemin de fer. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux.

(Beaune. — Hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre; M. *Bourlier*. — M. *André*.)

2115. B. IMPRESSA. *Panz*. Peu commune. Dans les lieux très humides, au bord des étangs ou des cours d'eau, en fauchant, surtout le soir. Mai à juillet. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. La Rochette près Oisilly, dans les prés au bord de la Vingeanne. (Beaune. — Sous les pierres au bord de la Bouzaise; mars; M. *Bourlier*. — M. *André*.)

2116. B. ANTENNATA. *Aubé*. Pas très commune. Dans les bois humides et près des étangs, le soir en fauchant. Mai à juillet. Plombières, combe de Neuvon à Darois, près d'une petite source. Collonges-les-Premières, près du grand étang. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Beaune. — Sous les pierres au bord de la Bouzaise; mars; M. *Bourlier*. — M. *André*.)

TYCHUS. *Leach*.

2117. T. NIGER. *Payk*. Pas commun. Sous les pierres et le soir en fauchant, principalement dans les endroits humides. Février à novembre. Dijon, à l'est du petit mur qui est avant le moulin Vesson. Plombières, combes de Neuvon. Velars-sur-Ouche, coteau au-dessus de la forge et bois au-dessus de la petite combe qui est près de la gare. Ahuy, bords de Suzon. Gevrey, près du petit étang de Satenay. (Rouvray; rare. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *André*.)

La variété à élytres rouges est plus rare que le type; j'en ai pris notamment un exemplaire à Velars-sur-Ouche, le 2 avril, sur le coteau au-dessus de la forge, sous une pierre sous laquelle étaient (mais à quelque distance de l'insecte) des fourmis.





BYTHINUS. *Leach.*

2118. B. BULBIFER. *Reichenb.* — Femelle GLABRICOLLIS. *Aubé.* Commun. En fauchant, le soir surtout, et sous les détritrus, dans les prés et les bois humides, quelquefois sous les écorces humides. Avril à septembre. Plombières, combes de Neuvon. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray; sous les mousses aquatiques du ruisseau de la Motte à l'étang du Marais; juin. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

2119. B. CURTISII. *Leach.* Assez commun. Dans les lieux humides, surtout les bois, en fauchant, principalement le soir; quelquefois sous les écorces humides et sous les pierres. Mars à septembre. Velars-sur-Ouche, bois de la petite combe qui se trouve près de la gare. Plombières, combes de Neuvon et bois de l'autre côté du vallon de l'Ouche. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

2120. B. SECURIGER. *Reichenb.* Pas rare. Dans les endroits humides, sous les pierres et les détritrus, et en fauchant le soir. Février à août. Dijon, fontaine de Larrey; petit mur avant le moulin Vesson. Plombières, combes de Neuvon. Velars-sur-Ouche, bois au-dessus de la petite combe qui est près de la gare. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

2121. B. BURELLII. *Denny.* — LUNIGER. *Aubé.* Assez rare. Dans les lieux humides, en fauchant, surtout le soir. Mai à juillet. Plombières, combe de Neuvon à Darois. La Rochette près Oisilly. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Beaune. — M. *Bourlier.*)



TRIMIUM. *Aubé.*

2122. T. BREVICORNE. *Reichenb.* Je n'ai pris qu'un seul exemplaire de cet insecte ; je l'ai trouvé à Dijon sur les vitres d'un grenier dans lequel se trouvait du vieux bois à brûler provenant de la forêt de Mantuan, commune de Concoeur, le 1<sup>er</sup> juin.

EUPLECTUS. *Leach.*

2123. E. SIGNATUS. *Reichenb.* — KIRBYI. *Denny.* Pas rare. Sous les pierres qui se trouvent sur les places qui ont servi à déposer du fumier ; trouvé aussi dans un jardin, sur les couches à melons, sous des morceaux de tuile placés sous les melons. Fin mars à mai, octobre. Dijon, chemins de Daix et de la fontaine Sainte-Anne. Gêmeaux. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — Sous les pierres au bord de la Bouzaise ; mars ; hameau de Gigny, sous les meules de foin ; octobre ; M. *Bourlier.* — M. *André.*)

2124. E. SANGUINEUS. *Denny.* Peu commun. Sous les pierres qui se trouvent sur les places qui ont servi à déposer du fumier. Avril, mai. Dijon, chemins de Daix et de la fontaine Sainte-Anne. Velars-sur-Ouche, petite combe près de la gare, le soir en fauchant. (Beaune. — M. *Bourlier.*)

2125. E. KARSTENII. *Reichenb.* Rare. Sous les écorces d'arbres morts et sur le bois coupé. Mai, juin, octobre. Dijon, au Parc sous l'écorce d'un charme mort et sur du bois coupé empilé. L'Etang-Vergy, sous une écorce de noyer abattu.

2126. E. NANUS. *Aubé.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2127. E. AMBIGUUS. *Reichenb.* Assez commun. En fauchant le soir dans les endroits humides ; quelquefois le soir au





vol, au soleil couchant, sur les chemins. Avril à octobre. Dijon, chemin de Montchapet; chemin de Daix; etc. Vellars-sur-Ouche, petite combe près de la gare, dans le bois. Villenotte près Semur, bord du bois de Champeaux. Lamarche-sur-Saône, bord du petit étang qui se trouve au-dessus du grand étang de Saint-Léger. Collonges-les-Premières, bord du grand étang; commun. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Chambolle, dans la combe. (Beaune. — M. André.)

---

## CLAVIGERI.

---

CLAVIGER. *Preyssler.*

2128. C. TESTACEUS. *Preyssler.* — FOVEOLATUS. *Müll.* J'ai pris une seule fois cette espèce, au nombre de six exemplaires, le 29 avril, à Baume-la-Roche, au-dessus du coteau du bois de la Côte, du côté de Mâlain, dans une partie peu garnie de bois où se trouvent quelques sapins, sous des pierres assez enfoncées en terre, avec la *Formica aliena*, espèce à peine distincte de la *F. nigra*.

2129. C. LONGICORNIS. *Müll.* J'ai trouvé seulement quatre exemplaires de cet insecte à Plombières, combe de Neuvon, à l'extrémité d'un petit embranchement qui se trouve dans la direction de Champmoron, les 5 avril et 2 septembre, sous des pierres, en société avec la *Formica umbrata*.

Il est difficile de retrouver cet insecte dans la même fourmière; l'espèce de fourmi dont il est le parasite abandonne son habitation dès que la pierre lui servant d'abri a été soulevée pour la première fois, bien que cette pierre ait été replacée dans la même position.

## STAPHYLINI.

---

### MYRMEDONIA. *Erichs.*

2130. M. CANALICULATA. *F.* Commune. Sous les pierres, les feuilles mortes, la mousse du pied des arbres et les détritux; le plus souvent en société avec des fourmis ou dans le voisinage des fourmilières. Printemps, été, automne. Dijon, derrière le mur du Parc du côté de Longvic, sous les pierres; combe Saint-Joseph; etc. Plombières, combe de Neuvon, sous les feuilles mortes et en fauchant. Ancey, sous la mousse au pied d'un arbre près d'une fourmière. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, sous les détritux, principalement sur les souches d'aulne, avec la *Myrmica scabrinodis*. Etc. (Rouvray; commune. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

2131. M. LIMBATA. *Payk.* Un seul exemplaire trouvé par M. *Tarnier* dans les environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*)

2132. M. ROUGETI. *Fairm.* (1). J'ai pris seulement quatre exemplaires de cette espèce, dont trois à Dijon sur le coteau nord de la combe Saint-Joseph, réunis sous la paroi inférieure d'une pierre sous laquelle se trouvaient, mais à quelque distance, des *Formica erratica*, le 2 mai; et le quatrième à Velars-sur-Ouche, en fauchant par un temps couvert et orageux, sur l'herbe et les plantes, le long d'un fossé qui se trouve dans le bois près

---

(1) *Annales de la Société entomologique de France*, 3<sup>e</sup> série, t. VII (1859), bulletin p. CLXIV.





du bord des champs, à l'est de la ferme de Champ-Vichey, le 8 juin.

M. *Fairmaire*, dans sa phrase diagnostique, ne mentionne pas la couleur noire de la base des élytres, disposition qui existe chez les trois exemplaires que j'ai conservés, et qui, peut-être, ne se trouve pas sur l'exemplaire que je lui ai donné et sur lequel seul il a décrit cette espèce.

2133. M. FUNESTA. *Grav.* Rare. J'en ai trouvé un certain nombre d'exemplaires à Chambolle, dans le bois, sous la mousse du tronc d'un gros sorbier (*Pyrus sorbus*), en société avec des fourmis, le 11 novembre.

2134. M. COGNATA. *Mark.* Pas commune. Je l'ai prise au nombre de plusieurs exemplaires à Gevrey, le 27 août, sur le chemin de Saulon, au bord du ruisseau qui traverse ce chemin, dans le terreau au pied d'un saule creux, en société avec une fourmi noire, brillante (*F. fuliginosa*?). J'en ai trouvé également un exemplaire à Plombières, dans la combe de Neuvon (petit embranchement au sud-est de la ferme de Fays) en fauchant, le 8 juin. (Serrigny; bois de Lépenot, sur de vieilles souches couvertes de feuilles; mars. — M. *Bourlier*.)

2135. M. LATICOLLIS. *Mark.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2136. M. FULGIDA. *Grav.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2137. M. HAWORTHI. *Steph.* J'ai trouvé seulement deux exemplaires de cette espèce : l'un à Dijon, derrière le mur du Parc du côté de Longvic, sur une graminée, par une soirée très chaude, en été, et l'autre à Gevrey près du petit étang de Satenay, sous des détritrus sur une souche d'aulne, avec la *Myrmica scabrinodis*, le 22 avril.

2138. M. COLLARIS. *Payk.* Un seul exemplaire pris dans les environs de Beaune par M. *Bourlier*. (Rouvray; très rare. — M. *Emy*.)



AUTALIA. *Leach.*

2139. A. IMPRESSA. *Oliv.* Pas commune. Dans les champignons, dans les bois de la plaine; quelquefois en fauchant. Automne. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Fixin, bois près du chemin de fer, en mai. (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

FALAGRIA. *Leach.*


2140. F. SULCATA. *Payk.* Pas rare. Sous les pierres et les détritux, au vol le soir, surtout dans les endroits humides. Été. Dijon, au vol dans la ville et sur les murs humides; bords du Canal, au vol le soir; Vieux-Suzon, au vol le soir, et la journée sous des crottins. (Beaune. — Hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre; M. *Bourlier.* — M. *André.*)

2141. F. SULCATULA. *Grav.* Peu commune. Dans les lieux humides sous les détritux de végétaux. Printemps, été. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Beaune. — Hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre; M. *Bourlier.* — M. *André.*)

2142. F. THORACICA. *Curtis.* Rare. Endroits humides, en fauchant. Juin, juillet. Plombières, combe de Neuvoa à Darois. Gevrey, près du petit étang de Satenay.

2143. F. OBSCURA. *Grav.* Très commune. Sous les détritux et les pierres, surtout celles qui recouvrent du fumier ou des excréments; le soir au vol; etc. Printemps, automne. Dijon, fontaine de Larrey; chemins autour de la ville; trouvée contre le mur au nord de Montmuzard, sous un cadavre de crapaud. Plombières, combe de Neuvoa, sous des pierres et en fauchant. Gevrey, près du petit étang de Satenay. (Beaune. — M. *André.* — Hameau de Gigny, sous les meules de foin. Savigny, Fontaine-Froide, sous les écorces. M. *Bourlier.*)





2144. F. NIGRA. *Grav.* Pas commune. Environs de Dijon. (Beaune. — Hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre; M. *Bourlier*. — M. *Arias*.)

BOLITOCHARA. *Mann.*

2145. B. LUNULATA. *Payk.* — PULCHRA. *Lacord.* Pas commune. Dans les champignons, sous les écorces d'arbres morts sous lesquelles se développent des cryptogames, et en fauchant dans les bois humides. Juin à octobre. Dijon, au Parc, sous des écorces de charmes morts et abattus. Villenotte près Semur, bois de Champeaux, dans des lycoperdons. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, en fauchant. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *Bourlier*.)

2146. B. OBLIQUA. *Erichs.* — CINCTA. *Lacord.* (Rouvray. — M. *Emy*.)

2147. B. IMMACULATA... (1). (Rouvray. — M. *Emy*.)

CALODERA. *Mann.*

2148. C. NIGRICOLLIS. *Payk.* Je n'ai trouvé qu'un exemplaire de cette espèce, à Gevrey, sous les détritrus, le 20 mai. M. *Tarnier* en a pris un autre dans les environs de Dijon.

2149. C. PROPINQUA. *Aubé.* Un seul exemplaire pris par moi à Dijon le 30 mai 1856, sur le pont en bois entre les deux bras de l'Ouche, à l'Ile, lors de l'inondation qui eût lieu à cette époque, et au moment où l'eau atteignait sa plus grande hauteur.

2150. C. FORTICORNIS. *Lacord.* Deux exemplaires; trouvés.

---

(1) Je ne sais quel est cet insecte, qui bien certainement n'appartient pas au genre *Bolitochara* tel qu'il est actuellement limité.

je crois, à Gevrey, au bord du petit étang de Satenay, sous les détritns.

2151. *C. LONGITARSIS. Erichs.* Deux exemplaires : le premier trouvé à Dijon au bord du Canal, au-dessus de l'écluse de Larrey, le soir au vol, le 14 juin; je n'ai aucun souvenir de la capture du second. (Rouvray. — M. Emy.)

2152. *C. RUBICUNDA. Erichs.* J'ai trouvé une vingtaine d'exemplaires de cette espèce à Collonges-les-Premières, sur la boue humide d'une petite mare au-dessous du grand étang, et en fauchant le soir au bord de cet étang, en juillet.

2153. *C. UMBROSA. Erichs.* Pas commune. Au vol le soir au soleil couchant. Juillet. Dijon, bords du Canal; Vieux-Suzon; etc.

2154. *C. PICINA. Aubé.* Un seul exemplaire trouvé à Collonges-les-Premières, en fauchant le soir au bord du grand étang, le 10 juillet.

*TACHYUSA. Erichs.*

2155. *T. SCITULA. Erichs.* Saint-Léger, sur la boue au bord du ruisseau qui est entre le grand étang et la route; 1<sup>er</sup> juillet; trois exemplaires.

2156. *T. ATRA. Grav.* Un seul exemplaire. Fontaine-les-Dijon, chemin conduisant au chemin d'Ahuy, au-dessus de la ferme de Saint-Martin, le soir au vol, le 20 avril.

*PHLOEOPORA. Erichs.*

2157. *P. REPTANS. Grav.* Pas commune. Environs de Dijon. (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

2158. *P. CORTICALIS. Grav.* Pas rare. Sous les écorces d'arbres morts sur pied ou abattus. Printemps, automne. Dijon, au Parc, sous des écorces de charme. Velars-sur-Ouche, sous l'écorce d'une souche de chêne.





HYGRONOMA. *Erichs.*

2159. H. DIMIDIATA. *Grav.* Pas commune. Au bord des étangs, sous les détritrus. Printemps, été. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Collonges-les-Premières, bord du grand étang, en fauchant le soir.

HOMALOTA. *Mann.*

2160. H. GRAMINICOLA. *Grav.* (Beaune. — M. Arias.)

2161. H. UMBONATA. *Erichs.* Pas rare. Au vol le soir au soleil couchant, en fauchant et sous les détritrus dans les endroits humides. Mai, juin, juillet. Dijon, chemin entre celui de Fontaine et le Vieux-Suzon; Parc; etc. Lamarche-sur-Saône, dans le bois communal. La Rochette près Oisilly, en fauchant dans les prés. Collonges-les-Premières, sur la boue d'une petite mare, et en fauchant le soir près du grand étang. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay.

2162. H. RIGIDICORNIS. *Erichs.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2163. H. ELONGATULA. *Grav.* Commune. En fauchant dans les endroits humides, surtout les prés et les bois, et principalement au vol le soir au soleil couchant le long des chemins. Mai à juillet; quelquefois sur les murs des maisons, à l'ombre, au premier printemps. Dijon, dans la ville; chemins aux environs de Dijon, surtout ceux de Daix, d'Ahuy, de la Charmette; Vieux-Suzon; bords du Canal; fontaine de Larrey; etc. Plombières, combe de Neuvo à Darois. La Rochette près Oisilly. Collonges-les-Premières, en fauchant dans le bois et sur la boue humide d'une petite mare. Gevrey, près du petit étang de Satenay. (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

2164. H. LINEARIS. *Grav.* (Rouvray; rare. — M. Emy.)



2165. H. ANGUSTULA. *Gyll.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

2166. H. ARGANA. *Erichs.* — PLANATICOLLIS. *Aubé.* Commune. Sous les écorces d'arbres morts sur pied ou abattus. Printemps, automne. Dijon, au Parc sous les écorces humides de charme. Plombières, combe de Champmoron, sous l'écorce d'un noyer abattu, près du bois. Velars-sur-Ouche, chemin de Plombières, écorce de noyer abattu.

2167. H. CUSPIDATA. *Erichs.* Pas rare. Sous les écorces d'arbres morts, surtout lorsqu'ils sont abattus. Printemps, automne. Dijon, Parc, écorces humides de charmes morts abattus; commune. Plombières, combe de Neuvon, sous l'écorce d'un peuplier abattu; combe de Champmoron, écorce de cerisier abattu.

2168. H. CIRCELLARIS. *Grav.* Commune. Sous les détritux au bord des étangs. Été. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay.

2169. H. BRUNNEA. *F.* Pas rare. Dans les bois, en fauchant. Mai, juin, quelquefois en avril sous les feuilles mortes. Dijon, au Parc, au vol et sous les feuilles mortes, mais surtout en fauchant sur les fleurs d'*Anthriscus sylvestris*. Flavignerot. Plombières, combe de Neuvon. Velars-sur-Ouche, petite combe près de la gare. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux, dans des détritux au pied d'un arbre creux; septembre. (Rouvray. — M. *Emy.*)

2170. H. DEPRESSA. *Grav.* J'ai pris seulement deux exemplaires de cette espèce à Dijon, sur le chemin de Talant, près du clos Peignot, sur un mur où erraient quelques petites fourmis, le 16 mai.

2171. H. SERICANS. *Grav.* — SOCIALIS. *Payk.* Pas rare. Dans les champignons. Été, automne. Bois des environs de Dijon. Gevrey, bois de la plaine. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

2172. H. NIGRITULA. *Grav.* Commune. Dans les cham-

pignons. Été, automne. Bois des environs de Dijon. Plombières, bois de Neuvon. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Gevrey, bois de la plaine Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune. — M. André.)

2173. H. TRINOTATA. *Kraatz*. Pas rare. Egalement dans les champignons. Été, automne. Gevrey, bois de la plaine. Plombières, combe de Neuvon. Velars-sur-Ouche. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc.

2174. H. MUTATA. *Fairm.* Commune. Comme les précédentes. Été, automne. Collonges-les-Premières. Gevrey. Etc.

2175. H. OCHRACEA. *Erichs.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2176. H. DEPLANATA. *Grav.* — EUCERA. *Aubé.* Un seul exemplaire pris à Dijon, sur le chemin qui conduit au Vieux-Suzon, sous un cadavre de taupe, le 5 juillet.

2177. H. TALPA. *Hér.* Pas commune. En fauchant dans les bois. Mai, juillet. Dijon, sur les vitres d'une fenêtre à l'intérieur d'un appartement; fin septembre. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Collonges-les-Premières, bord du grand étang, le soir. (Beaune, sur les vitres d'une fenêtre; septembre. — M. Arias.)

2178. H. CLANGULA. *Erichs.* Un seul exemplaire, trouvé à la Rochette près Oisilly, en fauchant dans les prés au bord de la Vingeanne, le 12 mai.

2179. H. ANALIS. *Grav.* Commune. Au vol le soir au soleil couchant; en fauchant dans les bois et autres lieux humides, surtout le soir; sur la boue humide au bord de l'eau; etc. Depuis la fin de mai au commencement d'octobre. Dijon, chemin d'Ahuy, au vol près d'un fumier; Vieux-Suzon; bords du Canal; fontaine de Larrey; etc. Plombières, combes de Neuvon. Flavignerot, dans la combe. Collonges-les-Premières. Lamarche-sur-Saône. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. Villenotte près Semur, bord du bois de Champeaux. (Beaune. — M. Arias.)

2180. H. EXILIS. *Erichs.* Pas commune. Dans les endroits humides, en fauchant. Mai à juillet. La Rochette près Oisilly, près au bord de la Vingeanne. Collonges-les-Premières, bord du grand étang.

2181. H. INQUINULA. *Grav.* Deux exemplaires. Environs de Dijon.

2182. H. FLAVIPES. *Grav.* Pas rare. Dans les fourmilières de *Formica rufa*, dans les bois. Printemps, automne. Plombières, bois des environs de Neuvon. Velars-sur-Ouche. Mâlain. Ancey, bois de Roche-Aiguë. Fénay, bois de la Sainte-Chapelle.

2183. H. ANCEPS. *Erichs.* Assez commune. Dans les fourmilières de *Formica rufa* et *congerens*, dans les bois. Printemps, automne. Plombières, bois voisin du viaduc de Neuvon. Velars-sur-Ouche. Baume-la-Roche, bois des Brosses. Fénay, bois de la Sainte-Chapelle. Gevrey, bois de la plaine et bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, dans les parties les moins humides.

2184. H. LONGICORNIS. *Grav.* Pas commune. Dans les fumiers et les excréments et au vol le soir au soleil couchant sur les chemins. Été. Dijon, chemin entre celui de Fontaine et celui d'Ahuy; chemin de la Charmette.

2185. H. LIVIDIPENNIS. *Sahlb.* Commune. Dans les fumiers et les excréments de cheval, surtout au printemps et en automne; sous les pierres qui les recouvrent; au vol le soir; etc. Printemps, été. Dijon, chemins autour de la ville, quelquefois dans les rues mêmes le soir au vol lorsque le temps est orageux. (Beaune. — M. André.)

2186. H. FUNGI. *Grav.* Commune. Sur la boue humide au bord des mares, sous les détritiques et en fauchant dans les prés humides. Mai à septembre. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Collonges-les-Premières. La Rochette près Oisilly. (Beaune. — M. Bourlier.)

2187. H. VERNACULA. *Erichs.* Pas commune. J'en possède trois exemplaires provenant des environs de Dijon,





dont l'un pris à Plombières dans la combe de Neuvon à Darois, en fauchant, le 3 août; je n'ai aucun renseignement sur les deux autres.

2188. *H. ORPHANA*. *Erichs.* (Beaune. — M. *Arias*.)

2189. *H. MUTATA*. *Fairm.* — CONFORMIS. *Muls.* Commune. Dans les champignons. Été, automne. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Gevrey, bois de la plaine.

2190. *H. OBFUSCATA*. *Grav.* — ATERRIMA. *Erichs.* Pas commune. Trouvée à Daix, sur le chemin de traverse qui conduit à Dijon, en automne, sous des pierres recouvrant un espace où se trouvait un fumier quelque temps auparavant. (Beaune. — M. *Arias*.)

2191. *H. ANGUSTATA*. *Sahlb.* (Beaune. — M. *André*.)

LEPTUSA. *Kraatz.*

2192. *L. RUFICOLLIS*. *Erichs.* — RUBRICOLLIS. *Héer.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

OXYPODA. *Mamm.*

2193. *O. LUTEIPENNIS*. *Erichs.* Commune. Dans les excréments de cheval et de vache, et au vol le soir au soleil couchant. Printemps, automne. Dijon, dans la ville au vol et sur les murs, surtout au mois de mai; chemins autour de la ville. (Pontailler. — M. *Dudrumel*.) La Rochette près Oisilly, en fauchant dans les prés.

2194. *O. VITTATA*. *Mark.* (Rouvray. — M. *Emy*.)

2195. *O. OPACA*. *Grav.* J'ai trouvé un exemplaire de cette espèce à Gevrey, dans le bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, sous les détritiques, le 7 juin; et un autre à Velars-sur-Ouche, sous un champignon, à la fin d'octobre. (Rouvray. — M. *Emy*.)

2196. *O. ALTERNANS*. *Grav.* Pas commune. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias* et *André*.)



2197. O. BICOLOR. *Muls.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2198. O. MYRMECOPHILA. *Mark.* Commune. Dans les fourmilières de *F. rufa*, *congerens* et *exsecta*, surtout dans les bois. Printemps, automne. Dijon, chemin de la ferme de Giron. Plombières, bois des environs de Neuvon. Velars-sur-Ouche. Fénay, bois de la Sainte-Chapelle. Fixey, au-dessus de la montagne, dans une plantation de sapins.

2199. O. CURTULA. *Erichs.* J'ai trouvé plusieurs exemplaires de cette espèce à Dijon, au Parc, sous des écorces de charmes morts sur pied et abattus, ainsi que sur du vieux bois mort et empilé, du 7 mai au 28 juin, et au commencement d'octobre.

Le mâle, indépendamment du petit tubercule qui existe à la base des élytres près de l'écusson, présente un tubercule oblong à l'extrémité du 5<sup>e</sup> segment abdominal et un autre à la base du 6<sup>e</sup>.

#### ALEOCHARA. *Grav.*

2200. A. FUSCIPES. *F.* Commune. Sous les cadavres de petits animaux et dans les champignons en décomposition. Printemps, été, automne. Dijon, autour de la ville, quelquefois dans la ville même dans les latrines. Environs de Dijon, dans les champignons décomposés dans les bois. Longchamps. Collonges-les-Premières. Gevrey. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier.*)

2201. A. RUFIPENNIS. *Erichs.* — LÆVIGATA. *Lacord.* Pas rare, sous les cadavres de petits animaux, surtout dans les endroits humides. Printemps, été. Dijon, Vieux-Suzon, etc. Fixin, bois de la plaine. (Rouvray. — M. *Emy.*)

2202. A. TRISTIS. *Grav.* Pas rare. Dans les cadavres de petits animaux et en fauchant dans les bois. Été. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Fixin, bois de la

plaine. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

2203. A. BIPUNCTATA. *Grav.* Un exemplaire trouvé à Dijon, sur un chemin du côté de Fontaine, dans un crottin de cheval, le 13 juin.

2204. A. BREVIPENNIS. *Grav.* — CARNIVORA. *Gyll.* Pas commune. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, sous les détritrus au pied des souches. Mai. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. Arias.)

2205. A. BISIGNATA. *Erichs.* Un exemplaire pris le soir au vol, à Dijon, sur le chemin du Vieux-Suzon, le 5 juillet.

2206. A. NITIDA. *Grav.* Un exemplaire. Environs de Dijon.

2207. A. SPARSA. *Héer.* Pas commune. Environs de Dijon. Un exemplaire à Talant, vers la route de Plombières, sur la montagne, sous une pierre, en janvier.

2208. A. MYCETOPHAGA. *Kraatz.* J'ai trouvé quelques exemplaires de cette espèce à Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans des champignons, dans la forêt de Cîteaux, le 23 septembre.

2209. A. LANUGINOSA. *Grav.* (Rouvray. — M. Emy.)

2210. A. MÖERENS. *Gyll.* (Rouvray. — M. Emy.)

2211. A. MOESTA. *Grav.* — FUMATA. *Gyll.* Un exemplaire. Environs de Dijon.

2212. A. GENTILIS. *Mark.* J'ai trouvé plusieurs exemplaires de cette espèce à Dijon, au Parc, dans les détritrus au pied d'un charme creux, en société avec la *Formica fuliginosa*, le 22 septembre.

2213. A. MORION. *Grav.* Pas commune. Environs de Dijon.

2214. A. ANGULATA. *Erichs.* Commune. Dans les fourmières de *Formica rufa* et *congerens*, dans les bois. Printemps, automne. Plombières, bois des environs de Neuvon. Velars-sur-Ouche. Baume-la-Roche, bois des Brosses.



Fénay, bois de la Sainte-Chapelle. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, dans les parties peu humides.

OLIGOTA. *Mann.*

2215. O. PUSILLIMA. *Grav.* Pas rare. Sous les écorces d'arbres morts, sous les pierres et dans les fourmilières de *Formica rufa*. Printemps, automne. Dijon, au Parc, sous des écorces de charmes morts sur pied; chemin de Daix, sous les pierres au bas d'une haie. Plombières, bois de Neuvon, dans les fourmilières. Velars-sur-Ouche. (Beaune; hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre. — M. *Bourlier*.)

2216. O. SUBTILIS. *Erichs.* Commune. Sous les écorces d'arbres morts. Dijon, au Parc, l'hiver et l'automne, sous les écorces de charmes morts et abattus. (Beaune; sous les pierres au bord de la Bouzaise; mars. — M. *Bourlier*.)

2217. O. FLAVICORNIS. *Erichs.* Pas commune. Lieux humides. Dijon, fontaine de Larrey, le soir, en fauchant sur les graminées au bord du ruisseau; juin.

GYROPHÆNA. *Mann.*

2218. G. COMPLICANS. *Westw.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2219. G. EXIGUA. *Hér.* — HOMALOTA NOTHA. *Erichs.* J'ai pris un seul exemplaire mâle de cette espèce, à Plombières, combe de Neuvon à Prenois, entre le grand chemin et la fontaine, dans un bolet croissant sur une souche d'arbre coupé, le 3 mai.

2220. G. NANA. *Payk.* Pas rare. Dans les champignons, dans les bois de la plaine. Août, septembre. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

2221. G. AFFINIS. *Sahlb.* — AMABILIS. *Lacord.* Assez commune. Dans les champignons, dans les bois, quelquefois en fauchant dans les bois ombreux et humides. Juin à août. Dijon, au Parc dans des bolets sur un orme abattu. Plombières, combes de Neuvon. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

2222. G. PULCHELLA. *Hér.* Pas commune. Dans les champignons, dans les bois. Automne. Velars-sur-Ouche. Bourberain, forêt de Velours. Chambolle.

2223. G. LUCIDULA. *Erichs.* (Beaune. — M. *Bourlier.*)

2224. G. STRICTULA. *Erichs.* Un seul exemplaire trouvé à Plombières, dans la combe de Neuvon à Prenoix, entre le grand chemin et la fontaine, dans un bolet croissant sur une souche d'arbre coupé, le 3 mai.

2225. G. MINIMA. *Erichs.* Rare. Dans les champignons, dans les bois de la plaine. Juin, septembre. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux.

EURYUSA. *Erichs.*

2226. E. ACUMINATA. *Mark.* M. *Dudrumel* et moi avons pris ensemble chacun un exemplaire de cette espèce à Dijon, au bas du mur au nord du clos de Pouilly, le 15 avril, en secouant sur un linge blanc des feuilles tombées. M. *Tarnier* en a trouvé trois exemplaires à Plombières, à la fin du même mois, sous des pierres, en société avec des fourmis.

J'avais considéré précédemment, à tort, cette espèce comme la *E. sinuata*; et, par suite de mes indications, celle-ci figure dans la *Faune entomologique française* comme trouvée aux environs de Dijon, au lieu de l'*E. acuminata*.

2227. E. LINEARIS. *Mark.* J'ai pris deux exemplaires de

cet insecte dans les environs de Dijon ; mais je n'ai plus aucun souvenir et ne possède aucune note sur cette capture.

DINARDA. *Leach.*

2228. D. DENTATA. *Grav.* Commune. Sous les pierres, en société avec la *Formica sanguinea* (1). Mars, avril, mai, septembre, octobre. Dijon, au bord des chemins autour de la ville, surtout sur ceux qui sont entre le chemin d'Ahuy et celui de Fontaine, ceux de Daix, de Corcelles-Monts, et près de la montagne de Sainte-Anne. Flavignerot, dans la combe. Plombières. Velars-sur-Ouche. Lantenay, près de la combe de Fain. Baume-la-Roche.

2229. D. MARKELII. *Kiesenw.* J'ai trouvé cette espèce, dont la validité est fort contestée, avec raison je crois, sous des pierres recouvrant des fourmilières de *Formica congerens* ; je ne l'ai jamais prise au tamis. Elle se trouve, peu communément, à Dijon, au bord des chemins entre ceux de Fontaine et d'Ahuy, en mars et avril.

LOMECHUSA. *Grav.*

2230. L. STRUMOSA. *F.* Cette espèce n'est pas rare à Flavignerot, dans la combe, sous les pierres, en société avec la *Formica sanguinea*, à la fin d'avril et dans les premiers jours de mai ; je l'ai trouvée aussi sur le coteau à l'est de la combe, et à Gevrey à l'extrémité de la combe près des champs de Chambœuf. (Beaune. — M. Bourlier.)

2231. L. PARADOXA. *Grav.* Rare. Ordinairement sous les pierres, en société avec une des espèces suivantes du genre *Myrmica*, confondues autrefois sous le nom de *ru-*

---

(1) On trouve souvent, en assez grand nombre, avec cette espèce de *Formica*, des ouvrières de *F. fusca* et *cunicularia* réduites à l'esclavage par la *F. sanguinea*.





*bra* : *M. lævinodis*, *ruginodis* ou *scabrinodis*, de *Nylander*. Fin avril, mai, septembre, octobre. Dijon, au bas du petit mur près du moulin Vesson; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite; dans la ville, sur un mur près d'un urinoir, en août. (Gevrey, dans la combe, sous une pierre.— *M. Dudrumel*.) (Rouvray. — *M. Emy*.)

2232. *L. EMARGINATA*. *Payk*. Je fais figurer ici cette espèce d'après un exemplaire contenu dans une bouteille renfermant des coléoptères pris par *M. J. Saintpère* (1).

*SILUSA. Erichs.*

2233. *S. RUBIGINOSA. Erichs.* Je possède plusieurs exemplaires de cette espèce trouvés par moi dans les environs de Dijon. Je crois les avoir pris au Parc sous des écorces d'arbres morts, mais je suis loin d'en avoir la certitude.

*PRONOMÆA. Erichs.*

2234. *P. ROSTRATA. Erichs.* Commune. Dans les lieux humides en fauchant et le soir au vol au soleil couchant. Mai à juillet. Dijon, quelquefois dans la ville, sur les murs à l'ombre; fontaine de Larrey; Vieux-Suzon. Plombières, combe de Neuvo à Darois.

*MYLLÆNA. Erichs.*

2235. *M. DUBIA. Grav.* Pas rare. En fauchant le soir au bord des étangs. Mai, juin, juillet. Collonges-les-Pre-mières, bord du grand étang.

2236. *M. INTERMEDIA. Erichs.* Pas rare. Dans le sable

---

(1) Voyez *Phytonomus fasciculatus*, n° 1359.

humide au bord de l'eau. Octobre. Longvic, bords de l'Ouche du côté de Dijon, au moment des basses eaux.

2237. M. MINUTA. *Grav.* J'ai pris trois exemplaires de cette espèce à Collonges-les-Premières, en fauchant le soir au bord du grand étang, le 10 juillet.

DEINOPSIS. *Matthews.* — GYMNUSA. *Karsten.*

2238. D. FUSCATUS. *Matthews.* — LATIGOLLIS. *Erichs.* Je possède quatre exemplaires de cet insecte, pris par moi à Collonges-les-Premières, en fauchant le soir au bord du grand étang, les 26 juin et 12 juillet.

HYPOCYPTUS. *Schüpp.*

2239. H. LONGICORNIS. *Payk.* — GRANULUM. *Grav.* — GLOBULUS. *Lacord.* Pas rare. Sous les écorces humides et basses, et en fauchant dans les endroits humides. Fin avril à septembre. Dijon, au Parc. Fontaine-les-Dijon, chemin conduisant au chemin d'Ahuy, au-dessus de la ferme de Saint-Martin, le soir au vol. Plombières, combe de Neuvon. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. La Rochette près Oisilly. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — Hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre; M. *Bourlier.* — M. *André.*)

2240. H. SEMINULUM. *Erichs.* Quatre exemplaires, dont un pris à Plombières, dans la combe de Neuvon à Pre-nois, le 6 juillet. Je n'ai aucune note sur la capture des autres.

CONURUS. *Steph.* — TACHYPORUS. *Grav.*

2241. C. LITTOREUS. *Linn.* Rare. Sous les détritux humides, sous les ételles humides, etc., dans les bois. Juin. Fixin, bois de la plaine. (Beaune. — M. *André.*)







2242. C. PUBESCENS. *Grav.* Peu commun. Sous les pierres, les écorces humides et basses, les détritits, et en fauchant dans les lieux humides. A peu près toute l'année. Dijon, au Parc; chemin de Daix. Velars-sur-Ouche, sous les mousses au pied des chênes dans le bois. Gevrey, bois de la plaine. (Beaune. — M. André.)

2243. C. FUSCULUS. *Grav.* Rare. Sous les détritits et en fauchant dans les endroits humides. Mai, juin. Dijon, trouvé sur le pont du Canal, en amont du bassin. Fixin, bois de la plaine. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Beaune. — M. Bourlier.)

2244. C. LIVIDUS. *Erichs.* (Beaune. — M. André.)

2245. C. BIPUNCTATUS. *Grav.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

TACHYPORUS. *Grav.*

2246. T. OBTUSUS. *Linn.* — ANALIS. *Grav.* Pas rare. Sous les feuilles mortes, les mousses et les détritits dans les endroits humides; quelquefois en fauchant et au vol le soir. Avril à septembre. Dijon, mur au nord du clos de Pouilly et dans le pré qui est au-dessous; Vieux-Suzon; Parc. La Rochette près Oisilly. Collonges-les-Premières. Villenotte près Semur, bord du bois de Champeaux. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. Emy.)

2247. T. FORMOSUS. *Matthews.* — RUFUS. *Erichs.* Commun. Comme le précédent, aux mêmes époques et dans la plupart des localités indiquées pour cette espèce; trouvé de plus à Marsannay-la-Côte, bois de Gouville. Plombières, combes de Neuvon, où je l'ai pris une fois entre les enveloppes des graines d'astragale. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. André.)

2248. T. HYPNORUM. *F.* — MARGINATUS. *Grav.* Commun. Dans les lieux humides ou ombragés, sous les feuilles

mortes, les mousses, les détritns, les écorces, etc.; en fauchant dans les bois. Avril à octobre. Dijon, Parc; mur au nord du clos de Pouilly. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Velars-sur-Ouche, dans une fourmilière de *F. exsecta*. Villenotte près Semur, bord du bois de Champeaux. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

2249. T. CHRYSOMELINUS. Linn. Pas rare. Dans les lieux humides, sous les détritns ou les écorces. Printemps, automne. Dijon, Parc; etc. (Beaune. — MM. Bourlier et André.) (Savigny près Beaune. — M. Bourlier.)

2250. T. SOLUTUS. Erichs. Pas commun. Sous les détritns au bord des étangs. Été. Gevrey, bord du petit étang de Satenay, dans le bois d'aulnes.

2251. T. RUFICOLLIS. Grav. (Beaune. — M. André.)

2252. T. SCITULUS. Erichs. Pas rare. Lieux humides, surtout dans le voisinage de l'eau. Printemps. Dijon, mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles mortes; Parc, écorces d'arbres près de terre.

2253. T. TRANSVERSALIS. Grav. Un seul exemplaire trouvé à Plombières dans la combe de Neuvon à Darois, le 27 juin, en fauchant.

2254. T. BRUNNEUS. F. Commun. Dans les endroits humides, sous les pierres; le soir au vol et en fauchant, etc. Avril à octobre. Dijon, chemin de Daix; chemin de Mirande, près de Champmaillot; bord du Canal. Collonges-les-Premières. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Velars-sur-Ouche, petite combe près de la gare. Villenotte près Semur, bord du bois de Champeaux. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — Hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre; M. Bourlier. — MM. Arias et André.)





HABROCERUS. *Erichs.*

2255. H. CAPILLARICORNIS. *Grav.* Pas commun. Dans les bois humides, sous les feuilles mortes, les ételles, etc. Été. Fixin, bois près du chemin de fer. Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, forêt de Cîteaux.

TACHINUS. *Grav.*

2256. T. SILPHOIDES. *Linn.* Pas commun. Au vol près des fumiers, sous les pierres placées sur les fumiers. Été, automne. Dijon, dans la ville sur les murs des écuries; chemins autour de la ville; barrière au-dessus de la gare; etc.

2257. T. RUFIPES. *De Géer.* Pas rare. Sous les détritrus dans les endroits humides. Mai à juillet; septembre. Plombières, combe de Neuvo à Darois, en fauchant et sous des excréments de renard. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*) (Savigny près Beaune, Fontaine-Froide, sous un champignon; octobre. — M. *Bourlier.*)

2258. T. FLAVIPES. *F.* Pas commun. Environs de Dijon.

2259. T. HUMERALIS. *Grav.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias et André.*)

2260. T. SUBTERRANEUS. *Linn.* Pas rare. Sous les écorces humides et les détritrus. Automne, hiver. Dijon, Parc; etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *André.*)

2261. T. BIPUSTULATUS. *F.* Pas commun. Dans les végétaux en décomposition. Printemps, été. Talant, dans des raves pourries, près du clos Echalié. (Beaune. — M. *André.*)

2262. T. PALLIPES. *Grav.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

TRICHOPHYUS. *Erichs.* — TRICHOPHYA. *Mann.*

2263. T. PILLICORNIS. *Gyll.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

BOLETOBIUS. *Leach.*

2264. B. ANALIS. *Payk.* — DAHLII. *Dej.* Deux exemplaires; dont un trouvé à Dijon, le 6 avril, sur le chemin de Daix, sous une pierre au bas d'une haie. J'ignore absolument les circonstances dans lesquelles j'ai pris le second.

2265. B. CINGULATUS. *Mann.* Un seul exemplaire pris par moi dans les environs de Dijon; mais il ne me reste nul souvenir relatif à cette capture.

2266. B. INCLINANS. *Grav.* Un seul exemplaire trouvé à Plombières sur le viaduc de Neuvon, à l'ombre, le 23 octobre.

2267. B. CERNUEUS. *Knoch.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

2268. B. RUFUS. *Fisch.* (Beaune. — M. *Arias.*)

2269. B. STRIATUS. *Oliv.* (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Arias.*)

2270. B. ATRICAPILLUS. *F.* Commun. Dans les champignons dans les bois, surtout près de la tige. Automne. Bois des environs de Dijon, principalement ceux de la plaine. Velars-sur-Ouche. Fixin. Gevrey. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. Etc. (Rouvray; très commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

2271. B. TRIMACULATUS. *F.* (Rouvray; rare. — M. *Emy.*)

2272. B. TRINOTATUS. *Erichs.* (Beaune. — M. *Arias.*)

2273. B. EXOLETUS. *Erichs.* Pas rare. Dans les bois, surtout ceux qui sont humides, dans les champignons ou les agarics; quelquefois en fauchant le soir. Été, automne. Plombières, combe de Neuvon. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

2274. B. PYGMÆUS. *F.* Commun. Dans les bois humides, dans les champignons et les agaries; trouvé aussi en fauchant. Printemps, été, automne. Plombières, combe de Neuvon. Velars-sur-Ouche. Saint-Nicolas-les-Cîteaux. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Arias.*)

MYCETOPORUS. *Mann.*

2275. M. SPLENDENS. *Marsh.* Rare. Environs de Dijon. Lantenay, sous une pierre; avril.

2276. M. LONGULUS. *Mann.* — RUFESCENS. *Dej.* Pas commun. Dans les bois humides, en fauchant, surtout le soir. Fin mai, juin. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Velars-sur-Ouche, petite combe près de la gare. Collonges-les-Premières. (Rouvray. — M. *Emy.*)

J'ai signalé par erreur cette espèce à M. *Fairmaire* sous le nom de *Lepidus*; et, par suite, cette dernière espèce est indiquée dans la *Faune entomologique française* de cet auteur, comme se trouvant aux environs de Dijon.

2277. M. PRONUS. *Erichs.* Pas commun. Dans les bois humides, en fauchant le soir; trouvé aussi au bord de l'eau le soir au vol dans un endroit non boisé. Été. Dijon, bord du Canal. Plombières, combe de Neuvon à Darois. (Beaune. — M. *Arias.*)

2278. M. SPLENDIDUS. *Grav.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*)

OTHIUS. *Leach.*

2279. O. FULVIPENNIS. *Erichs.* — FULMINANS. *Grav.* Rare. Sous les pierres dans les bois. Automne. Plombières, sur le viaduc de Neuvon. Velars-sur-Ouche, petite combe près de la gare. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune; un exemplaire. — M. *Arias.*)

2280. O. MELANOCEPHALUS. *Grav.* (Rouvray. — M. *Emy.*)



2281. *O. PUNCTIPENNIS*. *Lacord.* Pas commun. En fauchant dans les bois. Automne. Plombières, sur le viaduc de Neuvon. Villenotte, bois de Champeaux. (Rouvray. — M. *Emy.*)

2282. *O. PILICORNIS*. *Payk.* Variété *ALTERNANS*. *Grav.* (Rouvray; très rare. — M. *Emy.*)

*XANTHOLINUS*. *Dahl.*

2283. *X. FULGIDUS*. *F.* — *PYROPTERUS*. *Grav.* Rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

2284. *X. GLABRATUS*. *Grav.* — *FULGIDUS*. *Grav.* Rare. Environs de Dijon.

2285. *X. ELEGANS*. *Oliv.* — *MERIDIONALIS*. *Dej.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

2286. *X. GLABER*. *Nordm.* Trois exemplaires trouvés à Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux, dans les détritits au pied d'un arbre creux, le 23 septembre.

2287. *X. PUNCTULATUS*. *Payk.* — *ELONGATUS*. *Grav.* Commun. Sous les pierres, les mousses, les feuilles mortes, surtout dans les endroits humides; dans les bouses et le fumier; quelquefois dans les fourmilières de *Formica rufa*; trouvé aussi sur les murs à l'ombre. Mars à octobre. Dijon, fontaine au bas de l'Asile des aliénés; sur le viaduc qui traverse le chemin de fer avant la gare; bord du Canal du côté de Plombières; chemin de la route de Morvau. Plombières, combe de Neuvon, fourmilières. (Pontailler. — M. *Dudrumel.*) (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

2288. *X. TRICOLOR*. *F.* — *ELEGANS*. *F.* Rare. Sous les pierres dans les endroits humides. Printemps. Dijon, au bas du petit mur près du moulin Vesson. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

2289. *X. LINEARIS*. *Oliv.* — *LONGICEPS*. *Grav.* Assez com-





mun. Dans les lieux humides, sous les pierres, les détritus, les feuilles mortes, et en fauchant surtout le soir. Mai à novembre. Dijon, bord du ruisseau qui sort du clos de Pouilly, près la rente d'Épirey; barrière du chemin de fer de Besançon entre le Canal et l'Ouche. Talant, bord de la mare à l'ouest du village. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

LEPTACINUS. Erichs. — XANTHOLINUS. Dahl.

2290. L. PARUMPUNCTATUS. Gyll. — SUBIMPRESSUS. Dej. Rare. Sous les pierres, principalement celles qui se trouvent sur des endroits qui ont servi à déposer du fumier; sous les détritus humides. Printemps, été. Dijon, chemin de Daix. Fontaine, chemin à l'ouest du village. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune; hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre. — M. Bourlier.)

2291. L. BATYCHRUS. Gyll. — MINUTUS. Lacord. Un seul exemplaire trouvé à Dijon, au Vieux-Suzon, dans un crotin, le 22 juin. (Rouvray. — M. Emy.)

2292. L. NOTHUS. Erichs. (Serrigny, bois de Lépenot, dans un champignon; septembre; un exemplaire. — M. Arias.)

2293. L. FORMICETORUM. Mark. Assez commun. Dans les bois, dans les fourmilières de *Formica rufa*. Avril, septembre, octobre. Plombières, bois des environs de Neu-von. Velars-sur-Ouche. Fénay, bois de la Sainte-Chapelle. Gevrey, bois d'aulnes au-dessus du petit étang de Satenay, près de la voie romaine.

STAPHYLINUS. Linn. — EMUS. Leach.

2294. S. HIRTUS. Linn. Pas rare. Dans les bouses desséchées, sur les montagnes où l'on fait paître les vaches;

trouvé aussi sous des excréments de mouton. Avril à juin; quelquefois même dès la fin de mars. Dijon, montagne au-dessus de la fontaine Sainte-Anne. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées. (Fixin. — M. Tarnier.) Chambolle. Etc. (Rouvray; assez rare. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

2295. *S. MAXILLOSUS*. Linn. Commun. Sous les cadavres de petits animaux. Printemps, été, automne. Dijon, à peu près partout autour de la ville; Combe-aux-Serpents. Plombières. Chambolle. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

2296. *S. NEBULOSUS*. F. Pas très commun. Sous les bouses desséchées, les cadavres, les végétaux en décomposition, par terre, etc. Printemps, été. Dijon, chemins autour de la ville; cours du Parc. Talant, près du clos Echalié, sous des raves en décomposition. Chambolle. (Rouvray; très rare. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

2297. *S. MURINUS*. Linn. Commun. Sous les bouses desséchées, les cadavres et les végétaux en décomposition, quelquefois courant par terre. Printemps, été, automne. Dijon, dans les lieux où paissent des vaches; trouvé une fois par terre près du jet d'eau de la porte Saint-Pierre. Talant, près du clos Echalié, sous des raves pourries. (Fixin. — M. Tarnier.) Chambolle. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

2298. *S. PUBESCENS*. De Gêr. Pas commun. Dans les bois sous les cadavres, les excréments de renard, par terre et en fauchant. Printemps, été. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Chambolle. (Beaune. — M. André.)

2299. *S. FOSSOR*. Scopoli. Pas rare. Sous les pierres et la mousse dans les bois de montagne, surtout dans les combes. Avril, mai. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot. Marsannay-la-Côte. Fixin. Gevrey. (Rouvray; assez rare. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias et André.)





2300. *S. ERYTHROPTERUS*. *Linn.* — *FLAVICORNIS*. *Dej.* Un exemplaire trouvé à Collonges-les-Premières, sous les détritus au bord du grand étang, le 17 mai. (Rouvray; commun. — M. *Emy.*) (1).

2301. *S. CÆSAREUS*. *Cederh.* — *ERYTHROPTERUS*. *F.* Assez commun. Par terre et sous les pierres, dans les champs et sur les chemins. Printemps, été, automne. Dijon, chemins de Fontaine, Daix, etc. Plombières. Collonges-les-Premières, en fauchant dans le bois. (Fixin. — M. *Tarnier.*) (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier.*)

2302. *S. STERCORARIUS*. *Oliv.* Sous les bouses, les cadavres de petits animaux et les pierres, surtout sur les montagnes; en fauchant dans les bois. Printemps, été, automne. Dijon, au nord de Montmuzard Plombières, montagne près de Neuvon. Marsannay-la-Côte. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

2303. *S. LUTARIUS*. *Grav.* J'ai trouvé un seul exemplaire de cette espèce à Plombières, dans une des petites combes qui sont au midi du vallon de l'Ouche, sous un cadavre de taupe, le 12 septembre.

2304. *S. CHALCOCEPHALUS*. *F.* — *CARINTHIACUS*. *Lacord.* Rare. Dans les bois, en fauchant. Printemps. Flavignerot, dans la combe. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Arnay-le-Duc. — M. *Bourlier.*)

2305. *S. LATEBRICOLA*. *Grav.* Rare. Cet insecte est indiqué par les auteurs comme se trouvant en société avec la *Formica rufa*; je l'ai pris dans les bois, en fauchant ou sous les pierres, peut-être dans le voisinage des fourmilières, qui sont peu rares dans les localités où j'ai trouvé cette espèce; mais j'avoue n'avoir pas noté cette circonstance. Mai, juin, Plombières, combe de Neuvon à Darois.

---

(1) L'indication de M. *Emy* se rapporte sans doute à l'espèce suivante.



Velars, sur la lisière du bois à l'est des champs de la ferme de Champ-Vichey. Flavignerot, dans la combe.

OCYPUS. Kirby. — EMUS. Leach.

2306. O. OLENS. Müll. Commun. Sous les pierres ou cou-  
rant par terre, au bord des chemins et dans les champs.  
Printemps, automne; plus rarement en été. Dijon, par-  
tout autour de la ville. Villenotte près Semur. (Rouvray.  
— M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

La larve de cet insecte n'est pas rare au premier prin-  
temps et à la fin de l'hiver, sous les pierres.

2307. O. CYANEUS. Payk. Pas rare. Sous les pierres au  
bord des chemins. Printemps. Dijon, voie romaine près de  
la ferme de Romelet. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées.  
(Fixin. — M. Tarnier.) (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. —  
MM. Arias, Bourlier et André.) (Laroche-pot. — M. Bourlier.)

2308. O. SIMILIS. F. Peu commun. Sous les pierres et  
les détritux, surtout dans les lieux humides. Printemps.  
Dijon, chemin de Daix. Gevrey, bois d'aulnes près du petit  
étang de Satenay. (Rouvray. — M. Emy.)

2309. O. MASCULUS. Nordm. (Rouvray; très rare. —  
M. Emy.)

2310. O. ÆTHIOPS. Waltl. Indiqué dans la *Faune ento-  
mologique française* comme trouvé à Rouvray par M. Emy.

2311. O. BRUNNIPES. F. (Rouvray; assez rare. — M. Emy.)  
(Beaune. — M. Bourlier.)

2312. O. FUSCATUS. Grav. (Rouvray; assez rare. —  
M. Emy.)

2313. O. PICIPENNIS. F. — ÆNEOCEPHALUS. F. Assez  
commun. Sous les pierres, dans les parties incultes des  
montagnes ou les coteaux peu boisés. Printemps, automne;  
quelquefois même l'hiver. Dijon, montagne à l'ouest de la  
Combe-aux-Serpents. Talant, coteaux près du chemin de  
fer. Plombières, coteau à gauche du viaduc de Neuvo.





Velars-sur-Ouche, coteau au-dessus du chemin de fer près de la gare. (Rouvray, sous les pierres des vieux chemins. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias et Bourlier.)

2314. O. CUPREUS. *Rossi*. — *ÆNEOCEPHALUS*. *De Gêr*. (Rouvray; pas rare. — M. Emy.)

2315. O. FULVIPENNIS. *Erichs*. Peu commun. Sous les pierres ou courant par terre. Printemps. Dijon, cours du Parc; chemin de Daix. (Beaune. — M. Bourlier.)

2316. O. PEDATOR. *Grav*. — RUFIPES. *Latr*. (Environs de Dijon. — M. Tarnier.) (Rouvray. — M. Emy.)

2317. O. ATER. *Grav*. — NIGRIPES. *Dej*. Assez rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. Emy.)

2318. O. MORIO. *Grav*. Pas rare. Sous les pierres, dans les lieux secs. Printemps. Dijon, chemin de Daix. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées. Etc. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. Arias.)

J'ai pris à Collonges, en fauchant près du grand étang, le 26 juin, un exemplaire d'un *Ocypus* que je rapporte provisoirement à cette espèce, mais qui en diffère sans doute spécifiquement. Il s'en distingue par les antennes plus longues, ferrugineuses à la base, les pattes ferrugineuses, la ponctuation de la tête et du dessus du prothorax plus écartée, etc.

2319. O. COMPRESSUS. *Marsh*. — RUFIPALPIS. *Dej*. Peu commun. Sous les pierres et les détritits dans les lieux humides; trouvé aussi en fauchant. Été. Dijon, bord du ruisseau de la fontaine de Larrey. Flavignerot, dans la combe. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Tellecey, par terre sur un chemin dans le bois.

PHILONTHUS. *Leach*.

2320. P. SPLENDENS. *F*. Pas commun. Dans les excréments de vache. Mai. Fixin, près de la ferme de la Fortelle. (Rouvray; commun. — M. Emy.)

2321. P. LAMINATUS. *Creutz*. Un exemplaire. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. Emy.)

2322. P. CYANIPENNIS. *F.* Pas rare. Au pied des gros champignons, dans les bois humides. Juin, septembre. Villers-les-Pots. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

2323. P. NITIDUS. *F.* — CÆNOSUS. *Grav.* (Rouvray; assez rare. — M. *Emy*.)

2324. P. CARBONARIUS. *Gyll.* (Rouvray. — M. *Emy*.)

2325. P. ÆNEUS. *Rossi*. Commun. Sous les mousses, les détritux, etc, dans les bois humides. Été. Plombières, combe de Neuvon à Darois, sous des excréments de renard. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

2326. P. ATRATUS. *Grav.* Commun. Dans les excréments. Printemps. Dijon, chemins autour de la ville; trouvé aussi dans le sable au bord de l'eau dans une sablière près du chemin de Morvau. (Beaune. — M. *Arias*.)

2327. P. DECORUS. *Grav.* Pas rare. Dans les bois humides sous la mousse, les pierres et les détritux; pris aussi en fauchant. Printemps, automne. Flavignerot, dans la combe. Gevrey, bois de la plaine; bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Rouvray; sous les pierres au bord du petit ruisseau du bois Darié. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *Arias*.)

2328. P. LUCENS. *Mann*. Un seul exemplaire trouvé à Gevrey, sous les détritux, dans le bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, le 3 septembre.

2329. P. POLITUS. *F.* Commun. Dans les fumiers et les excréments. Printemps, automne. Dijon, chemins autour de la ville; quelquefois par terre ou au vol. Plombières, sur le viaduc de Neuvon. (Rouvray. — M. *Emy*.)

2330. P. MARGINATUS. *F.* (Rouvray; sous un crottin de

cheval; juillet. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.* — Dans les champignons; M. *Arias.*)

2331. P. *UMBRATILIS.* *Grav.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2332. P. *VARIUS.* *Gyll.* Pas rare. Dans les excréments. Dijon et les environs. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

2333. P. *ALBIPES.* *Grav.* Pas commun. Dans les fumiers et le crottin de cheval; trouvé aussi sous des pierres recouvrant des restes de fumier. Printemps. Dijon, chemins autour de la ville; bords du Canal; etc. (Rouvray; très commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier.*)

2334. P. *CEPHALOTES.* *Grav.* Un seul exemplaire trouvé au vol dans le cours du Parc, le 14 avril. (Beaune. — M. *Arias.*)

2335. P. *FIMETARIUS.* *Grav.* Rare. Dijon, sur le parapet au nord du Jardin botanique; octobre. Environs de Dijon. (Beaune. — M. *Bourlier.*)

2336. P. *EBENINUS.* *Grav.* — *VARIANS.* *Gyll.* Commun. Sous les détrit, les feuilles mortes, etc.; surtout dans les endroits humides. Printemps, automne. Dijon, mur au nord du clos de Pouilly. Flavignerot, dans la combe. Fixin, bois près du chemin de fer, sur une souche sur laquelle suintait la sève. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Villenotte près Semur, montagne au nord du village. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

2337. P. *CORVINUS.* *Erichs.* (Beaune. — M. *Arias.*)

2338. P. *FUMIGATUS.* *Dahl.* *Erichs.* Pas rare. Environs de Dijon.

2339. P. *CORRUSCUS.* *Grav.* — *PLANUS.* *Dahl.* Pas rare. Dans les bouses. Printemps, été. Dijon, chemin de Morvau, près de Mirande. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *André.*)

2340. *P. SANGUINOLENTUS. Grav.* Pas commun. Dans les excréments et le sable au bord de l'eau. Printemps. Dijon, chemins autour de la ville; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite, dans le sable au bord de l'eau; (le long de l'Ouche, derrière le Parc. — M. Nodot.) (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. André.)

2341. *P. BIPUSTULATUS. Panz.* Pas commun. Dans les bouses. Printemps, été. Dijon, chemin de Morvau, près de Mirande. (Rouvray. — M. Emy.)

2342. *P. VARIANS. Payk. — OPACUS. Grav.* Pas commun. Dans les excréments. Dijon, sur le parapet au nord du Jardin botanique; octobre. Environs de Dijon. (Beaune. — M. Bourlier.)

2343. *P. DEBILIS. Erichs.* Un exemplaire. Environs de Dijon.

2344. *P. VENTRALIS. Grav.* Pas rare. Dans les crottins et sous les pierres; printemps, été. Dijon, chemins autour de la ville; Vieux-Suzon; etc. Fontaine. (Rouvray; rare. — M. Emy.) (Beaune. — Hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre; M. Bourlier. — M. André.)

2345. *P. DISCOIDEUS. Grav.* (Beaune. — MM. Arias et Bourlier.)

2346. *P. RUBIDUS. Erichs. — DIMIDIATUS. Lacord.* Pas commun. Environs de Dijon. (Rouvray. — M. Emy.)

2347. *P. QUISQUILIARIUS. Gyll.* Pas rare. Dans le sable humide, près de l'eau. Printemps. Dijon, sablière près du chemin de Morvau. (Beaune. — M. Bourlier.)

2348. *P. VERNALIS. Grav.* (Rouvray. — M. Emy.)

2349. *P. SPLENDIDULUS. Grav.* Un exemplaire. Environs de Dijon.

2350. *P. VIRGO. Grav.* Un exemplaire. Environs de Dijon.

2351. *P. MICANS. Grav.* Pas rare. Sur la boue et sous les détritits au bord des étangs. Printemps, été. Collonges, grand étang. Soirans-Fouffrans, étang Noiroto. (Beaune. — M. Arias.)









2352. *P. FULVIPES*. *F.* Commun. Dans le sable humide, au bord des eaux courantes ou stagnantes. Printemps, été. Dijon, sablières près de l'Allée-de-la-Retraite et du chemin de Morvau; bord de l'Ouche entre le Parc et Longvic. Blaisy-Bas, bord du ruisseau au midi du village. (Rouvray. — M. *Emy*.)

2353. *P. TENUIS*. *F.* (Beaune. — MM. *Arias* et *André*.)

2354. *P. ASTUTUS*. *Erichs.* Trois exemplaires. Avril. Dijon, dans le sable au bord de l'eau d'une sablière près du chemin de Morvau; et par terre sur la route de Plombières, près du Jardin botanique.

2355. *P. ATERRIMUS*. *Grav.* Commun. Sous les pierres, les détritux, les feuilles mortes, les excréments, surtout dans les endroits humides; sur la boue humide au bord des eaux stagnantes; en fauchant; au vol; etc. Avril à septembre. Dijon, chemins au nord de la ville; Vieux-Suzon; mur au nord du clos de Pouilly; bord du Canal; etc. Plombières, combe de Neuvon, où je l'ai pris une fois sous des excréments de renard. Collonges, bord du grand étang. Soirans-Fouffrans, étang Noiro. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier*.)

2356. *P. PUNCTUS*. *Grav.* Deux exemplaires, dont un trouvé à Dijon, sous les feuilles mortes, au bas du mur au nord du clos de Pouilly, le 15 avril. (Rouvray; rare; dans les champignons. — M. *Emy*.)

2357. *P. RUFIPENNIS*. *Grav.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2358. *P. CINERASCENS*. *Grav.* Pas commun. Collonges-les-Premières, en fauchant le soir au bord du grand étang; 26 juin.

2359. *P. PROLIXUS*. *Erichs.* Pas commun. Environs de Dijon. Saint-Léger, sur la boue du ruisseau au bas du grand étang près de la route de Dijon à Pontailier; juillet.

2360. P. PROCERULUS. *Grav.* Pas commun. Sur la boue au bord des eaux stagnantes. Printemps. Dijon, chemin de Morvau, près de Mirande, au bord d'un fossé rempli d'eau. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. Saint-Léger, sur la boue du ruisseau au bas du grand étang; juillet.

2361. P. ELONGATULUS. *Erichs.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

HETEROTOPS. *Kirb.*

2362. H. BINOTATUS. *Erichs.* Un exemplaire. Environs de Dijon. (Beaune. — Hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre; M. *Bourlier*. — M. *André*.)

QUEDIUS. *Leach.* — VELLEIUS. *Leach.*

2363. Q. DILATATUS. *F.* Cinq exemplaires de ce rare insecte ont été pris par M. *Emy*, à Rouvray, dans le bois Darié, sous la mousse du tronc d'un chêne qui laissait transsuder sa sève, le 24 juillet 1841.

Un autre exemplaire, donné anciennement à M. *Nodot* a également été pris, je crois, dans le département de la Côte-d'Or.

Cette espèce vit dans les nids de frelons (*Vespa crabro*) et y subit ses métamorphoses.

MICROSAURUS. *Dej.*

2364. Q. LATERALIS. *Grav.* Pas rare. Au pied des gros champignons qui croissent dans les bois humides. Septembre. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray; pas commun. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

2365. Q. FULGIDUS. *F.* — NITIDUS. *Grav.* — VARIABILIS. *Gyll.* Assez commun. Sous la mousse au pied des arbres, au pied des gros champignons, sur les fleurs et les feuilles,

surtout dans les bois. Mai à septembre. Dijon, barrière au-dessus de la gare; chemins au nord de la ville sur le *Carduus nutans* et sur les fleurs de rosier sauvage; Vieux-Suzon; etc. Asnières; un exemplaire de la variété à élytres noires trouvé contre la paroi des grottes; mai. Plombières, combe de Neuvon. Gevrey, bois de la plaine. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

2366. Q. TRUNCICOLA. *Fairm.* J'ai pris deux exemplaires de cette espèce à Dijon, dans le bois pourri ou le terreau au bas du tronc creux d'un vieux tilleul, à l'Allée-de-la-Retraite, le 27 juillet.

2367. Q. CRUENTUS. *Oliv.* Pas commun. Environs de Dijon.

2368. Q. SCITUS. *Grav.* Pas commun. Environs de Dijon. Velars-sur-Ouche, dans une fourmilière de *Formica rufa*; octobre. (Rouvray. — M. *Emy*.)

2369. Q. IMPRESSUS. *Panz.* Commun. Dans les lieux humides, sous les feuilles mortes et les détrit. Printemps, automne. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; mur au nord du clos de Pouilly. Fixin, bois près du chemin de fer, sur une souche récemment coupée et d'où suintait la sève. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

2370. Q. BREVIS. *Erichs.* Pas commun. Dans les fourmilières de *F. rufa*. Octobre. Plombières, bois voisin du viaduc de Neuvon. (Beaune. — M. *Arias*.)

2371. Q. MOLOCHINUS. *Grav.* Pas rare. Sous les pierres et les mousses, dans les bois. Printemps. Plombières, combe de Neuvon. Flavignerot, dans la combe. (Rouvray. — M. *Emy*.)

2372. Q. FRONTALIS. *Nordm.* Peu commun. Environs de Dijon.

2373. Q. FULIGINOSUS. *Grav.* — TRISTIS. *F.* Commun. Sous la mousse au bas du tronc des arbres, sous les dé-

tritrus ; au pied des gros champignons dans les bois ; dans les bouses ; etc. Printemps, été, automne. Dijon, sur le parapet au nord du Jardin botanique. Plombières, combe de Neuvon. Ancey, pâquier au milieu des bois. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, et dans les bois de chênes. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Arias.*)

2374. Q. PICIPES. *Mann.* Commun. Sous les détritrus, dans les lieux humides. Été. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Etc.

2375. Q. MAURORUFUS. *Grav.* — PRÆCOX. *Gyll.* Pas commun. Dans les lieux humides, sous les pierres et en battant les fagots, surtout dans les bois. Printemps, automne. Dijon, fontaine auprès de l'Asile des aliénés. Flavignerot, dans la combe. (Montberthaud ; en fauchant dans les bouleaux et les bruyères au-dessus du pont ; septembre. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

2376. Q. RUFIPES. *Grav.* Deux exemplaires. Environs de Dijon.

2377. Q. ATTENUATUS. *Gyll.* Un exemplaire. Environs de Dijon.

2378. Q. BOOPS. *Grav.* Pas rare. Dans les lieux humides sous les pierres, les mousses, les détritrus et en fauchant. Juin à septembre. Plombières, combe de Neuvon. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Beaune. — M. *André.*)

#### OXYPORUS. F.

2379. O. RUFUS. Commun. Dans les champignons, soit dans les bois, soit dans les lieux non boisés. Juin à septembre. Dijon ; chemin de Larrey au Fort-Yon ; (au Parc. — M. *Tarnier.*) Marsannay-la-Côte, à l'entrée de la combe. Plombières, combe de Neuvon. Chaignay, au-delà de la route, du côté de Gemeaux. Collonges-les-Premières, Bois-





le-Duc. Fixin, bois près de la voie romaine. Gevrey, chemin de Saulon; bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

CRYPTOBIUM. *Mann.*

2380. C. FRACTICORNE. *Mann.* Rare. Sur la boue humide et sous les détritrus, au bord de l'eau dans les lieux bas. Printemps. Dijon, contre-fossé au midi du Canal, près du pont du chemin de fer; pré entre le clos de Pouilly et la ferme d'Epirey, au pied des arbres le long du fossé. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Beaune. — M. *André.*)

ACHENIUM. *Leach.*

2381. A. DEPRESSUM. *Grav.* — CORDATUM. *Dahl.* Rare. Sous les pierres au bord des fossés humides et au vol le soir près de l'eau dans les endroits bas. Printemps, été. Dijon, chemin de Ruffey, près du clos de Pouilly; fontaine de Larrey; chemin de Corcelles-les-Monts, dans un fossé; Collonges-les-Premières, chemin qui conduit au bois, le soir au vol. (Pontailler-sur-Saône; pas rare sous les mousses humides dans les bois voisins de la Saône. — M. *Dudrumel.*) (Rouvray; fort rare. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Arias.*)

LATHROBIUM. *Grav.*

2382. L. BRUNNIPES. *F.* Pas rare. Lieux marécageux, sous les détritrus. Printemps, automne. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy.*)

2383. L. ELONGATUM. *Linn.* Pas rare. Comme le précé-



dent et dans la même localité. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *Arias*.)

2384. L. FULVIPENNE. *Gyll*. Commun. Dans les endroits humides, sous les pierres et les détritns, et en fauchant le soir. Printemps, automne. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés; sablière près de l'Allée-de-la-Retraite; bord de l'Ouche près du moulin Vesson. Flavignerot, dans la combe. Lamarche-sur-Saône, bord du petit étang qui est au-dessus du grand étang de Saint-Léger. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

2385. L. MULTIPUNCTUM. *Grav*. Commun. Sous les pierres et sur la boue humide au bord de l'eau. Printemps, été. Dijon, contre-fossé au midi du Canal, près du pont du chemin de fer; chemin de Morvau, au bord d'un fossé, sablière près de l'Allée-de-la-Retraite; Vieux-Suzon. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Blaisy-Bas, bord du ruisseau au midi du village. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *Bourlier*.)

2386. L. SPADICEUM. *Erichs*. — TARNIERI. *Rouget*. Rare. Nous avons trouvé, M. *Tarnier* et moi, un certain nombre d'exemplaires de cette espèce, à Dijon, à la fin d'avril et au commencement de mai, sous les pierres et dans le sable au bord de l'eau d'une sablière non exploitée alors, comblée depuis, et qui se trouvait près de l'extrémité nord de l'Allée-de-la-Retraite.

Induit en erreur par le silence d'Erichson au sujet de la particularité remarquable que présente, en dessous, l'extrémité du 5<sup>e</sup> segment abdominal du mâle de cette espèce, je l'avais décrite comme nouvelle dans les *Annales de la Société entomologique de France*, année 1854, p. 83. Je suis obligé d'avouer aujourd'hui que l'espèce en question est parfaitement décrite, sauf l'omission dont j'ai parlé, dans le *Genera et Species Staphylinorum*, p. 592, n<sup>o</sup> 6.

2387. L. QUADRATUM. *Gyll*. Je ne possède qu'un exem-





plaire du type de l'espèce, et je n'ai pas de souvenir du lieu où je l'ai pris. (Beaune. — M. André.)

La variété *TERMINATUM*. *Grav.* est rare dans nos environs; je l'ai prise en été et en automne, sous les détritns dans les lieux humides. Collonges, boue au bord d'une mare. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux.

M. *Emy* signale l'espèce comme se trouvant à Rouvray, assez rarement, sous les mousses au pied des aulnes; mais il n'indique pas si c'est le type ou la variété, ou s'il entend parler de tous deux.

2388. L. *PUNCTATUM*. *Zetterst.* Assez rare. Lieux très humides. Collonges-les-Premières, sur la boue au bord d'une mare; juillet.

2389. L. *FILIFORME*. *Grav.* — *LINEARE*. *Grav.* Pas commun. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, sous les détritns; avril et août. (Rouvray. — M. *Emy*.)

2390. L. *PALLIDUM*. *Nordm.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2391. L. *LONGULUM*. *Grav.* Rare. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, sous les détritns; juin.

*SCOPÆUS*. *Erichs.*

2392. S. *LÆVIGATUS*. *Gyll.* Commun. Sur la boue et sous les détritns au bord de l'eau, en fauchant dans les bois humides. Printemps, été. Dijon, fontaine de Larrey, au bord du ruisseau. Plombières, combe de Neuvo à Darois. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. Soirans-Fouffrans, étang Noiro. Lamarche-sur-Saône. bord du petit étang au-dessus de l'étang de Saint-Léger, le soir en fauchant. Gevrey, dans la combe et au bord du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier et André*.)

2393. S. *PUMILUS*. *Hér.* — *MINUTUS*. *Erichs.* Pas com-

mun. Sous les pierres et les détritns dans les endroits ombragés. Printemps, automne. Plombières, combe de Neuvon, sous une pierre et avec la *Formica rufa*.

LITHOCHARIS. Dej.

2394. L. CASTANEA. Grav. (Rouvray. — M. Emy.)

2395. L. FUSCULA. Ziegl. Pas commun. Sous les pierres, les détritns, la mousse au pied des arbres dans les lieux humides ou les bois. Printemps, automne. Dijon, fontaine près de l'Asile des aliénés. Plombières, combe de Neuvon. Gevrey, dans la combe. (Rouvray. — M. Emy.)

2396. L. DILUTA. Erichs. Deux exemplaires. Environs de Dijon.

J'ai quelques doutes sur l'identité de cette espèce.

2397. L. MELANOCEPHALA. F. — BIGOLOR. Grav. Commun. Sous les pierres, surtout dans les lieux humides, sous les détritns et les feuilles mortes, et dans les fourmilières de *F. rufa* et *congerens*. A peu près toute l'année. Dijon, chemin de Daix; derrière le mur du Parc, du côté de Longvic; bords du Canal, sous des pierres recouvrant quelques débris de fumier; chemin de la ferme de Giron; Vieux-Suzon, le soir au vol; rue des Moulins; mur au nord du clos de Pouilly. Plombières, combe de Neuvon. Baume-la-Roche, bois des Brosses. (Beaune. — Hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre; M. Bourlier. — M. André.)

2398. L. OCHRAGEA. Grav. Pas commun. Sous les pierres et au vol le soir au soleil couchant. Été, automne. Dijon, chemin de Daix, sous des pierres recouvrant des restes de fumier; bords du Canal. (Beaune. — M. Bourlier.)

2399. L. OBSOLETA. Nordm. Rare. Lamarche-sur-Saône, au bord du petit étang qui est au-dessus du grand étang de Saint-Léger, le soir en fauchant; juillet. Environs de Dijon.





STILICUS. *Latr.* — RUGILUS. *Leach.*

2400. S. FRAGILIS. *Latr.* Assez rare. Sous les pierres, surtout dans les lieux humides ou près de l'eau, au vol le soir; trouvé aussi courant sur du bois coupé. Mars à juin. Dijon, au Parc sur du bois coupé, surtout quand la terre est mouillée par une pluie de la veille; bords du Canal du côté de Larrey; chemin près du deuxième contre-fossé au midi du Canal, en aval du bassin; Fontaines-Dijon, chemin à l'ouest du village; petit mur près du moulin Vesson.

2401. S. RUFIPES. *Müll.* — ORBICULATUS. *F.* J'ai trouvé un exemplaire de cette espèce le 1<sup>er</sup> juillet, à Gevrey, près du petit étang de Satenay, sous les détritns. J'en possède en outre un second dont j'ai oublié la provenance.

2402. S. SUBTILIS. *Erichs.* Deux exemplaires, dont un trouvé sous une pierre, à Dijon, derrière le mur du Parc, du côté de Longvic, le 1<sup>er</sup> octobre.

2403. S. SIMILIS. *Erichs.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon. (Beaune. — M. *Bourlier.*)

2404. S. AFFINIS. *Erichs.* Commun. Sous les pierres, les détritns et les feuilles mortes, surtout dans les endroits humides; en fauchant dans les prés ou les bois. Mars à novembre. Dijon, chemin de Daix; chemin de Morvau, près de Mirande, sur la boue humide d'un fossé; mur au nord du clos de Pouilly et pré entre ce clos et la rente d'Epirey. Ahuy, bords de Suzon. Plombières, combe de Neuvon à Prenoie. La Rochette près Oisilly. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Beaune. — Hammeu de Gigny, sous les meules de foin; octobre. M. *Bourlier.* — M. *André.*)

2405. S. ORBICULATUS. *Payk.* Un seul exemplaire confondu avec l'espèce précédente et que je suppose prove-



nir de la dernière des localités indiquées. (Rouvray; pas rare sous les détritrus végétaux. — M. Emy.)

SUNIUS. *Leach.* — ASTENUS. *Dej.*

2406. S. FILIFORMIS. *Latr.* — PROCERUS. *Knoch.* Pas rare. Sous les pierres, surtout dans les endroits secs. Presque toute l'année, mais plus particulièrement au printemps. Dijon, chemins au nord et à l'ouest de la ville. Talant, coteaux incultes le long de la route de Plombières. Plombières. Villenotte près Semur, bord du bois de Champeaux, en fauchant, au mois de septembre. (Rouvray; battue des haies sèches. — M. Emy.) (Beaune. — Hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre. M. Bourlier. — MM. Arias et André.)

2407. S. UNIFORMIS. *Jacq. Duv.* J'avais confondu jusqu'à une époque très récente cette espèce avec la précédente, dont elle est excessivement voisine et ne me semble différer que par le sommet des élytres très étroitement testacé; je n'ai en conséquence noté d'autre localité particulière pour cet insecte, qui n'est pas rare, que le coteau au nord du village de Plombières, et d'autre époque que la fin de septembre.

2408. S. INTERMEDIUS. *Dej.* Pas rare. Endroits humides et ombragés dans le voisinage des eaux, sous les feuilles mortes, les détritrus et en fauchant. Avril à octobre. Dijon, au bas du mur au nord du clos de Pouilly. Villenotte près Semur, bord du bois de Champeaux. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc, surtout près du grand étang. Gevrey, bord du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune; hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre. Savigny près Beaune, sous des écorces d'arbres morts; avril. — M. Bourlier.)

2409. S. ANGUSTATUS. *Payk.* Commun. Sous les pierres, surtout dans les endroits secs. Toute l'année, mais surtout





au printemps, en automne et à la fin de l'hiver. Dijon, chemins au nord et à l'ouest de la ville ; trouvé une fois au Vieux-Suzon, au vol au coucher du soleil. Chenôve, derrière la plantation de sapins. Talant, coteaux au midi du village près du chemin de fer. Plombières, coteau au nord du village. Velars-sur-Ouche, le soir en fauchant dans le bois ; mai. (Rouvray ; en battant les haies sèches. — M. *Emy*.) (Beaune ; hameau de Giguy, sous les meules de foin ; octobre. — MM. *Bourlier* et *André*.)

PÆDERUS. F.

2410. P. LITTORALIS. *Grav.* Commun. Sous les pierres et les détritns, dans les endroits humides, surtout dans le voisinage de l'eau ; trouvé aussi en fauchant. Presque toute l'année. Dijon, bords de l'Ouche et de Suzon ; derrière le mur du Parc, du côté de Longvic ; chemin de la rente de Morvau, sur la boue humide d'un fossé. Ahuy, bord de Suzon près du lavoir. Plombières, sur le viaduc de Neuvon. Villenotte près Semur, bord du bois de Champaux. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *Arias*.)

2411. P. LONGIPENNIS. *Erichs.* Commun. Sous les pierres et les détritns dans les endroits humides, principalement dans le voisinage de l'eau ; quelquefois en fauchant. Presque toute l'année. Dijon, à peu près partout où il existe un peu d'humidité ; mur au nord du clos de Pouilly ; derrière le mur du Parc du côté de Longvic ; etc. (Pontailler-sur-Saône ; mousses humides. — M. *Dudrumel*.) Collonges-les-Premières, en fauchant dans les bois. Gevrey, dans la combe et près du petit étang de Satenay.

2412. P. CALIGATUS. *Erichs.* Trois exemplaires de cette espèce ont été trouvés par M. *Dudrumel* et moi, le 20 mai 1855, à Gevrey, sous les détritns contre les souches d'aulne près du petit étang de Satenay.

Ces trois exemplaires diffèrent de l'espèce typique décrite par Erichson, en ce qu'ils ont l'extrémité du 3<sup>e</sup> article des palpes brunâtre.

2413. *P. RIPARIUS*. *Linn.* Très commun. Dans les lieux marécageux, sous les détritux, en fauchant ou par terre au bord de l'eau. Mai à septembre. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

2414. *P. RUFICOLLIS*. *F.* (Rouvray; très commun; sur le sable au bord des ruisseaux. — *M. Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)

*DIANOUS*. *Leach.*

2415. *D. COERULESCENS*. *Gyll.* — *RUGULOSUS*. *Leach.* Pas commun. Je n'ai trouvé cette espèce qu'à Longvic, sous les pierres et sur le sable au bas du barrage de l'Ouche du côté du Parc, en août, lorsque les eaux sont basses.

*STENUS*. *Latr.*

2416. *S. BIGUTTATUS*. *Linn.* — *BIPUSTULATUS*. *Mann.* Rare. Dijon, bord de Suzon, en amont de la ville, sous une pierre; janvier. Talant, bord de la mare à l'ouest du village, sur la boue humide; mai. (Rouvray; commun. — *M. Emy.*) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André.*)

2417. *S. BIPUNCTATUS*. *Kirby.* Commun. Sur le sable et la boue et sous les pierres au bord des eaux courantes ou stagnantes. Avril à octobre. Dijon, sablières près de l'Allée-de-la-Retraite et de la route d'Auxonne. Talant, bords de la mare à l'ouest du village. Longvic, bords de l'Ouche. Auxonne, bord de la Saône, en aval de la ville, rive droite. (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André.*)





2418. *S. GUTTULA*. Müll. — KIRBYI. *Gyll.* Deux exemplaires trouvés à Dijon, sur le sable au bord de l'eau d'une sablière entre le chemin de Morvau et la route d'Auxonne; avril. (Beaune. — M. André.)

2419. *S. STIGMULA*. *Erichs.* — KIRBYI. *Lacord.* (Rouvray; rare. — M. Emy.)

2420. *S. BIMACULATUS*. *Gyll.* — JUNO. *Grav.* Commun. Sur la terre humide, sous les pierres et les détritrus dans le voisinage des eaux; rarement loin de celles-ci. Mars à septembre. Dijon, chemin de Daix, rare; bord de l'Ouche près du moulin Vesson. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux, en fauchant. (Rouvray; rare. — M. Emy.) (Beaune; bord de la Bouzaise; mars. M. Bourlier.)

2421. *S. JUNO*. *F.* — BOOPS. *Grav.* Rare. Lieux humides. Avril, septembre. Dijon, pré entre le clos de Pouilly et la ferme d'Epirey, sous les détritrus au pied des saules le long du ruisseau. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay.

2422. *S. ATER*. *Mann.* Commun. Lieux humides ou ombragés. Mars à octobre. Dijon, quelquefois dans la ville sur les murs à l'ombre; mur au nord du clos de Pouilly; chemin de Daix, au bas d'une haie; Parc. Plombières, bois au midi du vallon, sous les pierres, et combe de Neuvon à Darois, en fauchant. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. MM. Arias, Bourlier et André.)

2423. *S. BUPHTHALMUS*. *Grav.* Commun. Bord des eaux stagnantes et bois humides. Printemps, été. Dijon, contre-fossé au midi du Canal, près du pont du chemin de fer; sablière entre le chemin de Morvau et la route d'Auxonne. Saint-Léger, sur la boue au bord du ruisseau qui se trouve entre le grand étang et la route de Dijon à Ponttailler. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. Gevrey, bois de la plaine. (Beaune. — MM. Arias et Bourlier.)



2424. S. MORIO. *Grav.* Commun. Prés humides et bord des ruisseaux, en fauchant et sous les détrit. Mai à août. Dijon, fontaine de Larrey. Asnières, en fauchant dans le bois. Plombières, combe de Neuvon à Darois. La Rochette près Oisilly. (Pontailier-sur-Saône; sous la mousse humide; octobre. — M. *Dudrumel.*) Collonges-les-Premières, bord du grand étang. Gevrey, au pied d'un saule au bord du chemin de Saulon. (Rouvray; très commun. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Bourlier.*)

2425. S. CINERASCENS. *Erichs.* (Beaune. — M. *Arias.*)

2426. S. INCRASSATUS. *Erichs.* (Beaune. — M. *André.*)

2427. S. FORAMINOSUS. *Erichs.* Je rapporte avec doute à cette espèce un seul exemplaire trouvé aux environs de Dijon.

2428. S. NITIDUS. *Lacord.* Un seul exemplaire trouvé au bas du mur au nord du clos de Pouilly, sous les feuilles mortes, le 15 avril. (Rouvray. — M. *Emy.*)

2429. S. CANALICULATUS. *Knoch.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

2430. S. PUSILLUS. *Kirby.* Peu commun. Lieux humides. Mai à septembre. Dijon, trouvé une fois dans la ville sur un mur à l'ombre. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, sous les détrit.

2431. S. EXIGUUS. *Erichs.* Un exemplaire. Environs de Dijon.

2432. S. SPECULATOR. *Knoch.* Commun. Lieux humides ou ombragés, sous les pierres, les écorces basses du tronc des arbres, les détrit, en fauchant et par terre courant au bord de l'eau. Presque toute l'année, plus rare l'hiver. Dijon, mur au nord du clos de Pouilly; chemin de Daix; Parc. Plombières, bois au midi du vallon; combe de Neuvon à Darois. Collonges-les-Premières, sur la boue humide d'une petite mare presque desséchée. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias* et *Bourlier.*)





2433. S. PROVIDUS. *Erichs.* Commun. Je n'ai noté cette espèce que comme ayant été trouvée sous les pierres du petit mur qui est près du moulin Vesson, en mars; mais elle se trouve sans aucun doute dans plusieurs des localités indiquées pour l'espèce précédente, avec laquelle il est excessivement difficile de ne pas la confondre lors de la détermination, toujours un peu superficielle, qui suit le retour d'une excursion entomologique. (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*) (Savigny-sous-Beaune, Fontaine-Froide, sous les écorces; octobre. — M. *Bourlier.*)

2434. S. ATERRIMUS. *Aubé.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

2435. S. ARGUS. *Knoch.* — OPTICUS. *Gyll.* Un seul exemplaire trouvé à Collonges-les-Premières, en fauchant dans le bois, le 15 mai. (Rouvray; rare; sous les mousses aquatiques dans le ruisseau de l'étang du Marais. — M. *Emy.*)

2436. S. FUSCIPES. *Grav.* — FULVIPES. *Lacord.* Pas commun. Collonges-les-Premières, en fauchant dans le bois; 24 juin. La Rochette près Oisilly, en fauchant dans les prés au bord de la Vingeanne; 12 mai. Etc. (Rouvray. — M. *Emy.*)

2437. S. HUMILIS. *Erichs.* — CARBONARIUS. *Lacord.* Un exemplaire. Environs de Dijon.

2438. S. DECLARATUS. *Tischer.* Deux exemplaires trouvés à Plombières, dans la combe de Neuvo à Darois, en fauchant, le 27 juillet.

2439. S. OPTICUS. *Grav.* Trois exemplaires. La Rochette près Oisilly, en fauchant dans les prés au bord de la Vingeanne; 12 mai.

2440. S. BINOTATUS. *Ljung.* (Rouvray; au pied des jones sur la vase, à la queue de l'étang de Bussière; 7 août 1844. — M. *Emy.*)

2441. S. PLANTARIS. *Erichs.* Un seul exemplaire trouvé à Collonges-les-Premières, en fauchant au bord du grand étang, le 26 juin.

2442. S. RUSTICUS. *Erichs.* Je n'ai trouvé cette espèce

qu'à Collonges, où elle est commune, en fauchant, surtout vers le soir, au bord du grand étang, en mai, juin et juillet.

2443. *S. SUBÆNEUS*. *Erichs.* Commun. Dans les lieux humides ou ombragés, sous les pierres, les détritns, les souches arrachées dans les bois, les écorces, et en fauchant. Mars à septembre. Dijon, chemin de Daix; chemins du côté de Fontaine; Parc. Villenotte près Semur, bord du bois de Champeaux. Fixin, bois près du chemin de fer. Gevrey, bord du chemin de Saulon, au pied d'un saule; bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

2444. *S. ÆROSUS*. *Erichs.* Un seul exemplaire trouvé aux environs de Dijon; mais je n'ai aucun souvenir de cette capture, ayant confondu primitivement cette espèce avec la précédente.

Cet insecte n'a pas encore été signalé en France; aussi je ne le fais figurer ici qu'après m'être assuré de son identité avec le plus grand soin.

2445. *S. IMPRESSUS*. *Tischer.* — *ACERIS*. *Lacord.* Pas rare. Bois et prés humides, en fauchant. Été, automne. Dijon, au Parc, sous des écorces de charmes morts sur pied. Plombières, combe de Neuvo à Darois. Villenotte près Semur, en battant les haies qui entourent les prés. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Bourlier* et *André*.)

2446. *S. GENICULATUS*. *Knoch.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2447. *S. FLAVIPES*. *Erichs.* Pas rare. Sous les pierres dans les lieux humides, sous les détritns au pied des arbres, etc. Printemps, été. Dijon, chemin de Daix; chemins du côté de Fontaine. Gevrey, au bas d'un saule creux au bord du chemin de Saulon. (Beaune. — M. *Bourlier*.)





2448. *S. PALUSTRIS*. *Erichs.* — *PROBOSCIDEUS*. *Gyll.* Deux exemplaires. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, sous les détritits; 3 septembre.

2449. *S. FUSCICORNIS*. *Erichs.* Peu commun. Dijon, au Parc, sur une souche, avril; etc.

2450. *S. PALLIPES*. *Grav.* Peu commun. Lieux humides, sous les pierres, les feuilles mortes, etc. Avril à novembre. Dijon, bords de Suzon, en amont de la ville; mur au nord du clos de Pouilly; petit mur près du moulin Vesson. Flavignerot, en battant des fagots. (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune. — *MM. Arias et Bourlier.*)

2451. *S. FILUM*. *Tisch.* Commun. Dans les bois et les prés humides, en fauchant. Mai à octobre. Villenotte près Semur, en fauchant dans les prés; trouvé aussi dans les corolles de *Colchicum autumnale*. Plombières, combe de Neuvon. Magny-sur-Tille, bois de Malforêt. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux.

2452. *S. TARSALIS*. *Ljung.* — *CLAVICORNIS*. *Grav.* Pas rare. Environs de Dijon. (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune. — *MM. Arias et André.*)

2453. *S. OCULATUS*. *Grav.* Commun. Lieux humides, surtout au bord de l'eau, en fauchant et sous les détritits. Avril à octobre. Dijon, mur au nord du clos de Pouilly; fontaine de Larrey. Plombières, combe de Neuvon à Darois. La Rochette près Oisilly. Collonges-les-Premières. Villenotte près Semur, en fauchant et en battant les haies. Gevrey, bois de la plaine en fauchant. (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune. — *M. Bourlier.*)

2454. *S. CICINDELOIDES*. *Schall.* Pas commun. Lieux humides. Printemps, été. Dijon, dans une sablière entre le chemin de Morvau et la route d'Auxonne, au bord de l'eau. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc. (Rouvray. — *M. Emy.*)



2455. *S. SOLUTUS*. *Erichs.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon (1).

2456. *S. LATIFRONS*. *Knoch.* Commun. Bois humides, en fauchant. Mai à septembre. Plombières, combe de Neu-von à Darois. Collonges-les-Premières, Bois-le-Duc, principalement au bord du grand étang. Gevrey, bois de la plaine. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux, en fauchant et sur une souche humide. (Beaune. — Sous les pierres au bord de la Bouzaise, et hameau de Gigny, sous les meules de foin; mars, octobre; *M. Bourlier*. — *M. André*.)

2457. *S. CONTRACTUS*. *Erichs.* Deux exemplaires trouvés à Collonges, en fauchant au bord du grand étang les 26 juin et 10 juillet. (Rouvray; grande mare du bois Darié; 9 juin, — *M. Emy*.)

*EUÆSTETHUS. Grav.*

2458. *E. RUFICAPILLUS*. *Lacord.* Un seul exemplaire trouvé le 3 septembre à Gevrey, dans le bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, sous les détritrus. (Beaune. — *M. Bourlier*.)

2459. *E. LÆVIUSCULUS*. *Mann.* Un exemplaire trouvé le 26 juin à Collonges-les-Premières, en fauchant le soir au bord du grand étang.

*BLEDIUS. Steph.*

2460. *B. FRACTICORNIS*. *Payk.* Pas commun. Sur la boue humide au bord de l'eau, et au vol au coucher du soleil.

---

(1) La *Faune entomologique française* mentionne comme trouvé aux environs de Dijon le *S. paganus*, espèce qui devrait être placée après le *S. solutus*. Cette indication est le résultat d'une erreur de détermination; l'insecte que j'avais désigné sous ce nom appartient à une espèce voisine, peut-être au *latifrons*.





Juillet, octobre. Dijon, un seul exemplaire le soir au vol, sur le chemin de Montchapet entre les deux bureaux d'octroi. Soirans-Fouffrans, sur la vase au bas de l'étang Noirot, à l'angle qui joint la barrière du chemin de fer de Besançon. Villenotte près Semur, trouvé communément à l'est du bois de Champeaux, dans les champs, le 5 octobre au vol, entre 4 et 5 heures du soir.

2461. B. OPACUS. *Block*. Deux exemplaires, dont un pris le soir au vol à Collonges-les-Premières, près de la gare du chemin de fer, le 26 juin; l'autre a été trouvé, je crois, avec l'espèce précédente, à Soirans-Fouffrans, sur la vase au bas de l'étang Noirot, le 19 juillet.

PLATYSTETHUS. *Mann*.

2462. P. MORSITANS. *Poyk*. — STRIOLATUS. *Ziegl*. Commun. Dans le crottin de cheval sur les routes et les chemins, dans les bouses, sous des pierres recouvrant du fumier, au vol le soir ou par les temps couverts et orageux, quelquefois en fauchant le soir. Printemps, été, automne. Dijon, chemins autour de la ville. Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant. Ancy, dans le pâquier entre les bois. (Beaune. — M. *Arias*.) (Savigny près Beaune, sous des écorces d'arbres morts; mars. — M. *Bourlier*.)

2463. P. CORNUTUS. *Grav*. Commun. Dans la vase humide au bord des eaux stagnantes; pour le faire sortir il faut fouler cette vase avec les pieds. Printemps, été. Dijon, sablière entre le chemin de Morvau et la route d'Auxonne, dans la couche de matière végétale provenant du dessèchement de l'eau croupie; bords du Canal près de l'écluse de Larrey, dans un fossé. Talant, mare à l'ouest du village. Soirans-Fouffrans, bas de l'étang Noirot près du chemin de fer. Saint-Léger, au bord du ruisseau de décharge du grand étang.

2464. P. NODIFRONS. *Sahlb.* Un exemplaire trouvé à Dijon, sur un mur dans la ville, le 14 juin.

2465. P. SPINOSUS. *Erichs.* Un exemplaire; trouvé à Dijon, au bord de la fontaine de Larrey, sur la boue humide, le 25 juillet.

OXYTELUS. *Grav.*

2466. O. RUGOSUS. *F.* — CARINATUS. *Grav.* Commun. Dans les excréments, ou le soir au vol dans leur voisinage; sous les pierres et les détritits; sur la boue humide; en fauchant; sur les murs à l'ombre; sur du bois empilé et sur des barrières. Mars à septembre. Dijon, dans la ville sur les murs; chemins autour de la ville; barrière au-dessus de la gare; Parc, sur du bois coupé; petit mur près du moulin Vesson. Plombières, combe de Neuvon. Collonges-les-Premières. Soirans-Fouffrans, sur la boue au bord de l'étang Noiroit. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

2467. O. INSECTATUS. *Grav.* Pas commun. Environs de Dijon. (Beaune. — MM. *Bourlier et André.*)

2468. O. PICEUS. *Linn.* Pas rare. Dans les excréments, surtout les crottins. Printemps, été. Dijon, chemins autour de la ville. (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias et André.*)

2469. O. HUMILIS. *Héer.* Pas rare. Dans le crottin de cheval. Dijon, chemins du côté de Fontaine; 13 juin.

Cette espèce n'a pas encore été signalée comme trouvée en France.

2470. O. TERRESTRIS. *Dahl.* (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *André.*)

Cet insecte est regardé aujourd'hui par presque tous les auteurs comme n'étant qu'une variété de l'*O. rugosus*.

2471. O. SCULPTUS. *Grav.* Trouvé communément à Vil-





lenotte près Semur, à l'est du bois de Champeaux, au vol, au coucher du soleil, le 5 octobre. (Beaune. — M. André.)

2472. O. SCULPTURATUS. *Grav.* — FLAVIPES. *Lacord.* Commun. Dans les excréments, surtout les crottins, au vol le soir au coucher du soleil ou même le jour par les temps orageux, sur les routes et les chemins; sur les murs à l'ombre; en fauchant dans les bois; trouvé aussi sous des cadavres de petits animaux et sur une souche qui laissait suinter la sève; etc. Mai à octobre; 1<sup>er</sup> novembre. Dijon, dans la ville, sur les murs ou au vol; chemins autour de la ville; Parc, au vol et sur des piles de bois; bords du Canal. Plombières, combe de Neuvon et sur le viaduc. Blaisy-Bas, dans le bois. Fixin et Gevrey, bois de la plaine. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

2473. O. INUSTUS. *Grav.* Commun. Dans les excréments et les végétaux en décomposition; au vol le soir au coucher du soleil; sur le bois empilé; sous les pierres et les écorces. Mai à octobre. Dijon, chemins autour de la ville. Talant, près du clos Echalié, dans des raves pourries. Villenotte près Semur, en fauchant au bord du bois de Champeaux.

2474. O. NITIDULUS. *Grav.* Pas rare. Dans les excréments et au vol le soir au coucher du soleil sur les chemins. Juin, juillet. Dijon, chemins autour de la ville. (Beaune. — MM. Bourlier et André.)

2475. O. COMPLANATUS. *Erichs.* Pas rare. Au vol le soir au coucher du soleil, sur les murs à l'ombre, dans les excréments. Juin, juillet. Dijon, chemins autour de la ville; bords du Canal; parapet du Jardin botanique contre la route de Pombières. (Beaune. — MM. Arias et André.)

2476. O. DEPRESSUS. *Grav.* Excessivement commun. Dans les excréments, surtout les crottins, le soir au vol au soleil couchant, sur les murs, dans les végétaux en décomposition, sous les pierres, quelquefois sous les écorces



d'arbres abattus, sur la boue au bord des eaux stagnantes, en fauchant, etc. Mars à juillet. Dijon, sur les chemins et les routes, à peu près partout; dans la ville; au Parc; cours du Parc, au bord des fossés; bords du Canal; sablière entre la route d'Auxonne et le chemin de Morvau; etc. Plombières, combe de Neuvon à Darois. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

PHLOEONÆUS. *Erichs.* — OXYTELUS. *Grav.*

2477. P. CŒLATUS. *Grav.* Commun. Dans les crottins, au vol le soir au soleil couchant, sous les pierres recouvrant des restes d'excréments ou de fumier, sur les murs, sous les détritns et sur la boue humide au bord des fossés. Février à septembre. Dijon, chemins autour de la ville; Vieux-Suzon; bords du Canal; Parc, sur le petit mur contre la rivière, et au vol; fontaine de Larrey; etc. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias et Bourlier.)

TROGOPHLOEUS. *Mann.*

2478. T. RIPARIUS. *Lacord.* — BILINEATUS. *Steph.* — CORTICINUS. *Gyll.* Pas rare. Sur la boue humide au bord des eaux stagnantes, sous les détritns, au vol le soir, sous les pierres et en fauchant. Avril à juillet. Dijon, bords du Canal, dans un fossé et au vol le soir; sablière entre la route d'Auxonne et le chemin de Morvau; chemins autour de la ville, au vol. Fontaine, sur le chemin qui conduit à Suzon au-dessus de la ferme de Saint-Martin. La Rochette près Oisilly. Collonges-les-Premières. Soirans-Fouffrans. Saint-Léger, sur la boue du ruisseau qui sert à l'écoulement des eaux du grand étang. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — M. Bourlier.)





2479. *T. ELONGATULUS*. *Erichs.* Pas commun. Dijon, chemin de la rente de Morvau, au bord d'un fossé humide mars, avril.

2480. *T. FULIGINOSUS*. *Grav.* (Beaune. — M. *Bourlier.*)

2481. *T. PUSILLUS*. *Grav.* Pas commun. Environs de Dijon.

2482. *T. INQUILINUS*. *Erichs.* Pas rare. Dans les endroits humides, sous les pierres, sur la boue, en fauchant, surtout le soir, etc.; trouvé aussi dans les fourmilières de *F. rufa*. Avril à juillet. Fontaine, chemin qui conduit à Suzon au-dessus de la ferme de Saint-Martin. Plombières, combe de Neuvo à Darois en fauchant, et près de Neuvo dans les fourmilières. Gevrey, bois de Pennecière. Collonges-les-Premières, bord du grand étang. Lamarche-sur-Saône, bord du petit étang qui est au-dessus du grand étang de Saint-Léger. Saint-Léger, au bord du ruisseau de décharge du grand étang.

2483. *T. OBESUS*. *Kiesenw.* (Beaune. — M. *Bourlier.*)

2484. *T. TENELLUS*. *Erichs.* Un exemplaire. Environs de Dijon.

*COPROPHILUS. Latr.*

2485. *C. STRIATULUS*. *F.* — *RUGOSUS*. *Grav.* Rare. Printemps. Dijon, au Parc sur du bois empilé. Mai; etc. (Montberthaud; en fauchant dans les bois communaux. — M. *Emy.*) (Beaune. — M. *Arias.*)

*ACROGNATHUS. Erichs.*

2486. *A. MANDIBULARIS*. *Gyll.* J'ai pris un exemplaire de cet insecte à Lamarche-sur-Saône, en fauchant le soir, dans une coupe près du petit étang qui se trouve au-dessus du grand étang de Saint-Léger, le 8 juillet; et un autre, je crois à Gevrey, près du petit étang de Satenay, mais je n'en suis pas bien certain.

2487. A. PALPALIS. *Erichs.* Deux exemplaires pris à Larmarche-sur-Saône, en fauchant le soir au bord du petit étang qui est au-dessus du grand étang de Saint-Léger, le 13 juillet.

DELEASTER. *Erichs.* — ANTHOPHAGUS. *Grav.*

2488. D. DICHROUS. *Grav.* Pas rare. Sous les pierres et le sable au bord de l'eau, au vol le soir au soleil couchant par les temps très chauds. Avril à juin. Dijon, commun dans le gros sable et sous les pierres au bord de l'eau d'une sablière (comblée depuis) à l'angle de l'Allée-de-la-Retraite et du chemin au sud de Montmuzard; fontaine près de l'Asile des aliénés, le long du ruisseau et le soir sur la route, entre ce ruisseau et la gare du chemin de fer, principalement au-delà du Jardin botanique, au vol et par terre; je l'ai même pris au vol jusque sur la place qui est devant la porte principale de l'église Saint-Bénigne. (Rouvray; sous les pierres au bord du Serein.— M. Emy.)

ANTHOPHAGUS. *Grav.*

2489. A. ARMIGER. *Grav.* Pas rare. Dans les lieux humides et les bois, en fauchant et au vol le soir. Mai à juillet. Dijon, sur la route près de l'entrée de l'Asile des aliénés; sur la barrière au-dessus du chemin de fer, presque en face de la même entrée; chemin de Montchapet, entre les deux octrois. Talant, près de la Fontaine-aux-Fées, sur l'*Erysimum lanceolatum*, le soir. Plombières, bois au sud du vallon. Blaisy-Bas, bois au sud du village. Flavignerot, dans la combe. (Fixin. — M. Tarnier.) Gevrey, dans la combe. (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

2490. A. CARABOIDES. *Linn.* Pas rare. Dans les combes boisées et ombragées. Fin mai à juillet. Plombières,





combes de Neuvon à Darois et de Neuvon à Prenois, en fauchant.

J'ai signalé par erreur, alors que je n'en possédais qu'un exemplaire un peu défectueux, cette espèce à M. *Fairmaire* sous le nom d'*A. abbreviatus*, et, par suite, ce dernier figure à tort dans la *Faune entomologique française* comme trouvé aux environs de Dijon.

2491. *A. PRÆUSTUS*. Müll. — *BIMACULATUS*. Dahl. Rare. Dans le voisinage de l'eau sous les pierres ou au vol le soir. Mai, juin, septembre, octobre. Dijon, petit chemin de Ruffey, près du ruisseau qui sort du clos de Pouilly; bords de l'Ouche près du glais qui est en amont du moulin Vesson. Plombières, sur la barrière de la gare et sur le viaduc de Neuvon. (Beaune. — M. *Arias*.)

GEODROMUS. Héer. — *ANTHOPHAGUS*. F.

2492. *G. PLAGIATUS*. F. Je possède un exemplaire de cette espèce qui provient des environs de Dijon; je l'ai trouvé, je crois, au vol dans un bois au bas de Morey, près de Saint-Philibert, en automne.

LESTEVA. Latr. — *ANTHOPHAGUS*. Grav.

2493. *L. BICOLOR*. F. — *OBSCURA*. Grav. Commune. Au bord de l'eau, sous les pierres, sur la boue humide, dans le sable, sur les rochers à l'ombre et en fauchant. Avril, mai. Dijon, sablière près de la route d'Auxonne; Parc, sur un tronc d'arbre coupé; Combe-aux-Serpents, sous la roche qui abrite la fontaine. Flavignerot. Etc. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

2494. *L. PUBESCENS*. Mann. (Beaune. — M. *Arias*.)



OLOPHRUM. *Erichs.* — OMALIUM. *Grav.*

2495. O. PIGEUM. *Gyll.* Rare. Endroits très humides, dans le voisinage de l'eau. Avril, octobre. Dijon, bord du ruisseau près de l'Asile des aliénés, sous la mousse au pied du mur. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay, sous les détritits au pied des souches; (même endroit, en battant un fagot humide. — M. *Dudrumel.*) (Rouvray. — M. *Emy.*)

LATHRIMÆUM. *Erichs.*

2496. L. MELANOCEPHALUM. *Ill.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2497. L. ATROCEPHALUM. *Gyll.* Sous les feuilles mortes, les détritits et les écorces dans les endroits humides ou ombragés. Printemps, automne. Dijon, au Parc, sous des écorces de charmes coupés; au bas du mur au nord du clos de Pouilly. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. Fénay, bois de la Sainte-Chapelle, sous les feuilles mortes autour d'une grosse fourmilière de *F. rufa*. (Beaune; sous les pierres au bord de la Bouzaise; mars. — M. *Bourlier.*)

OMALIUM. *Grav.* — ANTHOBIUM. *Leach.*

2498. O. RIVULARE. *Payk.* Commun. Dans les champignons et les végétaux en décomposition, sous les pierres recouvrant des excréments ou du fumier, sous les écorces d'arbres morts et en fauchant surtout dans les bois, au vol le soir, etc. Mars à novembre. Dijon, trouvé dans la ville sur un mur près d'un urinoir en janvier; au Parc, sous des écorces de charmes morts et sur des troncs d'arbres coupés; bords du Canal; chemin du Vieux-Suzon, dans une rave pourrie; chemin de Daix, sous des pierres.

Plombières, combe de Neuvon à Darois, en fauchant et sous des excréments de renard; combe de Neuvon à Prenoï. Flavignerot. La Rochette près Oisilly, en fauchant sur les prés au bord de la Vingeanne. Lux, forêt de Veours. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — MM. Arias, Bourlier et André.)

2499. O. MONILICORNE. *Gyll.* Peu commun. Trouvé à Dijon, dans la ville, sur les murs; printemps.

Cet insecte provient sans doute des provisions de bois de chauffage.

2500. O. OXYACANTHÆ. *Grav.* — CÆSUM. *Lacord.* Un seul exemplaire; trouvé à la Rochette près Oisilly, en fauchant sur les prés au bord de la Vingeanne, le 12 mai. (Beaune. — M. André.)

2501. O. FOSSULATUM. *Erichs.* — CÆSUM. *Gyll.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2502. O. CÆSUM. *Grav.* — OXYACANTHÆ. *Gyll.* Pas rare. En fauchant, surtout dans les bois, en battant les fagots, sur les murs, etc. Mai, juin, octobre. Dijon, dans la ville sur un mur à l'ombre près d'un urinoir. Plombières, combe de Neuvon à Prenoï. Flavignerot. (Rouvray. — M. Emy.) (Beaune. — Hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre; M. Bourlier. — M. André.)

2503. O. MINIMUM. *Erichs.* Trouvé assez communément à Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans la forêt de Cîteaux, entre des plateaux de chêne; mai, septembre. (Beaune. — M. André.) (Savigny près Beaune, sous des écorces; octobre. — M. Bourlier.)

2504. O. PUSILLUM. *Grav.* Rare. Dijon, au Parc sous l'écorce de charmes morts sur pied ou abattus; octobre.

2505. O. FLORALE. *Payk.* — VIBURNI. *Grav.* Peu commun. Dijon, dans la ville sur les murs à l'ombre près des urinoirs. Printemps, automne. (Rouvray. — M. Emy.)

Les exemplaires que je possède ont les antennes entiè-

rement rousses; un seul appartient à la variété *MACULI-CORNE Héer*.

2506. *O. LUCIDUM. Erichs.* Pas rare. Dijon, au Parc sous les écorces de charmes morts; octobre. (Beaune. — *M. André.*)

3507. *O. PYGMÆUM. Grav.* (Rouvray. — *M. Emy.*)

2508. *O. RUFULUM. Erichs.* Un seul exemplaire. Environs de Dijon.

2509. *O. DEPLANATUM. Gyll.* — *DEPRESSUM. Lacord.* Peu commun. Environs de Dijon. Un exemplaire pris au vol à Villenotte près Semur, dans le village, le 6 octobre. (Beaune. — Hameau de Gigny, sous les meules de foin; octobre; *M. Bourlier.* — *M. André.*)

2510. *O. CONCINNUM. Marsh.* (Beaune. — *M. André.*)

2511. *O. PLANUM. Payk.* Trois exemplaires pris à Saint-Nicolas-les-Cîteaux, dans la forêt, entre des plateaux de chêne, le 17 mai.

2512. *O. LURIDUM. Gyll.* (Rouvray. — *M. Emy.*)

*ANTHOBIUM. Leach. — OMALIUM. Grav.*

2513. *A. FLORALE. Payk.* Pas commun. En fauchant dans les bois. Printemps. Gevrey, bois de Pennecière. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux; mai. Etc. (Serrigny, bois de Lepenot, dans les fleurs de primevère des prés; fin mars. — *M. Bourlier.*)

2514. *A. TRIVIALE. Erichs.* Commun. Dans les bois, dans les fleurs printanières : violettes, *anemone nemorosa*, etc. Fin mars à mai. Plombières, combe de Neuvon.

2515. *A. SEMICOLEOPTRATUM. Panz.* — *ABDOMINALE. Grav.* Pas commun. Environs de Dijon. (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune. — *MM. Bourlier et André.*)

2516. *A. OPHTHALMICUM. Payk.* Pas rare. Dans les bois





en fauchant. Mai à juillet. Plombières, combes de Neuvon. Velars-sur-Ouche, petite combe près de la gare.

2517. A. SORBI. *Gyll.* Pas rare. Dans les bois en fauchant. Mai, juin. Plombières, combe de Neuvon à Darois. Marsannay-la-Côte, bois près de Gouville. Gevrey, dans la combe:

2518. A. SCUTELLARE. *Erichs.* — TESTAGEUM. *Lacord.* — MONTIVAGUM. *Héer.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

2519. A. MINUTUM. *F.* (Rouvray. — M. *Emy.*)

2520. A. UMBELLATARUM. *Kieschw.* J'ai pris quatre exemplaires de cette espèce dans les environs de Dijon, mais je ne me rappelle ni le lieu ni l'époque.

BOREAPHILUS. *Sahlb.* — HARPOGNATHUS. *Wesm.*

— MACROPALPUS. *Cussac.*

2521. B. ROBYNSII. *Wesm.* — PALLIPES. *Cussac.* — ANGUSTICOLLIS. *Fairm. Faune.* J'ai pris quatre exemplaires de cet insecte dans les environs de Dijon, mais je ne me rappelle ni le lieu ni l'époque de cette capture.

PROTEINUS. *Latr.*

2522. P. BRACHYPTERUS. *F.* (Rouvray. — M. *Emy.*) (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

2523. P. BREVICOLLIS. *Erichs.* Commun. Dans les champignons, surtout ceux qui sont en décomposition, dans les végétaux en putréfaction, sous les feuilles mortes, sous les cadavres de petits mammifères et de mollusques. Avril à octobre. Dijon, Parc; Jardin botanique; fontaine de Larrey; mur au nord du clos de Pouilly; chemins autour de la ville. Plombières, combe de Neuvon. Etc. (Beaune. — MM. *Arias, Bourlier et André.*)

Cette espèce est peut-être le véritable *P. brachypterus*, et je l'ai considérée comme telle pendant fort longtemps;

ce n'est que récemment qu'il m'a semblé qu'elle présentait plutôt les caractères du *P. brevicollis*. Toutefois je ne donne ce dernier nom qu'avec réserve, jusqu'à ce que je connaisse les deux espèces en nature.

2524. *P. MACROPTERUS*. *Gyll.* Pas commun. Sous les détritiques et au vol le soir. Juin à septembre. Dijon, Vieux-Suzon. Gevrey, bois d'aulnes près du petit étang de Satenay. (Beaune. — Sous les pierres au bord de la Bouzaise; mars; M. *Bourlier*. — M. *André*.)

MEGARTHURUS. *Küh.*

2525. *M. DEPRESSUS*. *Payk.* Trois exemplaires. Environs de Dijon. Je crois me souvenir les avoir trouvés au printemps à Dijon, au Parc, dans le liquide coulant du tronc d'un vieux orme, mais je n'en suis pas certain. (Beaune. — M. *André*.)

2526. *M. SINUATOCOLLIS*. *Lacord.* Je n'ai pris que deux exemplaires de cette espèce, à Dijon, au vol le soir, l'un sur le chemin des Perrières, près du Château-d'Eau, le 4 mai, et l'autre près de l'entrée de l'Asile des aliénés, le 26 octobre. M. *Dudrumel* en a également pris un dans son jardin, rue d'Ahuy, sur une plante, le 2 mai.

2527. *M. HEMIPTERUS*. *Ill.* — *NITIDULOIDES*. *Dej.* Commun. Dans les bois, dans les champignons et en fauchant. Juin à août Plombières, combes de Neuvon, Collonges-les-Premières. Soirans-Fouffrans. Gevrey, bois de la plaine. Saint-Nicolas-les-Cîteaux, forêt de Cîteaux. (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — MM. *Arias*, *Bourlier* et *André*.)

PHLOEOBIUM. *Dej.*

2528. *P. CLYPEATUM*. *Müll.* — *CORTICALE*. *Lacord.* (Rouvray. — M. *Emy*.) (Beaune. — M. *André*.)







MICROPEPLUS. *Latr.*

2529. *M. PORCATUS*. *Payk.* — *SULCATUS*. *Herbst.* Pas rare. Par terre, sur les pierres, sous les pierres recouvrant des restes de fumier, au vol le soir sur les chemins, en fauchant, sur du bois coupé, etc. Fin avril à juillet. Dijon, chemins autour de la ville; fontaine de Larrey; Combeaux-Serpents. Fontaine, chemin conduisant à Suzon au-dessus de la ferme de Saint-Martin. Plombières, combes de Neuvon. Fixin et Gevrey, bois de la plaine. Chambolle. (Rouvray. — *M. Emy.*) (Beaune. — *M. André.*)

Cet insecte a été pris en assez grand nombre par *M. Dudrumel*, le 14 juillet, à Dijon, sur les vitres des fenêtres du grenier de sa maison, rue d'Ahuy.

2530. *M. TESSERULA*. *Curtis.* — *STAPHYLINOIDES*. *Gyll.* J'ai pris deux exemplaires de cette espèce, non encore signalée en France à ma connaissance, tous deux en fauchant dans les bois, vers le soir, l'un à Plombières, dans la combe de Neuvon à Darois, le 27 juillet, et l'autre à Collonges-les-Premières, sur le grand chemin à l'est du grand étang, le 26 juin.

---



# TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

## FAMILLES ET DES GENRES.



Abax, page 29.  
 Abdera, p. 348.  
 Abraeus, p. 110.  
*Abraeus*, p. 110.  
 Acalles, p. 185.  
 Acalyptus, p. 193.  
 Acanthoderes, p. 260.  
 Achenium, p. 409.  
 Acilius, p. 45.  
 Acinopus, p. 32.  
 Acrognathus, p. 427.  
 Acrossus, p. 119.  
*Acupalpus*, p. 37, 38.  
 Adimonia, p. 285.  
 Adonia, p. 333.  
 Adrastus, p. 143.  
*Ægosoma*, p. 250.  
 Agabus, p. 46.  
 Agapanthia, p. 270.  
 Agaricophagus, p. 73.  
 Agathidium, p. 73.  
*Agathidium*, p. 73.  
 Agelastica, p. 287.  
*Agonum*, p. 23.  
 Agrilus, p. 128.  
*Agrilus*, p. 130.  
 Agriotes, p. 142.  
*Agrypnus*, p. 134.  
 Aleochara, p. 384.  
 Alexia, p. 93.  
 Allecula, p. 344.  
 Alophus, p. 218.  
 Aluca, p. 288.  
*Alticopus*, p. 243.  
 Amalus, p. 196.  
 Amara, p. 30.  
 Ammœcius, p. 120.  
*Ampedus*, p. 138, 139.  
 Amphicyllis, p. 73.  
 Amphimallus, p. 122.

Amphotis, p. 79.  
 Anærea, p. 265.  
 Anæsthetis, p. 265.  
*Anætia*, p. 267.  
 Anaspis, p. 352.  
 Anatis, p. 337.  
 Anchomenus, p. 22.  
 Anisodactylus, p. 32.  
 Anisoplia, p. 123.  
*Anisoptia*, p. 123.  
 Anisorhynchus, p. 216.  
 Anisosticta, p. 327.  
 Anisotoma, p. 71.  
*Anisotoma*, p. 71, 72, 73.  
*ANISOTOMÆ*, p. 71.  
 ANOBII, p. 161.  
 Anobium, p. 161.  
 Anomala, p. 123.  
 Anoncodes, p. 356.  
 Anoplodera, p. 275.  
 Anoplus, p. 192.  
 Anthaxia, p. 130.  
 Antherophagus, p. 90.  
 ANTHICI, p. 360.  
 Anthicus, p. 360.  
 Anthobium, p. 432.  
*Anthobium*, p. 430.  
 Anthocomus, p. 153.  
 Anthonomus, p. 199.  
 Anthophagus, p. 428.  
*Anthophagus*, p. 428, 429.  
 Anthrenus, p. 102.  
 Anthribus, p. 243.  
 Apate, p. 165.  
 Aphanisticus (*errore* Aphanisti-  
 chus), p. 132.  
 Aphodius, p. 117.  
*Aphodius*, p. 116, 117, 119, 120.  
*Aphthona*, p. 295.  
 Apion, p. 226.

- Apoderus, p. 243.  
 Apteropeda, p. 302.  
 Argopus, p. 302.  
 Argutor, p. 26.  
 Aromia, p. 252.  
 Asclera, p. 356.  
 Asida, p. 340.  
 Aspidiphorus, p. 103.  
*Astenus*, p. 414.  
 Athous, p. 134.  
*Athous*, p. 136.  
 Atomaria, p. 91.  
 Atopa, p. 144.  
 Attagenus, p. 101.  
*Attagenus*, p. 101, 102.  
 Attelabus, p. 243.  
*Auchenia*, p. 279.  
 Aulonium, p. 86.  
 Autalia, p. 376.  
 Badister, p. 19.  
 Bagous, p. 189.  
 Balaninus, p. 197.  
*Balanomorpha*, p. 296.  
 Baridius, p. 188.  
*Baris*, p. 188.  
 Barynotus, p. 217.  
 Batrisus, p. 365.  
 Bembidium, p. 39.  
*Bembidium*, p. 41.  
 Berosus, p. 56.  
*Bitoma*, p. 85.  
 BLAPES, p. 340.  
 Blaps, p. 340.  
 Bledius, p. 422.  
*Blemus*, p. 39.  
 Blethisa, p. 2.  
 Bolboceras, p. 118.  
 Boletobius, p. 394.  
 Bolitochara, p. 377.  
 Bolitophagus, p. 341.  
 Boreaphilus, p. 433.  
 Bostrichi, p. 166.  
 Bostrichus, p. 165.  
*Bostrichus*, p. 166, 167.  
 Brachinus, p. 14.  
 Brachyphylla, p. 124.  
 Brachypterus, p. 77.  
 Brachytarsus, p. 245.  
 Bradybatus, p. 200.  
 Bradycellus, p. 38.  
 Bromius, p. 311.  
 Brontes, p. 87.  
 Broscus, p. 29.  
 Bruchus, p. 247.  
 Bryaxis, p. 368.  
 BUPRESTI, p. 127.  
 Buprestis, p. 128.  
 BYARRHI, p. 103.  
 Byrrhus, p. 104.  
*Byrrhus*, p. 104, 105, 311.  
 Bythinus, p. 371.  
 Byturus, p. 99.  
*Calandra*, p. 170.  
 Calathus, p. 21.  
 Callidium, p. 253.  
*Callidium*, p. 253, 254.  
 Callistus, p. 17.  
 Calodera, p. 377.  
 Calomicrus, p. 288.  
 Calosoma, p. 8.  
 Calvia, p. 337.  
 Calyptomerus, p. 74.  
*Campylirhynchus*, p. 177.  
 Campylus, p. 136.  
 CANTHARIDES, p. 353.  
 Cantharis, p. 356.  
*Cantharis*, p. 149, 151.  
 Capnodis, p. 128.  
 CARABI, p. 2.  
 Carabus, p. 5.  
 Cardiophorus, p. 137.  
 Carpophilus, p. 77.  
 Cassida, p. 282.  
 Catops, p. 66.  
*Catops*, p. 68.  
 Catopsimorphus, p. 68.  
 Centrotoma, p. 366.  
*Cephalotes*, p. 29.  
 Cephennium, p. 364.  
 CERAMBYCES, p. 250.  
 Cerambyx, p. 251.  
 Ceratophyus, p. 113.  
 Cercus, p. 76.  
*Cercus*, p. 77.  
 Cercyon, p. 58.  
*Cercyon*, p. 60.  
 Cerocoma, p. 355.  
 Cerophytum, p. 133.  
 Cerylon, p. 86.  
*Cerylon*, p. 86.  
 Cetonia, p. 126.  
 Ceutorhynchidius, p. 184.  
 Ceutorhynchus, p. 178.  
*Ceutorhynchus*, p. 177, 184, 186.  
 Charopus, p. 154.  
*Cheilotoma*, p. 314.  
 Chennium, p. 365.  
 Chilocorus, p. 326.  
 Chlænienus, p. 18.  
 Choragus, p. 243.  
 Chrysobothris, p. 128.  
 Chrysochus, p. 311.  
 Chrysomela, p. 303.  
 CHRYSOMELÆ, p. 279.  
 Cicindela, p. 1.  
 CICINDELÆ, p. 1.  
 Cicones, p. 85.  
 Cionus, p. 174.

- Cis, p. 163.  
*Cis*, p. 163, 164.  
 Cistela, p. 345.  
*Cistela*, p. 345, 346.  
 CISTELÆ, p. 344.  
 Clambus, p. 74.  
 Claviger, p. 373.  
 CLAVIGERI, p. 373.  
*Cleonis*, p. 219.  
 Cleonus, p. 219.  
 CLERI, p. 157.  
*Clerus*, p. 157.  
 Clivina, p. 15.  
*Clivina*, p. 15.  
 Clypeaster, p. 325.  
 CLYPEASTRES, p. 325.  
 Clythra, p. 312.  
*Clythra*, p. 313.  
 Clytus, p. 255.  
 Cnemidotus, p. 52.  
 Cneorhinus, p. 225.  
*Cneorhinus*, p. 225.  
 Coccidula, p. 332.  
 Coccinella, p. 335.  
 COCCINELLÆ, p. 326.  
 Cœliodes, p. 136.  
 Colenis, p. 72.  
 Colobicus, p. 85.  
 Colobopterus, p. 116.  
 Colon, p. 68.  
 COLYDI, p. 84.  
 Colydium, p. 86.  
*Colydium*, p. 86.  
 Colymbetes, p. 45.  
*Colymbetes*, p. 46.  
 Compsidia, p. 265.  
 Conopalpus, p. 347.  
 Conurus, p. 390.  
 Copris, p. 115.  
 Coprophilus, p. 427.  
*Coptocephala*, p. 314.  
 Coræbus (*errore* Corræbus), p. 130.  
 Corticaria, p. 96.  
 Corylophus, p. 325.  
 Corymbites, p. 141.  
 Corynetes, p. 158.  
*Corynetes*, p. 158.  
 Coryssomerus, p. 196.  
 Cossonus, p. 170.  
 Coxelus, p. 84.  
*Cratonychus*, p. 134.  
*Crepidodera*, p. 290.  
 Crepidophorus, p. 136.  
 Cryphalus, p. 167.  
 Cryptarcha, p. 83.  
 Crypticus, p. 344.  
 Cryptobium, p. 409.  
 Cryptocephalus, p. 318.  
 Cryptohypnus, p. 140.  
 CRYPTOPHAGI, p. 88.  
 Cryptophagus, p. 90.  
*Cryptophagus*, p. 89, 91, 92.  
 Cryptoplenum, p. 60.  
 Cryptorhynchus, p. 188.  
 Cteniopus, p. 346.  
 Ctenistes, p. 367.  
 CUCUII, p. 87.  
 CURCULIONES, p. 169.  
*Cyaniris*, p. 313.  
 Cybister, p. 45.  
 Cychramus, p. 83.  
 Cychrus, p. 5.  
 Cyclonotum, p. 58.  
 Cyllidium, p. 58.  
*Cymatopterus*, p. 45.  
 Cymindis, p. 9.  
*Cynegetis*, p. 339.  
*Cyphon*, p. 144.  
 CYPHONES, p. 144.  
 Cyrtusa, p. 72.  
 Cytilus, p. 105.  
 Dasycerus, p. 97.  
 Dasytes, p. 155.  
*Dasytes*, p. 156.  
 Deinopsis, p. 390.  
 Deleaster, p. 428.  
*Demetrias*, p. 10.  
 Demetrius, p. 10.  
 Dendrophilus, p. 108.  
*Dendrophilus*, p. 109.  
 DERMESTÆ, p. 99.  
 Dermestes, p. 100.  
 Diacanthus, p. 141.  
 Diachromus, p. 32.  
 Dianous, p. 416.  
 DIAPERIDES, p. 342.  
 Diaperis, p. 342.  
 Dibolia, p. 301.  
 Dictyopterus, p. 146.  
 Dinarda, p. 388.  
 Diodesma, p. 84.  
 Diplocælus, p. 99.  
 Dircæa, p. 348.  
 Ditoma, p. 85.  
 Ditomus, p. 16.  
 Dolichosoma, p. 156.  
 Dolopius, p. 143.  
 Donacia, p. 276.  
 DONACIÆ, p. 276.  
 Dorcadion, p. 264.  
 Dorcatoma, p. 164.  
 Dorcus, p. 112.  
 Dorytomus, p. 202.  
 Drilus, p. 148.  
 Dromius, p. 10.  
 Dryops, p. 357.  
 Drypta, p. 9.  
 Dyschirius, p. 15.

- DYTISCI, p. 44.  
 Dytiscus, p. 44.  
 Ebæus, p. 154.  
 Elaphrus, p. 2.  
 Elater, p. 138.  
 ELATERES, p. 132.  
 Elieschus (*errore* Eliescus), p. 200.  
 ELVIDES, p. 61.  
 Elmis, p. 62.  
*Elmis*, p. 61.  
 Elodes, p. 144.  
*Emus*, p. 397, 400.  
 Endomychus, p. 339.  
 Engis, p. 93.  
 Ennearthron, p. 163.  
 Epilachna, p. 938.  
 Epistemus, p. 92.  
 Epuræa, p. 77.  
 Erihrinus, p. 201.  
 Euæstethus, p. 422.  
 Eucinetus, p. 145.  
 Eucnemis, p. 133.  
 Euplectus, p. 372.  
 Eupleurus, p. 116.  
 Euryusa, p. 387.  
 Eusomus, p. 224.  
 Eutheia, p. 364.  
 Exocentrus, p. 261.  
 Exochomus, p. 326.  
 Falagria, p. 376.  
*Feronia*, p. 25, 26, 27, 28, 29.  
 Galleruca, p. 286.  
 Gastrophysa, p. 308.  
 Geodromus, p. 429.  
*Geopyris*, p. 147.  
 GEORYSSI, p. 103.  
 Georyssus, p. 103.  
 Geotrupes, p. 112.  
*Geotrupes*, p. 113.  
 Gibbium, p. 160.  
 Gnorimus, p. 126.  
 Goniocтена, p. 310.  
*Goniocтена*, p. 310.  
 Gracilia, p. 257.  
 Grammoptera, p. 275.  
*Graphoderus*, p. 45.  
*Graptodera*, p. 288.  
 Gronops, p. 218.  
 Gryphinus, p. 325.  
 Grypidius, p. 201.  
 Gymnetron (*errore* Gymnætron),  
     p. 172.  
 Gymnopleurus, p. 114.  
*Gymnusa*, p. 390.  
*Gymnandrophthalma*, p. 313.  
 GYRINI, p. 52.  
 Gyrinus, p. 52.  
 Gyrophæna, p. 386.  
 I. abrocera, p. 393.  
 Hadrotoma, p. 102.  
 Hæterius, *vide* Hæterius.  
 Halipus, p. 51.  
*Haliplus*, p. 52.  
 Hallomenus, p. 348.  
 Halyzia, p. 337.  
*Hammaticherus*, p. 251.  
 Harmonia, p. 336.  
 Harpalus, p. 34.  
*Harpalus*, p. 32, 33.  
*Harpognathus*, p. 433.  
 Hedobia, p. 159.  
 Hellodes, *vide* Helodes.  
 Helochares, p. 57.  
 Helodes (*errore* Hellodes), p. 309.  
 HELOPES, p. 344.  
 Helophorus, p. 53.  
 Helops, p. 344.  
 Heptaulacus, p. 120.  
 Hesperophanes, p. 255.  
 Hæterius (*errore* Hæterius), p. 108.  
 HETERO CERI, p. 63.  
 Heterocerus, p. 63.  
 Heterotops, p. 406.  
 Hippodamia, p. 333.  
 Hispa, p. 282.  
 Hispalis, p. 38.  
 Hister, p. 106.  
*Hister*, p. 109.  
 HISTRI, p. 106.  
 Homalopus, p. 315.  
 Homalota, p. 379.  
*Homalota*, p. 386.  
 Hoplia, p. 124.  
 Hydaticus, p. 45.  
 Hydriobius, p. 71.  
 Hydræna, p. 55.  
 Hydrobius, p. 56.  
*Hydrobius*, p. 55, 57, 58.  
 Hydrochus, p. 54.  
 Hydronomus, p. 200.  
 HYDROPHILI, p. 53.  
 Hydrophilus, p. 56.  
*Hydrophilus*, p. 56.  
 Hydroporus, p. 48.  
 Hydrous, p. 56.  
*Hygrobia*, p. 48.  
 Hygronoma, p. 379.  
*Hygrotophila*, p. 98.  
 Hylastes, p. 168.  
 HYLESINI, p. 167.  
 Hylesinus, p. 168.  
 Hylobius, p. 216.  
 Hylotrupes, p. 255.  
 Hylurgus, p. 168.  
*Hylurgus*, p. 168.  
 Hyperaspis, p. 328.  
 Hyphydrus, p. 51.  
 Hypocyptus, p. 390.



Hypophlæus, p. 343.  
 Hypulus, p. 348.  
 Idalia, p. 334.  
 Ilybius, p. 46.  
 Ips, p. 83.  
*Ips*, p. 77.  
 Ischnodes, p. 139.  
*Labidostomis*, p. 312.  
 Laccobius, p. 57.  
 Laccophilus, p. 48.  
*Lachnaia*, p. 813.  
 Lacon, p. 134.  
 Læmophlæus, p. 87.  
 Lagria, p. 358.  
 LAGRIÆ, p. 358.  
 Lamia, p. 262.  
*Lampra*, p. 128.  
 Lamprosoma, p. 311.  
 Lampyris, p. 146.  
 Larinus, p. 204.  
 Lasia, p. 339.  
 LATHRIDII, p. 94.  
 Latbridius, p. 95.  
*Lathridius*, p. 96.  
 Lathrimæum, p. 430.  
 Lathrobium, p. 409.  
 Lebia, p. 12.  
 Leiopus, p. 260.  
 Leiosomus, p. 216.  
 Leistus, p. 4.  
*Leja*, p. 42.  
 Lema, p. 280.  
 Leptacinus, p. 397.  
 Leptura, p. 274.  
*Leptura*, p. 275.  
 Leptusa, p. 383.  
 Lepyrus, p. 217.  
 Lesteva, p. 429.  
 Licinus, p. 17.  
 Lignyodes, p. 200.  
 Limnebius, p. 55.  
 Limnichus, p. 104.  
 Limnius, p. 61.  
 Limobius, p. 212.  
 Limonius, p. 136.  
 Lina, p. 307.  
 Liodes, p. 73.  
 Liophilæus, p. 218.  
*Liopterus*, p. 46.  
 Litargus, p. 99.  
 Lithocharis, p. 412.  
 Lixus, p. 204.  
 Lomechusa, p. 388.  
 Longitarsus, p. 296.  
*Lopha*, p. 43.  
 Loricera, p. 16.  
 Lucanus, p. 111.  
 Ludius, p. 140.  
*Ludius*, p. 141.

Luperus, p. 288.  
*Luperus*, p. 288.  
 Lycoperdina, p. 340.  
 LYCOPERDINÆ, p. 339.  
 Lyctus, p. 89.  
 Lygistopterus, p. 146.  
*Lytta*, p. 356.  
*Macrolenes*, p. 312.  
*Macropalpus*, p. 433.  
 Magdalinus, p. 203.  
 MALACHI, p. 152.  
 Malachius, p. 152.  
*Malachius*, p. 153, 154, 155.  
 Malacosoma, p. 287.  
 Malthinus, p. 151.  
 Mecinus, p. 171.  
 Megarthrus, p. 434.  
 Megasternum, p. 60.  
 Megatoma, p. 101.  
*Megatoma*, p. 103.  
 Melandrya, p. 347.  
 Melanotus, p. 134.  
 Melasis, p. 132.  
 Meligethes, p. 80.  
 Melinopterus, p. 119.  
 Meloe, p. 354.  
 Melolontha, p. 121.  
*Melolontha*, p. 121.  
 Mesosa, p. 263.  
 Metallites, p. 220.  
*Metæcus*, p. 349.  
 Miccotrogus, p. 195.  
 Micraspis, p. 328.  
*Micronyx*, p. 194.  
 Micropeplus, p. 435.  
*Microsaurus*, p. 406.  
 Minyops, p. 217.  
 Mniophila, p. 303.  
 Molops, p. 29.  
 Molorchus, p. 259.  
*Molorchus*, p. 259.  
 Molytes, p. 215.  
*Molytes*, p. 216.  
 Monocerus, p. 360.  
 Monohammus, p. 262.  
 Mononychus, p. 186.  
 Monotoma, p. 94.  
 Mordella, p. 350.  
*Mordella*, p. 350.  
 MORDELLÆ, p. 349.  
 Mordellistena, p. 350.  
 Morimus, p. 262.  
 Morychus, p. 105.  
 Mycetæa, p. 92.  
 Mycetochares, p. 346.  
 MYCETOPHAGI, p. 98.  
 Mycetophagus, p. 98.  
 Mycetoporus, p. 395.  
 Mylabris, p. 355.



- Myllæna, p. 389.  
Myrmecixenus, p. 95.  
Myrmecoxenus, p. 95.  
Myrmedonia, p. 374.  
Myrrha, p. 336.  
Mysia, p. 336.  
Nanophyes, p. 171.  
Nebria, p. 4.  
Necrobia, p. 158.  
Necrodes, p. 64.  
Necrophorus, p. 63.  
Necydalis, p. 259.  
Nemonyx, p. 237.  
Neomida, p. 342.  
Nitidula, p. 78.  
Nitidula, p. 77, 79, 80.  
NITIDULÆ, p. 76.  
Nosodendron, p. 104.  
Nossidium, p. 71.  
Notaphus, p. 40.  
Noterus, p. 48.  
Notiophilus, p. 3.  
Notoxus, p. 360.  
Notoxus, p. 157, 158.  
Nundina, p. 331.  
Nycteus, p. 145.  
Oberea, p. 267.  
Obrium, p. 258.  
Ochina, p. 162.  
Ochtebius, p. 54.  
Octotemnus, p. 164.  
Ocypus, p. 400.  
Odacantha, p. 9.  
OEdemera, p. 357.  
OEdemERÆ, p. 356.  
Olibrus, p. 75.  
Oligota, p. 386.  
Olisthopus, p. 25.  
Olophrum, p. 430.  
Omalisus, p. 146.  
Omalium, p. 430.  
Omalium, p. 430, 432.  
Omaloplia, p. 124.  
Omaloplia, p. 123, 124.  
Omaseus, p. 27.  
Omas, p. 210.  
Omophilus, p. 346.  
Omophron, p. 3.  
Omosita, p. 80.  
Oniticellus, p. 116.  
Onthophagus, p. 115.  
Onthophilus, p. 110.  
Oodes, p. 19.  
OPATRI, p. 341.  
Opatrum, p. 341.  
Ophonus, p. 33.  
Opilus, p. 157.  
Orchesia, p. 348.  
Orchestes, p. 190.  
Orchestes, p. 192.  
Orectochilus, p. 53.  
Oreina, p. 307.  
Orobitis, p. 176.  
Orsodacna, p. 279.  
Orthoperus, p. 325.  
Oryctes, p. 121.  
Osmoderma, p. 125.  
Othius, p. 395.  
Otiorhynchus, p. 206.  
Otophorus, p. 117.  
Oxyomus, p. 120.  
Oxyomus, p. 120.  
Oxypoda, p. 383.  
Oxyporus, p. 408.  
Oxytelus, p. 424.  
Oxytelus, p. 426.  
Pachnephorus, p. 312.  
Pachybrachys, p. 314.  
Pachycerus, p. 218.  
Pachystola, p. 262.  
Pachyta, p. 272.  
Pæderus, p. 415.  
Pælobius, p. 48.  
Panagæus, p. 16.  
Parmena, p. 264.  
PARNI, p. 61.  
Parnus, p. 61.  
Paromalus, p. 108.  
Patrobus, p. 20.  
Pedinus, p. 341.  
Peritelus, p. 209.  
Peryphus, p. 41.  
Phædon, p. 309.  
PHALACRI, p. 75.  
Phalacrus, p. 75.  
Phalacrus, p. 75.  
Philhydrus, p. 57.  
Philonthus, p. 401.  
Phlæobium, p. 434.  
Phlæonæus, p. 426.  
Phlæopora, p. 378.  
Phloiotribus, p. 168.  
Phosphænus, p. 147.  
Phratora, p. 308.  
Phylethus, p. 342.  
Phyllobius, p. 211.  
Phyllobrotica, p. 287.  
Phyllopertha, p. 123.  
Phyllotreta, p. 292.  
Phymatodes, p. 253.  
Phytobius, p. 192.  
Phytæcia, p. 268.  
Phytonomus, p. 212.  
Phytonomus, p. 212.  
Plagiodera, p. 308.  
Plagiogonus, p. 120.  
Platycerus, p. 111.  
Platyedema, p. 342.

- Platynaspis, p. 327.  
 Platypus, p. 166.  
 Platyrhinus, p. 244.  
 Platysma, p. 28.  
 Platysoma, p. 106.  
*Platysoma*, p. 108, 109.  
 Platystethus, p. 423.  
 Plectroscelis, p. 300.  
 Plegaderus, p. 110.  
 Pleurophorus, p. 120.  
 Plinthus, p. 215.  
 Pocadius, p. 82.  
*Podagrica*, p. 289.  
 Pæcilus, p. 25.  
 Pogonocherus, p. 261.  
 Polistichus, *vide* Polystichus.  
*Polydrosus*, p. 220.  
 Polydrusus, p. 220.  
 Polyphylla, p. 121.  
 Polystichus (*errore* Polistichus), p. 9.  
 Poophagus, p. 177.  
 Pria, p. 80.  
 Prionus, p. 251.  
 Prionychus, p. 345.  
 Pristonychus, p. 21.  
 Procrustes, p. 5.  
 Pronomæa, p. 389.  
 Propylea, p. 338.  
 Proteinus, p. 433.  
 Protophysus, p. 315.  
*Psammæchus*, p. 89.  
*Psammæcius*, p. 89.  
*PSELAPHI*, p. 365.  
 Pselaphus, p. 367.  
 Psylliodes, p. 299.  
 Ptenidium, p. 71.  
 Pterostichus, p. 28.  
 Ptilinus, p. 164.  
 Ptilium, p. 70.  
*Ptilium*, p. 69, 71.  
 PRINI, p. 159.  
 Ptinus, p. 159.  
*Ptinus*, p. 159.  
 Ptosima, p. 127.  
 Purpuricenus, p. 252.  
 Pycnomerus, p. 86.  
 Pyrochroa, p. 358.  
*Pyrocuroæ*, p. 358.  
 Quedius, p. 406.  
 Ragonycha, *vide* Rhagonycha.  
 Ramphus (*errore* Rhamphus), p. 226.  
*Rantus*, p. 45.  
 Rhagium, p. 271.  
 Rhagonycha (*errore* Ragonycha), p. 151.  
 Rhamnusium, p. 271.  
 Rhamphus, *vide* Ramphus.  
 Rhinocyllus, p. 204.  
*Rhinomacer*, p. 237.  
 Rhinoncus, p. 177.  
 Rhinosimi, p. 359.  
 Rhinosimus, p. 359.  
 Rhipiphorus, p. 349.  
 Rhizobius, p. 331.  
 Rhizophagus, p. 83.  
 Rhizotrogus, p. 122.  
*Rhizotrogus*, p. 122.  
 Rhopalopus, p. 254.  
 Rhynchites, p. 237.  
 Rhyncolus, p. 169.  
 Rhyssemus, p. 120.  
 Rhytidosomes, p. 177.  
 Rosalia, p. 252.  
*Rugilus*, p. 413.  
 Salpingus, p. 359.  
 Saperda, p. 266.  
*Saperda*, p. 265.  
 Saprinus, p. 109.  
 Scaphidema, p. 342.  
 SCAPHIDI, p. 68.  
 Scaphidium, p. 68.  
*Scaphidium*, p. 68.  
 Scaphisoma, p. 68.  
 SCARABÆI, p. 111.  
 Sciaphilus, p. 224.  
 Scirtes, p. 145.  
 Scolytus, p. 167.  
 Scopæus, p. 411.  
 Scaptia, p. 349.  
 SCYDMÆNI, p. 362.  
 Scydmaenus, p. 362.  
 Scymnus, p. 328.  
*Scymnus*, p. 327.  
 Serica, p. 123.  
 Sericosomus, p. 143.  
 SERROPALPI, p. 347.  
 Serropalpus, p. 348.  
 Sibynes, p. 193.  
*Sibynia*, p. 193.  
 Silaria, p. 353.  
 Silpha, p. 65.  
 SILPHÆ, p. 63.  
 Silusa, p. 389.  
 Silvanus (*errore* Sylvanus), p. 88.  
 Sinodendron, p. 112.  
 Sinoxylon, p. 165.  
 Sisypheus, p. 115.  
 Sitaris, p. 353.  
*Sitona*, p. 222.  
 Sitones, p. 222.  
 Sitophilus, p. 170.  
*Smaragdina*, p. 313.  
 Smicronyx, p. 194.  
 Soronia, p. 79.  
 Sospita, p. 387.  
*Spartophila*, p. 310.

- Spermophagus*, p. 246.  
*Sphæridium*, p. 58.  
*Sphenophorus*, p. 170.  
*Sphindus*, p. 94.  
*Sphodrus*, p. 20.  
*STAPHYLINI*, p. 374.  
*Staphylinus*, p. 397.  
*Steatoderus*, p. 140.  
*Stenelmis*, p. 63.  
*Stenolophus*, p. 37.  
*Stenopterus*, p. 258.  
*Stenostola*, p. 266.  
*Stenus*, p. 416.  
*Steropus*, p. 28.  
*Stilicus*, p. 413.  
*Stomis*, p. 29.  
*Strangalia*, p. 273.  
*Strongylus*, p. 82, 83.  
*Strophosomus*, p. 225.  
*Stylosomus*, p. 315.  
*Styphlus*, p. 190.  
*Sunius*, p. 414.  
*Sylvanus*, *vide* *Silvanus*.  
*Synaptus*, p. 134.  
*Syncalypta*, p. 104.  
*Synchita*, p. 85.  
*Synchita*, p. 85.  
*Synuchus*, p. 22.  
*Tachinus*, p. 393.  
*Tachyerges*, p. 192.  
*Tachyporus*, p. 391.  
*Tachyporus*, p. 390.  
*Tachypus*, p. 44.  
*Tachys*, p. 40.  
*Tachyusa*, p. 378.  
*Tanymecus*, p. 224.  
*Tanysphyrus*, p. 217.  
*Taphria*, p. 22.  
*Tapinotus*, p. 177.  
*Tarsostenus*, p. 158.  
*Teinodactyla*, p. 296.  
*TELEPHORI*, p. 146.  
*Telephorus*, p. 149.  
*Telmatophilus*, p. 89.  
*Tenebrio*, p. 343.  
*TENEBRIONES*, p. 343.  
*Teredus*, p. 86.  
*Teretrius*, p. 109.  
*Tetrops*, p. 267.  
*Teuchestes*, p. 117.  
*Thalycra*, p. 82.  
*Thamnophilus*, p. 203.  
*Thanasimus*, p. 157.  
*Thea*, p. 338.  
*THROSCI*, p. 105.  
*Throscus*, p. 105.  
*Thylacites*, p. 225.  
*Tillus*, p. 157.  
*Timarcha*, p. 302.  
*Tiphæa*, *vide* *Typhæa*.  
*Tiresias*, p. 103.  
*Tomicus*, p. 166.  
*Toxotus*, p. 272.  
*Trachodes*, p. 189.  
*Trachyphloeus*, p. 211.  
*Trachys*, p. 131.  
*Trechus*, p. 39.  
*Trichius*, p. 125.  
*Trichodes*, p. 158.  
*Trichophya*, p. 394.  
*Trichophyus*, p. 394.  
*TRICHOPTERYX*, p. 69.  
*Trichopteryx*, p. 69.  
*Trimium*, p. 372.  
*Trinodes*, p. 102.  
*Triphyllus*, p. 99.  
*Triplax*, p. 93.  
*Triplax*, p. 93.  
*Tritoma*, p. 93.  
*Trochatus*, p. 45.  
*Troglops*, p. 155.  
*Trogoderma*, p. 102.  
*Trogophloeus*, p. 426.  
*Trogosita*, p. 84.  
*Tropideres*, p. 244.  
*Trox*, p. 121.  
*Tychius*, p. 195.  
*Tychius*, p. 195.  
*Tychus*, p. 370.  
*Typhæa* (*errore* *Tiphæa*), p. 99.  
*Urodon*, p. 246.  
*Valgus*, p. 125.  
*Velleius*, p. 406.  
*Vibidia*, p. 338.  
*Xantholinus*, p. 396.  
*Xantholinus*, p. 397.  
*Xyletinus*, p. 164.  
*Xylopertha*, p. 165.  
*Xylophilus*, p. 362.  
*Zabrus*, p. 30.  
*Zeugophora* p. 279.

JUL -- 1987



